

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986

يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

### دورزولاميد تيمولول تارو

قطرات عيون

المواد الفعّالة وتركيزها:

dorzolamide (hydrochloride) 20 mg/ml  
timolol (maleate) 5 mg/ml

دورزولاميد (هيدروكلوريد) 20 ملغ/ملل  
تيمولول (ماليات) 5 ملغ/ملل

مواد غير فعّالة ومثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصف لعلاج مرضك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضرّ بهم، حتى لو بدا لك بأن حالتهم الصحيّة مشابهة.

هذا الدواء ليس معدّاً لاستعمال الأطفال والرّضع.

#### 1. لم أعد هذا الدواء؟

دورزولاميد تيمولول تارو معد لخفض الضغط المرتفع داخل العين ولعلاج مرض الزرق (جلوكوما).

المجموعة العلاجية: يحتوي دورزولاميد تيمولول تارو على مادتين فعالتين:

- دورزولاميد – ينتمي لمجموعة الأدوية التي تدعى مثبطات الإنزيم أنهيدراز كربوني.
  - تيمولول – ينتمي لمجموعة الأدوية التي تدعى حاصرات بيتا.
- تخفّض هذه الأدوية الضغط داخل العين بطرق مختلفة.

#### 2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- وجدت لديك حساسيّة لـ دورزولاميد هيدروكلوريد، تيمولول ماليات أو لأحد المركّبات الأخرى التي يحتويها الدواء (أنظر الفصل 6).
- كان لديك أو كانت لديك في الماضي مشاكل تنفس مثل الربو أو التهاب شعب هوائية مُزمن انسدادى خطير (مرض رئوي خطير الذي قد يُسبب صفيراً، صعوبة في التنفس و/أو سعال متواصل).
- كان لديك نبض بطيء، قصور في القلب أو مشاكل في نُظم القلب (نبض غير منتظم).
- لديك مرض كلى خطير أو مشاكل في الكلى أو ماضٍ سابق من أحجار في الكلى.
- كنت تعاني من فرط حموضة في الدم بسبب تراكم كلوريد الدم (حماض بفرط كلوريد الدم - hyperchloraemic acidosis).

## تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بدورزولاميد تيمولول تارو، أخبر الطبيب إذا:

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل طبيّة، بما في ذلك مشاكل في العينين الموجودة لديك الآن أو كانت لديك في الماضي:

- مرض قلب تاجي (ممكن أن تشمل الأعراض ألم أو ضغط في الصدر، ضيق تنفس أو إحساس بالاختناق)، قصور في القلب، ضغط دم منخفض.
- اضطرابات في نظم القلب، على سبيل المثال نبض بطيء.
- خلل في أداء الجهاز التنفسي مثل مرض رئوي انسدادى مُزمن.
- مرض تدفق دم ضعيف (مثل مرض رينو أو متلازمة رينو).
- سكري، لأنّ تيمولول ممكن أن يخفي علامات وأعراض مستويات سكر منخفضة في الدم.
- فرط نشاط الغدة الدرقية (تيروئيد)، لأن تيمولول ممكن أن يخفي العلامات والأعراض.
- يجب استشارة الطبيب إذا أنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشكلة ما في أداء عمل الكبد.

أخبر الطبيب أنك تستعمل دورزولاميد تيمولول تارو قبل أن تخضع لعملية جراحية، لأنّ تيمولول ممكن أن يغير تأثير أدوية معينة التي تُستعمل خلال التخدير.

كذلك، أخبر الطبيب عن أي أنواع حساسية أو ردود فعل تحسّية، وهذا يشمل شرى، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، و/أو الحلق، التي قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس أو في البلع.

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من ضعف في العضلات أو إذا تمّ تشخيص وجود مرض وهن عضلي وببيل (Myasthenia Gravis) لديك.

إذا تطوّر لديك تهيج ما في العين أو مشاكل جديدة في العينين، مثل احمرار في العين أو انتفاخ الجفون، توجه فوراً إلى الطبيب.

إذا كنت تشك بأن دورزولاميد تيمولول تارو يُسبّب لك رد فعل تحسّسي أو فرط حساسية (مثلاً، طفح جلدي، رد فعل جلدي شديد، أو احمرار وحكة في العين)، توقف عن استعمال هذا الدواء وتوجه فوراً إلى الطبيب.

أخبر الطبيب إذا تطوّر لديك عدوى في العين، إذا أصبت في العين، إذا كنت على وشك الخضوع لعملية جراحية في العين أو إذا تطوّرت لديك أعراض جديدة أو حصل تفاقم في الأعراض الموجودة.

عندما يتم تقطير دورزولاميد تيمولول تارو إلى العين، من الممكن أن تؤثر على الجسم بأكمله.

إذا كنت تضع عدسات لاصقة لينة، يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء (أنظر أيضاً البند "معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء"). يجب نزع العدسات اللاصقة قبل استعمال دورزولاميد تيمولول تارو. يمكن إعادة العدسات للعين بعد 15 دقيقة من استعمال قطرات العينين.

## الأطفال والأولاد

توجد تجربة محدودة بالنسبة لاستعمال دورزولاميد تيمولول تارو للأطفال والأولاد. هذا الدواء ليس معداً لاستعمال الأطفال والأولاد.

## تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيّة ومكمّلات غذائيّة فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

قد يؤثر دورزولاميد تيمولول تارو على أدوية أخرى التي أنت تستعملها أو قد يتأثر منها، وهذا يشمل قطرات عينين أخرى لعلاج مرض الزرق (جلوكوما). أخبر الطبيب إذا كنت تستعمل أو تنوي استعمال أدوية لخفض ضغط الدم، أدوية للقلب أو أدوية لعلاج السكري. أخبر الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تستعمل، استعملت مؤخرًا أو قد تستعمل أية أدوية أخرى. هذا الأمر مهم جدًا إذا كنت:

- تتناول أدوية لخفض ضغط الدم أو أدوية لعلاج مرض قلب (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات بيتا أو دييجوكسين).
- تتناول أدوية لعلاج اضطرابات في النبض أو نبض غير منتظم (مثل حاصرات قنوات الكالسيوم، حاصرات بيتا أو دييجوكسين).
- تستخدم قطرات عينين أخرى التي تحتوي على حاصرات بيتا.
- تتناول مثبتات إنزيم أنهيداز كربونيّ مثل أسيتازولاميد.
- تتناول أدوية من عائلة MAOI (مثبطات الأوكسيداز الأحادي الأمين) (بعضها يُستعمل لعلاج الاكتئاب).
- تتناول دواء محاكي اللاودي الذي ممكن أن يكون قد وُصف لك لمساعدتك في التبول، أدوية محاكية اللاودي هي أيضًا نوع معين من الأدوية التي تستعمل أحيانا لتنظيم حركة الأمعاء الصحيحة.
- تتناول أدوية مخدرة (Narcotic) مثل مورفين، التي تستعمل لعلاج الألم المتوسط حتى الشديد.
- تتناول أدوية لعلاج السكري.
- تتناول أدوية مضادة للاكتئاب تدعى فلوؤكسيتين وباروؤكسيتين.
- تتناول أدوية من نوع سولفا.
- تتناول كينيدين (الذي يُستعمل لعلاج حالات معينة في القلب وأنواع معينة من الملاريا).

## الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملا أو مرضعة، تعتقدين أنك قد تكونين حاملا أو إذا كنت تخططين للحمل، يجب عليك استشارة الطبيب قبل بدء العلاج.

### استعمال أثناء الحمل:

يُمنع استعمال دورزولاميد تيمولول تارو أثناء الحمل إلا إذا اعتقد الطبيب بأن العلاج ضروري.

### استعمال أثناء الإرضاع:

يُمنع استعمال دورزولاميد تيمولول تارو إذا أنت مرضعة دون استشارة الطبيب. من الممكن أن ينتقل تيمولول إلى الحليب. استشيرى الطبيب قبل استعمال أي دواء أثناء الإرضاع.

## السياقة واستعمال الماكينات

لم يتم إجراء أبحاث بالنسبة للتأثيرات على قدرة السياقة أو تشغيل ماكينات. توجد أعراض جانبية المرتبطة بـ دورزولاميد تيمولول تارو، مثل تشوش الرؤية، التي ممكن أن تؤثر على القدرة على السياقة و/أو تشغيل ماكينات. يُمنع السياقة أو تشغيل ماكينات إلى أن تشعر بشكل أفضل أو إلى أن تعود رؤيتك واضحة.

## معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي دورزولاميد تيمولول تارو على كلوريد البنزالكونيوم.

- قد يتم امتصاص كلوريد البنزالكونيوم في العدسات اللاصقة اللينة وتغيير لون العدسات اللاصقة. يجب عليك نزع العدسات اللاصقة قبل استعمال الدواء وإعادتها بعد مرور 15 دقيقة.
- قد يؤدي كلوريد البنزالكونيوم أيضًا إلى تهيج في العيون، خاصة إذا كانت لديك عيون جافة أو اضطرابات في القرنية (الطبقة الشفافة في مقدمة العين). إذا كنت تشعر بإحساس شاذ في العيون، وخز أو آلام في العين بعد استعمال هذا الدواء، تحدث مع الطبيب.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب الاستعمال دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط. الجرعة المتبعة، عادة، هي: قطرة واحدة صباحًا وقطرة واحدة مساءً في العين التي يتم علاجها. سيخبرك الطبيب فيما إذا كان عليك علاج عين واحدة فقط أو كلا العينين.

#### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يُمنع البلع. هذا الدواء معدّ للاستعمال الخارجي فقط.

إذا كنت تستعمل هذا الدواء بالدمج مع قطرات عينين إضافية، يجب استعمال الأدوية مع فواصل زمنية تبلغ 10 دقائق على الأقل بينهما.

يُمنع تغيير جرعة الدواء دون استشارة الطبيب.

لا تسمح لفوهة القنينة أن تلمس العين أو المناطق الموجودة حول العين. فهو قد يتلوث من الجراثيم التي ممكن أن تؤدي إلى عداوى في العين وبالتالي تؤدي إلى ضرر خطير في العين، حتى فقدان الرؤية. من أجل الامتناع من حدوث تلوث محتمل للقنينة، يجب غسل اليدين قبل تناول هذا الدواء والحفاظ على فوهة القنينة بعيدة عن أي سطح. إذا كنت تعتقد بأن الدواء ممكن أن يكون ملوثًا أو إذا تطورت لديك عدوى في العين، اتصل بالطبيب فورًا بخصوص استمرار استعمال هذه القنينة.

#### تعليمات الاستعمال:

اتبع من فضلك بحذر هذه التعليمات حين تتعالج بـ دورزولاميد تيمولول تارو. من أجل تجنب حدوث عدوى، لا تسمح لفوهة القنينة أن تلمس أي سطح (بما في ذلك العين نفسها). يجب الحفاظ على القنينة مغلقة جيدًا.

قد لا تكون القنينة ممثلة تمامًا حتى نهايتها؛ فهذا الأمر قد أعد لإتاحة تحكّم أفضل بوتيرة التنقيط.

1. أولاً، اغسل يديك.
2. من المحتمل أن يكون أسهل عليك أن تنقط قطرات العينين وأنت واقف أمام المرأة.
3. قبل استعمال الدواء للمرة الأولى، تأكد من أن الرابط بين الغطاء وبين القنينة كامل. افتح غطاء القنينة بواسطة لفة نحو جهة اليسار.
4. قم بإمالة رأسك إلى الخلف. بمساعدة إصبع السبابة، اجذب برفق الجفن السفلي نحو الأسفل حتى تكوّن "جيب" صغير بين العين والجفن.
5. اقلب القنينة واضغط بشكل خفيف بمساعدة الإبهام والسبابة في مركز القنينة من أجل تطهير قطرة واحدة فقط في داخل "الجيب" الذي تكوّن. أغمض عينيك بلطف. يُمنع أن ترمش. استمر في إغماض عينيك لمدة 1 حتى 2 دقائق.
6. فوراً بعد تنقيط القطرة في العين، اضغط بواسطة الإصبع الوسطى على الزاوية الداخلية من العين. يجب الاستمرار في الضغط لمدة 1 حتى 2 دقائق بعد التنقيط في العين. تساعد هذه العملية في منع امتصاص الدواء داخل الجسم فتساعد بالتالي منع أعراض جانبية.
7. كرّر العملية 3-5 للعين الثانية إذا كانت هذه تعليمات الطبيب.
8. بعد استعمال الدواء، اغسل يديك جيداً لتنظيفها من بقايا الدواء.
9. لتجنب انتشار العدوى، يمنع استعمال نفس قنينة الدواء لأكثر من شخص واحد.
9. يُمنع استعمال هذا الدواء لأكثر من 28 يوماً بعد فتح القنينة لأول مرة.

إذا استعملت كمية دواء أكثر مما ينبغي عليك  
إذا قطرت كمية دواء في العين أكثر مما ينبغي أو إذا بلعت من محتوى القنينة، من ضمن باقي التأثيرات، قد تشعر بدوار،  
تختبر صعوبات في التنفس أو قد تشعر بتباطؤ في نظم القلب. إذا شعرت بواحدة من هذه الأعراض، يجب عليك التوجه  
للحصول على مساعدة طبية فوراً.  
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة  
الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

#### إذا نسيت استعمال الدواء

يجب الاستمرار في العلاج بحسب توصية الطبيب.  
إذا فوتت جرعة، يجب تنقيط الجرعة فور تذكرك ذلك. مع ذلك، إذا كان قد اقترب موعد الجرعة التالية، فوت الجرعة  
التي نسيته وارجع لجدول مواعيد العلاج العادية.  
يُمنع تنقيط جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة التي نسيته.  
حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

#### إذا توقفت عن استعمال الدواء

إذا أردت التوقف عن استعمال هذا الدواء، تحدث مع الطبيب أولاً.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع  
النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال دورزولاميد تيمولول تارو أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند  
قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أي منها.

توقف عن استعمال دورزولاميد تيمولول تارو وتوجه للحصول على مساعدة طبية فوراً، إذا كان يتطور لديك واحد من  
الأعراض التالية:

ردود فعل تحسسية عامة، وهذا يشمل انتفاخ تحت الجلد الذي ممكن أن يحدث في مناطق مثل الوجه والأطراف، أن يسد  
مجاري التنفس وأن يُسبب صعوبات في البلع أو في التنفس، شرى أو طفح جلدي مصحوب بحكة، طفح موضعي أو  
منتشر، حكة، رد فعل تحسسي مفاجئ شديد ويشكل خطراً على الحياة.

تمّ التبليغ عن الأعراض الجانبية التالية مع قطرات العينين التي تحتوي على المواد الفعالة دورزولاميد وتيمولول أو واحد  
منها خلال أبحاث سريرية أو خلال الاستعمال ما بعد التسويق.

أعراض جانبية شائعة جداً (ممكن أن تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملين):  
حرقة ووخز في العينين، اضطرابات في حاسة الذوق.

أعراض جانبية شائعة (ممكن أن تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):  
احمرار داخل وحول العين (العينين)، دمع أو حكة في العين (العينين)، تآكل القرنية (ضرر في الطبقة الأمامية من مقلة  
العين)، انتفاخ و/أو حكة داخل وحول العين (العينين)، شعور بوجود جسم غريب في العين، انخفاض الإحساس في

القرنية (عدم ملاحظة دخول شيء في العين وعدم الإحساس بالألم)، ألم في العين، جفاف في العينين، تشوش الرؤية، صداع، التهاب الجيوب الأنفية (إحساس بالضغط أو الامتلاء في الأنف)، غثيان، ضعف/تعب وإرهاق.

أعراض جانبية غير شائعة (ممكن أن تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000):  
دوار، اكتئاب، التهاب القرنية، اضطرابات في الرؤية بما في ذلك تغييرات التي تتعلق بانكسار إشعاع الضوء (في بعض الحالات، نتيجة لتوقف علاج مُقبَض الحديقة (miotic therapy)، الذي يقلص حدقة العين)، نبض بطيء، إغماء، صعوبة في التنفس (dyspnea)، سوء هضم وأحجار في الكلى (ينعكس في أحيان قريبة بالألم فجائي قوي، من تقلص، في الظهر السفلي و/أو في جنب الجسم، في أعلى الفخذ (أربية) أو في منطقة البطن).

أعراض جانبية نادرة (ممكن أن تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):  
الذئبة الحمامية الجهازية (مرض مناعي الذي ممكن أن يُسبب التهابًا في الأعضاء الداخلية)، وخز أو انعدام الإحساس في اليدين أو القدمين، أرق، كوابيس، فقدان الذاكرة، ارتفاع في علامات وأعراض مرض الوهن العضلي الوبيل (Myasthenia Gravis) (ضعف شديد في العضلات)، انخفاض في الرغبة الجنسية، سكتة دماغية، قصر نظر مؤقت الذي يمكن حله بعد إيقاف العلاج، انفصال الطبقة الموجودة تحت الشبكية التي تحتوي على أوعية دموية نتيجة عملية قطع التربيق (ترشيح سائل العين – Trabeculectomy) الذي ممكن أن يؤدي إلى اضطرابات في الرؤية، هبوط الجفون (الذي يؤدي إلى بقاء العين نصف مغلقة)، رؤية مضاعفة، غشاء الذي يتكوّن على الجفن، انتفاخ القرنية (مع أعراض اضطرابات في الرؤية)، ضغط منخفض داخل العين، رنين في الأذنين، ضغط دم منخفض، تغييرات في معدل أو سرعة النبض، قصور في القلب (مرض قلب المصحوب بضيق تنفس وانتفاخ في القدمين والساقين نتيجة تراكم السوائل)، وذمة (تراكم السوائل)، نقص التروية الدماغية (انخفاض في تزويد الدم إلى الدماغ)، آلام في الصدر، خفقان (نبضات قلب سريعة جدًا و/أو غير منتظمة)، نوبة قلبية، ظاهرة رينو، انتفاخ أو برودة اليدين والقدمين وانخفاض في تدفق الدم في الذراعين والساقين، تشنجات في الساقين و/أو ألم في الساق أثناء السير (عرج)، ضيق تنفس، خلل في أداء عمل الرنتنين (إحساس بالاختناق)، أنف سائل أو مسدود، نزيف من الأنف، تشنجات مجاري التنفس في الرنتنين التي تؤدي إلى صعوبات تنفس، سعال، تهيج في الحنجرة، جفاف في الفم، إسهال، التهاب جلدي نتيجة للمس، تساقط الشعر، طفح جلدي ذات مظهر بلون أبيض-فضي (طفح جلدي شبيه بالصدفية)، انحناء القضيب الذكري (الذي ممكن أن يسبب انحناء في القضيب)، ردود فعل تحسسية مثل طفح جلدي، شرى، حكة، وفي حالات نادرة ممكن ظهور انتفاخ في الشفتين، العينين والفم، صفير أو ردود فعل جلدية خطيرة (متلازمة ستيفنز-جونسون، تقشر الأنسجة المتموتة البشروية التسممي).

كما في أدوية أخرى للعينين، يتم امتصاص تيمولول في الدم. من الممكن أن يُسبب هذا الأمر أعراضًا جانبية شبيهة لتلك التي تظهر عند استعمال حاصرات بيتا التي تُعطى عن طريق الفم. شيوع الأعراض الجانبية بعد استعمال موضعي في العينين يكون أكثر انخفاضًا مما، مثلاً، في الأدوية التي يتم تناولها عن طريق الفم أو يتم حقنها. الأعراض الجانبية الإضافية المسجلة، تشمل ردود فعل التي تشاهد عند إعطاء أدوية من مجموعة حاصرات بيتا، عندما يتم استعمالها لعلاج مشاكل في العينين.

أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة (أعراض جانبية لم يتم تحديد تواترها بعد):  
مستويات منخفضة للسكر في الدم، قصور في القلب، نوع من الاضطراب في نظم القلب، ألم بطن، تقيؤ، آلام عضلات، التي لم تحدث نتيجة نشاط بدني، مشاكل في الأداء الجنسي، هلوسات، إحساس بوجود جسم غريب في العين.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

## التبليغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يخزن الدواء؟

تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقّيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

### شروط التخزين

يجب حفظه بدرجة حرارة تحت الـ 25°C.

يجب الحماية من الضوء.

احفظ في العبوة الأصلية.

بعد الفتح لأول مرّة يجب الاستعمال خلال 28 يوماً. لذلك، يجب إلقاء القنينة بعد 28 يوماً من فتحها، حتى إذا بقي فيها محلول.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. اسأل الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. إنّ هذه الوسائل تُساعد في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى الموادّ الفعّالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

Mannitol, hydroxyethyl cellulose, sodium citrate dihydrate, benzalkonium chloride, sodium hydroxide solution, water for injection.

### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

محلول مُعَمَّم-شفاف، وعديم اللون.

تحتوي كل عبوة على قنينة بلاستيكية بيضاء مع قطارة.

تحتوي كل قنينة على 5 ملل محلول.

### صاحب التسجيل وعنوانه:

تارو إنترناشيونال م.ض.، شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761.

### المنتج وعنوانه:

NTC s.r.l, Via Luigi Razza, 3-20124, Milan, Italy

تمّ تحريرها في أيلول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة: 152-22-33539-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.