

تراندلت أقراص

100 ملغ

المادة الفعالة ويكبيتها:

لابيتالول هيدروكلوريد

لابيتالول هيدروكلوريد

المواد الغالفة والمواد المساعدة في المستحضر - أنظر الفقرة 2 "معلومات

عامة عن بعض مركبات الدواء، إنما تقتصر هذه النشرة على

اقرء النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تقتصر هذه النشرة على

معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصحف هذه الدواء لعلاج مضارع، لا تطهيره لآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بما

أك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأي غرض مخصوص الدواء؟

دواء لعلاج كافة درجات ارتفاع ضغط الدم.

الخصبية العلاجية: من حاجيات أقل وبثنا.

(2) قبل استعمال الدواء

لا يستعمل الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لل المادة الفعالة لابيتالول هيدروكلوريد أو لكل واحد

من المركبات الإضافية التي تحيطها الدواء (أنظر الفقرة 6).

• كنت تعاني من مشكلة معينة في القلب (مثل إصصار القلب من الدرجة الثانية

أو الثالثة عدا إذا وجد لديك ناتمة قلبية، قصور قلبي غير معالج).

• كنت تعاني من احتقان ضغط الدم.

• كنت تعاني من نفخة صدرية من نوع

Prinzmetal angina (variant angina)

• كنت تعاني من دبو أو من مرض رئوي مشابه (مرض إنسدادي في الطرق

التنفسية).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج - تراندلت، إحدى الطيب إذا:

• كنت تعاني من خلل في الأداء الوظيفي للقلب أو من تضرر الكبد

• كنت تعاني من خلل في الجهاز الهضمي الكولي

• كنت تعاني من مرض في الأداء الوعيي الدموي مثل متازمه رينو (syndrome of Raynaud's)

• كنت تعاني من سكري من نوع 1 أو من نوع 2

• كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (thyrotoxicosis - hyperthyroidism)

• عانت في الماضي من رد فعل تحسسي شديد (صدمة إستهدافية

الصادمة ما (shock

• كنت تعاني من قصور في القلب أو من أمراض قلبية أخرى [مثل: إضطراب في

الأداء الوظيفي الإنقباضي (تضيق) في البطين الأيسر للقلب أو إصمار أذيني

بطيني (atrioventricular block من الدرجة الأولى)]

• كنت تعاني من احتقان جراحية ما

• كنت تعاني من احتقان استقلاني (عندما يفتح جسمك كمية أكبر مما ينتهي من

الجسم أو عندما لا تطهر الكلب لديك كمية كافية من الجسم)

• كنت تعاني من ورم القاتون (نوع معين لورم في الغدة الكظرية)

• كنت تعاني من حالة سمي مرض قلبي إنفراقي

إذا وجده لديك ظلم قلبي، بطء قلبي (cardiac shock) فإن تناول تراندلت، من الجائز

إذا قويم طبلط خفض المقدار الدوائي من الدواء.

إذا تطور لديك طفح جلدي / أو حفاف في العينين أو رد فعل تحسسية خلال

تناول الدواء، اطلب الطبيب عن ذلك، حيث أنك من الجائز أن توافق على تخفيض المقدار

الدوائي الخاص بك أو بوقف العلاج. يجب دائماً اتباع تعليمات الطبيب.

إذا يحور التوقف عن العلاج بالدواء واحدة، خاصة إذا كنت تعاني من مرض

قلبي (مرض قلبي إنفراقي أو نوبة صدرية)، توجه إلى طبيبك إذا كنت تعتقد بأن

عليك التوقف عن العلاج بالدواء.

العمليات الجراحية

إذا كنت قبلاً على إجراء عملية جراحية التي تتطلب التخدير العام، يجب إبلاغ

الطبيب الجراح قبل العلاج بأقل من 24 ساعة.

يمكن أن يؤثر لابيتالول على الحدقةين لديك خلال عملية جراحية في العينين

(كتاراتاك)، لذا قبل عملية جراحية يجب إبلاغ الطبيب الجراح عن استعمال هذا

الدواء، لا يجوز التوقف عن إستعمال الدواء قبل عملية جراحية إلا إذا ثقت إرشادات

من الطبيب الجراح بفضل ذلك.

الخداعات/التناقضات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، إذا تستعمل مؤخرًا أو قد تستعمل، أدوية أخرى بما في

ذلك أدوية بدون صفة طبية وأضافات غذائية، إحدى الطبيب أو الصيدلي

عن ذلك، بالأخص إذا كنت تستعمل:

• مضادات الالتهاب الستيرويدية أو أدوية مضادة للروماتيزم (NSAIDs)

التي تستعمل لعلاج الألم والإثبات (مثل سوليندوك أو إينديندياسيين)

• بيجوكسین (العلاج من أمراض قلبية)

• أربينالين (العلاج ردود فعل مستهدافية (حساسية) خطيرة)

- أدوية لعلاج مشاكل قلبية (التنظيم نظم القلب من نوع 1 مثل ديزوبيراميد ويكبيتين، التنظيم نظم القلب من نوع 2 مثل أميدورون) أووية أخرى لخفض ضغط الدم (جاجات، قنوات الكالسيوم مثل فيراباميل) مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة لعلاج الاكتئاب (مثل إيمبرامين) أووية لعلاج الفرقعة العصبية أو المرقان (مثل سلفوريل بوريا) أووية لعلاج السكري، التي تعطي غير المفهوم نسبة السكر في الدم، مثل بيوبيونيدات (مثل ميفورومين)، أووية من فصيلة سلفوريل بوريا (مثل جيلبيبريد، موجيلينيدات (مثل رباجيلينيد) ومثبتات آغا - جلوكيوزيدات (مثل أكاربور).
- أدوية لعلاج الشقيقة، مثل مشتقات الإرجهوتامين (مثل دروجوتامين أو ديدروبارجوتامين) أووية لعلاج اضطرابات طفيفة في الأداء الوظيفي الإدراكي، مرض ألزهايمر ومرض باركنسون - مثبتات كولين إستراز، مثل: دونينبيزيل، جالاتامين أو ريفاستيدينين.
- نباتات أدوية مضادة للذهان (مثل فينيوثريازينات، كلورپرومازين) وأدوية مضادة للكتاب (كلونيدين) (العلاج ارتفاع ضغط الدم)

الخصوص الطبية
يمكن أن يؤثر الدواء على نتائج الفحوص الطبية أو فحوص مخبرية معينة ويؤدي إلى نتائج ذات قيمة خاطئة. قبل إجراء فحوص طبية أو فحوص مخبرية، يجب إبلاغ الطبيب الطبي بأنك تتناول تراندلت.

الحمل الإرثي واستعمال المكبات
إذا كنت في فترة الحمل أو تخطي العمل، يجب استشارة الطبيب قبل تناول تراندلت. من الجائز أن يؤثر الجنين، لكن عند الحاجة بالإمكان إستعمال الدواء خلال الحمل. يطرد الدواء في حليب الأم بكميات قليلة، بلغ عن الم في الملة وظاهرة رينو في العضة (انظر الفقرة 4) إذا كنت مرضعة، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال تراندلت.

السيادة واستعمال المكبات
من غير المتحمل أن يؤثر تراندلت على القدرة على السيادة أو على إستعمال المكبات، مع ذلك، قد يتغير سلوك الآخرين بدوره / أو إزعاج، كن على دراية بأنه من الجائز أن تتأثر قدرتك على الرغيف، وبالتالي يتصرف بمحنة بذريع حتى تتعدى على استجابتك للدواء، إن إتخاذ القرار فيما إذا حالت مناسبةقيادة ناتجة ذات محنة أو إزعاج مهمات أخرى تتطلب ترتيب زاده هو على عاتقك فقط.

أحد العوامل الذي يمكن أن يتضاعف قدرتك على إجزاء هذه الشاشات هو استخدامه للأدوية، جراء تأثيرها / أو إعراضها الجانبية، وصفع لهذه الأعراض والأعراض جانبية أخرى يمكن أن تتجدد في فقرات أخرى. إن إتخاذ القرار فيما إذا حالت مناسبةقيادة لائق إرهازات، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم يكن واثقاً.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

3 كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال الدواء تبع تعليمات الطبيب.
عليك الإستياضاح عن الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.
المقادير الدوائية وطريقة العلاج يهدى دينار من قبل الطبيب فقط.

من الجائز أن يؤثر الطبيب دوائي مخفف لمعالجين كبار أو لمعالجين الذين يتعافون من احتقان اضطرابات في وظائف الكبد.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

يجب تناول الدواء بالملعوم.

لا يجوز مضاعف شرعاً أو لفترة الطوارئ في المستشفى وأخذه على الدواء معل.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

أعراض تناول مقدار دوائي مغفرطن دوار شديد عند التوضّع من

ووضعية الجلوس إلى الورق أو من وضعية الاستلامة إلى الجلوس وأحياناً إلى

باتياطه في نظم القلب الذي يشعر به كثيف بطيء - بطيء (القلب).

إذا تناولت مقداراً دوائياً مغفرطاً أو إذا بلغ طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء،

توجه حالاً إلى الطبيب أو لفترة الطوارئ في المستشفى وأخذه على الدواء معل.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذه الداء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقدار دوائي

مضاعف. يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

يجب المطالبة على الدواء حبس نصوص الطبيب.

إذا تناولت الدواء في العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العفة! يجب تشخيص طابع الداء واتباعه فيما إذا

المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا

لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية حول هذا الداء، إستشر الطبيب أو الصيدلي

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تراندلت قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين.

لا تنتهي من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعي أنا منها.

يجب التوجه حالاً للطبيب إذا ظهرت إحدى الحالات الآتية (نادرة جداً

وظهورها لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

ـ ذئبة إصرارية جهازية تؤدي إلى أعراض مثل: آلام في المفاصل، سخونة، طفح

شربة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

بسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لابيتالول هيدروكلوريد

لابيتالول هيدروكلوريد

المواد الغالفة والمواد المساعدة في المستحضر - أنظر الفقرة 2 "معلومات

عامة عن بعض مركبات الدواء، إنما تقتصر هذه النشرة على

اقرء النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تقتصر هذه النشرة على

معلومات موجزة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلحة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصحف هذه الداء لعلاج مضارع، لا تطهيره لآخرين فهو قد يضرهم حتى ولو بما

أك أن مرضهم مشابه لمرضك.

(1) لأي غرض مخصوص الداء؟

دواء لعلاج كافة درجات ارتفاع ضغط الدم.

الخصبية العلاجية: من حاجيات أقل وبثنا.

(2) قبل استعمال الدواء

لا يستعمل الدواء إذا:

• كنت حساساً (الergicي) لل المادة الفعالة لابيتالول هيدروكلوريد أو لكل واحد

من المركبات الإضافية التي تحيطها الدواء (أنظر الفقرة 6).

• كنت تعاني من مشكلة معينة في القلب (مثل إصصار القلب من الدرجة الثانية

أو الثالثة عدا إذا وجد لديك ناتمة قلبية، قصور قلبي غير معالج).

• كنت تعاني من احتقان ضغط الدم.

• كنت تعاني من نفخة صدرية من نوع

Prinzmetal angina (variant angina)

• كنت تعاني من دبو أو من مرض رئوي مشابه (مرض إنسدادي في الطرق

التنفسية).

جلدي وإرهاق

- عدمقدرة التبول على التبول بالرغم من إملاة المثانة البولية (هذه الحالة عبارة عن حالة طيبة طارئة)
- ونمة وعائية (وذمة تحبسسة) التي يمكن أن تؤدي إلى أعراض التي تشمل انتفاخ في الشفرين، في الوجه وفي اللسان، التي قد تؤدي إلى صعوبات في التنفس
- أعراض جانبية إضافية
- **أعراض جانبية شائعة جداً (very common)** - تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:
- أصداف ليس لها علاقة بالمرض.

- **أعراض جانبية شائعة (common)** - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:
- قصور القلب

- قيم مرتفعة لغصون وظائف الكبد. عادة تعود هذه القيم لتصبح سليمة بعد التوقف عن الملاج بالدواء
- دوار، صداع، شعور بوخز في فروة الرأس، التي عادة تكون مؤقتة ويمكن أن تظهر خلال الأسابيع الأولى من العلاج
- تشنج الرؤبة

- صعوبات في التنفس
- دوار، جراء إنخفاض في ضغط الدم عند النهوض بشكل أسرع مما ينبغي

- من وعصة الاستئناء إلى الجلوس أو من الجلوس إلى الوقوف (postural hypotension)

- هذه الحالة شائعة أكثر عند تناول مقدار دوائي مرتفع جداً أو إذا كان المقدار الدوائي الإيثراني مرتفع أكثر مما ينبغي أو إذا تم رفع المقدار الواثي بشكل سريع أكثر مما ينبغي، عادة هذه الأعراض هي مؤقتة ويمكن أن تظهر في الأسابيع الأولى من العلاج

- إحتجاج في الأنف الذي هو عادة مؤقت ويمكن أن يظهر خلال الأسابيع الأولى من العلاج

- غثيان

- لدى الرجال: إضطرابات في انتصاب العضو الذكري (عجز جنسي) وقد تحدث للنقط

- إرهاق وقلة طبيوية - عادة تكون مؤقتة ويمكن أن تظهر خلال الأسابيع الأولى من العلاج

- ردود فعل تحبسسة (فرط حساسية) التي يمكن أن تشمل طفح (يرجحات متقارنة)، حكة، صبغ في التقىن وفي أحيان نادرة جداً سخونة أو انتفاخ سريع للجلد.

- **أعراض جانبية غير شائعة (uncommon)** - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

- إكتئاب - عادة يكون مؤقت ويمكن أن يظهر خلال الأسابيع الأولى من العلاج
- تضيق المطر التنفسية السفلية (bronchospasm)

- تقيؤات وألم في البطن تحت الأصلع

- تعرق - عادة يكون مؤقت ويظهر خلال الأسابيع الأولى من العلاج

- تقلصات عضلية.

- **أعراض جانبية دائرة (rare)** - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

- تباطؤ في نظم القلب الذي يتم الشعور به على شكل تبخر بطيء (bradycardia).
- **أعراض جانبية نادرة جداً (very rare)** - تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000:

- إضطرابات في النبضات (الإشارات) الكهربائية التي تتحكم بنظم القلب (إحصار القلب)

- إلتهاب الكبد (hepatitis)، الذي عادة يمكن أن يعود إلى الحالة السليمة بعد توقف عن تناول الدواء

- يرقان في خلايا الكبد (اصفار الجلد وبياض العينين)، يرقان ركود الصفراء

- (الأعراض تشمل إرهاق وغثيان بتراشقان بمحكة، بول يلون بأكمل ويرقان، ويمكن أن تشمل طفح جلدي أو سخونة) ونخر في الكبد (hepatic necrosis).

- تضرر نسيج الكبد، تعود لتصبح هذه الأعراض سليمة عادة بعد التوقف عن العلاج بالدواء.

- إشتباه أعراض متلازمة رينو (Raynaud's syndrome) (برودة الأصابع جراء انتفاخ في جريان الدم)

- انتفاخ في الكاحلين - عادة يكون هذا العرض الجانبى مؤقت ويحدث خلال الأسابيع الأولى من العلاج

- إلتهاب العضلات وضعف جراء تناول الدواء (toxic myopathy)

- إرتياح عندما يستعمل تراشت لعلاج إرتفاع ضغط الدم لدى النساء الحوامل
- تبكيج في العين

- ألم في الحلمة

- إنتفاخ دوري في جريان الدم إلى الحلمتين، الأمر الذي قد يؤدي إلى خدر في الحلمتين وإلى شحوب وألم في الحلمتين (ظاهرة رينو).

- إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاشرى من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

- **التنبيه من أعراض جانبية:** بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان تبلیغ شرکة بادادجیس بواسطة العنوان التالي:

<https://sideeffects.health.gov.il>

Padagis.co.il

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي وموال حاوية الأطفال / أو الرضع وذلك لقدرتي إصabitهم بالتسنم، لا تسبب تقطيف بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp.date) الذي يظهر على ظهر علبة الكترون وموصفة الفنية. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين دون 30 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الأدوية إلى المحراري أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التصرف بأدوية لم تعد قيداً لاستعمالك بعد. إن إتخاذ هذه الخطوات يساعد في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

- يحتوى الدواء بالإضافة لل المادة الفعالة أيضاً:
- Microcrystalline cellulose, Lactose anhydrous, Magnesium stearate, Opadry Orange 02A230001 [Hypromellose 5cP, Titanium dioxide, Sunset Yellow FCF (E110), Sodium benzoate].

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى المادة:

- أعراض تراشت 100 ملغ تتوفر ضمن قنفية بلاستيكية حيث تحتوي على 50 قرصاً مستديراً ووحيداً، مطلية بلون بروتالي، مع الطباعة -TT01 في جانب واحد.
- أعراض تراشت 200 ملغ تتوفر ضمن قنفية بلاستيكية حيث تحتوي على 50 قرصاً مستديراً ووحيداً، مطلية بلون بروتالي، مع الطباعة -TT02 في جانب واحد.
- أصحاب الإمتياز: وكالات بادادجیس إسرائيل، م.ض.، شارع راكفيت، 1، شوهم.
- تم إعدادها في توزير 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 2086.27785.
- تراشت أعراض 100 ملغم: 2084.27786.
- من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت بيانها بهذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.