

## فوسيكورت كريم

التراكب: فوسيكورت كريم يحتوي على حمض الفوسبيديك (Fusidic acid) بتركيز 2% و - بيتاميثازون

%0.1 Betamethasone (as valerate)

مواد غير فعالة وموجات في الدواء - انظر بند 6 "معلومات إضافية" و بند 2 "معلومات هامة عن قسم من مستحضرات الدواء".

إقرأ النشرة بأمعان حتى تهابتها قبل أن تستعمل الدواء، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء للعلاج من أجلك، لا تطعه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن وضعهم الصحي ممتاز.

### 1. لأى غرض مخصوص الدواء؟

لعلاج التهابات الجلد من أنواع مختلفة، مثل الإكزيما (Eczema)، التي يوجد بها تلوث جرثومي ثانوي.

الفعالية الطبية:

فوسيكورت كريم يحتوي على مادتين فعاليتين مختلفتين: حمض الفوسبيديك وهو نوع من المضادات الحيوية، بيتاميثازون فاليرات، وهو نوع من الكورتيكosteroid (ستيرويد).

تعمل كلتا المادتين الفعاليتين بشكل متزامن بطرق مختلفة.

فوسيكورت كريم يعمل بالشكل التالي:

• المضاد الحيوي يقتل البكتيريا التي تسبب التلوثات.

• الكورتيكosteroid يقلل أي انتفاخ، احمرار أو حكة في جلد.

الفصيلة العاجية: توسيعه من كورتيكosteroid (ستيرويد) مع مضاد حيوي.

### 2. قبل استعمال الدواء:

لا يجوز استعمال الدواء

• إذا كانت أساساً (أرجي) للسواد الفعال (حمض الفوسبيديك أو بيتاميثازون فاليرات)، أو لأى واحد من المستحضرات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر بند 6).

• لعلاج مشكلة جلد تجم من فطريات (مثل فطريات كف القدم).

• لعلاج مشكلة جلد تجم من جراثيم قطب (مثل فطريات يجحية أو حب الشباب).

• لعلاج مشكلة جلد تجم من الشلل أو الزهرى.

• لعلاج أحمر يشكل نقاط حول الفم أو الذقن.

Perioral dermatitis جلد تجم على الشفاه (Rosacea). إنه احمرار والتهاب على الأنف والوجنتين.

تحذيرات خاصة بخصوص استعمال الدواء:

• لا تستعمل الكريم على نفسك أو على طفل لمدة أكثر من أسبوعين؛ وهذا لكي تمنع تطور جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية وتهدى الأعراض الجائحة التي قد تحدث لديك بسبب الستيرويد.

لا يجوز استعمال جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب الدعاومة على العلاج كما أوصى من طبيب.

حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملحق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلية إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 3. الأعراض الجانبية:

أعراض جانبية مهمة التي يجب الانتباها لها:

يجب التوجه فوراً للطبيب عند ظهور الأعراض التالية: قد تحتاج لإيقاف العلاج:

• كنت تواجه صعوبة في التنفس.

• يتورم وجهك أو حلقك.

• يطير جلدك طفحاً وخيفاً.

كل أي دواء، قد يسبب استعمال فوسيكورت كريم أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن لا تعي من أي واحد منها.

أعراض جانبية مهمة التي يجب الانتباها لها:

يجب التوجه فوراً للطبيب عند ظهور الأعراض التالية: قد تحتاج لإيقاف العلاج:

• كنت تواجه صعوبة في التنفس.

• يتورم وجهك أو حلقك.

• يطير جلدك طفحاً وخيفاً.

كم تتم التبليغ عن الأعراض الجانبية الأقل وقوعاً ممكن: التوجه للطبيب بأقرب وقت ممكن.

الاحتمالية ظهور كل واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية يرتفع إذا استعمل الدواء لفترة طويلة، بكميات كبيرة أو بمنطقة طيات الجلد (مثل تحت الأنف أو تحت العين).

الاحتمالية ظهور هذه الأعراض الجانبية أعلى لدى الرضع والأطفال.

الاحتمالية ظهور الأعراض الجانبية أعلى إذا كانت المنطقة مطهاة بضمادة أو حفاظ.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

• طفح مع حكة والتهاب الجلد بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

• تفاقم الإكزيما.

• شعور بالحرقان.

• حكة.

• جفاف في الجلد.

• الالتباس بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

• تبيح بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

• أحمرار الجلد.

- يحتوي الدواء على Chlorocresol. هذه مادة حافظة يمكن لهذا المركب أن يسبب لك تفاعلاً أرجياً.
- الرجاء اقرأ بند 4 كي تتمكن من ملاحظة علامات لذلك حينما يحدث هذا الوضع معك.
- إذا كنت تستخدم الطبيب إذا كنت قلقاً حول أي واحد من المركبات في هذا الدواء.
- يجب دائماً الاستعمال وفقاً لتوجيهات الطبيب. عليك التتحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً بخصوص البراعة وطريقة استعمال الدواء.
- طريقة استعمال فوسيكورت كريم هذا الدواء مخصوص للاستعمال على جلدك أو جلد الطفل فقط. لا يجوز بلع الدواء، الدواء مخصوص للاستعمال الخارجي فقط.
- انتزع الخطاء، قبل الاستعمال في المرة الأولى تتحقق من سلامة الجزء الذي يسد الأنفية. بعد ذلك انتبه الجزء الذي يسد الأنفية بمساعدة الثقب الذي في الخطاء.
- يجب غسل اليدين قبل استعمال فوسيكورت كريم. يجب تدليك الكريم على الجلد ببطء. إذا كنت تستعمل الكريم على وجهك أو وجهك أو وجهك أو عيني الطفولة.
- يجب غسل اليدين دائمًا بعد استعمال فوسيكورت كريم، إلا إذا كنت تستعمل الكريم لعلاج دايك.
- إذا لامس الدواء عن طريق الخطأ عينيك أو عيني طفل، يجب الغسل فوراً بماء بارد. بعد ذلك يجب غسل العينين بمحلول شطف العينين إذا مكن فعل ذلك. قد تشعر بإحساس حرقة في العين. إذا بدأت تعاني من مشاكل بالرؤية أو ألم بالعينين، توجه إلى الطبيب فوراً.

### الجرعة وموعد العلاج

الجرعة وطريقة العلاج تحدده من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

منصة طيبة واصفات العلاج المتعدة في حتى أسبوعين. استشر طبيب قبل استعمال الدواء لفترة زمنية أطول.

يفترض أن تتحسن تحسناً في الجلد بعد عدة أيام من استعمال الكريم. إذا لم يطرأ تحسن بعد 7 أيام، يجب إيقاف استعمال الكريم والتوجه للطبيب.

عادة يجب استعمال هذا الدواء مرتين في اليوم. استعمل الدواء في الصباح وفي المساء. كي تذكر نفسك

باستعمال الدواء، قد يساعدك إذا استعملته في الوقت الذي تقوم به بنشاط يومي آخر مثل تنظيف الأسنان.

إذا قيل لك بأن تغطي الجلد بضمادات، قد لا تحتاج إلى استعمال الدواء بفترات متقاربة.

في هذا السياق، حفاظ الطفل قد يعلم بضمادة. يجب اتباع أوامر طبيب.

إذا استعملت فوسيكورت كريم أكثر مما كنت بحاجة إليه

قد تضرر إلى إيقاف استعمال هذا الدواء.

إذا بلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت استعمال الكريم في الوقت المطلوب، يجب استعماله فوراً تذكر. بعد ذلك استمر باستعمال الدواء

في الوقت العادي.

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وأو الرضع

و مجال روائحه وذلك تمنع التسمم. لا تسبب التسمم تلوينات صريرة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (EXP) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين: خزن دون 30 درجة مئوية.

لا يجوز استعمال الدواء لأكثر من ثلاثة أشهر بعد الفتح الأولي. اكتب على ظهر عبوة الكرتون في المكان الذي يحصلن ذلك تاريخ الفتح الأولي.

لا يجوز رمي الأدوية في الماء أو في سلة النفايات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تُعد مستعملة. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

### 6. معلومات إضافية

إضافة للمركبات الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:

White soft paraffin, cetostearly alcohol, liquid paraffin, macrogol cetostearyl ether, sodium dihydrogen phosphate dihydrate, chlorocresol, sodium hydroxide, purified water, all-rac- $\alpha$ -tocopherol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: أنبوة التي تحتوي على 15 غرام كريم بلون أبيض.

اسم المنتج وعنوانه: لينو لبوراتوريز إل. تي. دي، ديلين، إيرلندا

تم التفقي في آب 2022 حسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 00-26527-030-566-056.

من أجل التسوييف وتسييل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، المعلومات في النشرة والدواء مخصوصة لأبناء كلا الجنسين.

صاحب التسجيل: دكسل م. ض.

شارع دكسل 1، أور عكيفاً 3060000، إسرائيل

- اتخذ وسائل حذر إذا كنت تنتوي استعمال فوسيكورت كريم قرب عينيك أو عيني طفل. قد تسبب ملامسة الكريم العينين جلوكوما.
- توجه إلى الطبيب إذا كنت تواجه تشوش في الرؤية أو اضطرابات رؤية أخرى.
- إذا كنت تستعمل فوسيكورت كريم لمدة متواصلة أو يكملات كبيرة، قد يسبب جلدك أكثر حساسية لهذا الدواء.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء على شرة الوجه لفترة زمنية متواصلة.
- لا يجوز استعمال فوسيكورت كريم على جروح متوقفة أو مناطق حساسة مثل: المنقرين، الأنفين، الشفتين أو أعضاء التناسل، إلا بأمر طبيب.
- لا يجوز استعمال فوسيكورت كريم على جلد رقيق، تقرحات بالجلد، أو ردة عنصرية أو حب شباب، إلا بأمر طبيب.
- قد يحصل كبت للغدة الكظرية. أعراض ذلك هي ارهاق، اكتئاب وقلق. هذا الوضع قبل العكس عند إيقاف فوسيكورت كريم.

لا يجوز التدخين أو الاقتراب من نار مشكوفة - احتضار لحرق وخيماً. قماش (ملابس، أغطية سرير، ضمادات وما شابه) الذي يلاقي هذا المستحضر، يتشتعل بسهولة أكثر وبشكل خطير اشتغال وخيماً.

لا يجوز التدخين أو الاقتراب من نار مشكوفة - احتضار لحرق وخيماً. قماش (ملابس، أغطية سرير، ضمادات وما شابه) الذي يلاقي هذا المستحضر، يتشتعل بسهولة أكثر وبشكل خطير اشتغال وخيماً.

إذا حدث تناول في الأدواء أو وضعك بيئة علاجية أخرى، لا يجوز تناول الدواء رد فعل تحسسي، لديك

إذا كنت تعيش عودة عدوة وضعك بعد وقت من التوقف عن العلاج، خلال أسبوعين، لا تستعمل الكريم مجدداً من دون استشارة الطبيب، إلا إذا اضحك الطبيب بفعل ذلك من قبل.

إذا اقتنصت حالتك، وعادت مرة أخرى مع احمرار منشر إلى ما بعد منطقة العلاج الأولى و كنت تعيش شعوراً بالحرقان، استشر الطبيب قبل بدء العلاج من جديد.

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، أو أخذت في الأونة الأخيرة، أو إذا كان من المحتمل أن تأخذ أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طيبة وأصناف تغذية، أخير الطبيب أو الصيدلي.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاماً أو مرضعة، تعتقدين بذلك قد تكونين حاماً أو تخططن للدخول في الحمل.

استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء.

إذا كنت حاماً أو تعتقدين بذلك قد تكونين حاماً: لا يجوز استعمال فوسيكورت كريم خلال الحمل، إلا بأمر طبيب.

إذا كنت مرضعة: يجوز استعمال فوسيكورت كريم لدى النساء المرضعات، لكن لا يجوز دهن الكريم على

الثديين، وذلك لمنع بلعه عن طريق الخطأ من قبل الطفل.

أخير الطبيب إذا كنت قد دخلت في حمل أثناء استعمال هذا الدواء.

### السيادة واستعمال الآلات

من غير المتوقع أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السيادة أو تشغيل الآلات. استشر

الطبيب إذا كنت تشعر بأعراض جانبية التي قد تمنعك من السيادة أو تشغيل الآلات.

### معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي الدواء على alcohol alcohol Cetostearly alcohol. قد يسبب لك هذا المركب طفحاً مثير للحكة والتهاب على

الجلد في مكان استعمالك للدواء.

### معلومات جانبية

إذا كنت تتناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملحق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

لا تفرغ من قراءة النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلية إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

لا يجوز استعمال جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب الدعاومة على العلاج كما أوصى من طبيب.

حتى لو طرأ تحسن على وضعك الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.

لا يجوز تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملحق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس.

• يتورم وجهك أو حلقك.

• يطير جلدك طفحاً وخيفاً.

كل أي دواء، قد يسبب استعمال فوسيكورت كريم أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن لا تعي من أي واحد منها.

أعراض جانبية مهمة التي يجب الانتباها لها:

يجب التوجه فوراً للطبيب عند ظهور الأعراض التالية: قد تحتاج لإيقاف العلاج:

• كنت تواجه صعوبة في التنفس.

• يتورم وجهك أو حلقك.

• يطير جلدك طفحاً وخيفاً.

كم تتم التبليغ عن الأعراض الجانبية الأقل وقوعاً ممكن: التوجه للطبيب بأقرب وقت ممكن.

الاحتمالية ظهور كل واحد أو أكثر من الأعراض الجانبية يرتفع إذا استعمل الدواء لفترة طويلة، بكميات كبيرة أو بمنطقة طيات الجلد (مثل تحت الأنف أو تحت العين).

الاحتمالية ظهور هذه الأعراض الجانبية أعلى لدى الرضع والأطفال.

الاحتمالية ظهور الأعراض الجانبية أعلى إذا كانت المنطقة مطهاة بضمادة أو حفاظ.

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):

• طفح مع حكة والتهاب الجلد بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

• تفاقم الإكزيما.

• شعور بالحرقان.

• حكة.

• جفاف في الجلد.

• الالتباس بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

• تبيح بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):

• أحمرار الجلد.

• انتفاخ بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

• تبيح بالمنطقة التي تم بها استعمال الدواء.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "DIAHO" على توضيعات 101ا

ل JACK 101 تلوفات" الموجود في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il))

للاستمارنة الإلكترونية للتبيح عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>