

نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصياغة (مستحضرات) 1986

يُسلِّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

لوسارتا بولوس

أقراص

يحتوي كلِّ قرص على:

لوسارتان بوتاسيوم 50 ملغ
Losartan Potassium 50 mg
هيدروكلوروثيازيد 12.5 ملغ
Hydrochlorothiazid 12.5 mg
لا تتلاصق على قائمه المواد غير الفعالة ومسيبات الأرجية انظر البنند 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" و البنند 6 "معلومات إضافية"

أقرأ النشرة بامعان حتَّى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

• تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن **لوسارتا بولوس**.

إذا توقّفت لديك أسئلة إضافية، فاسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

• لقد وُصف هذا الدواء من أجل علاجك لا تحمله لأخريين. قد يضرّهم هذا الدواء حتّى لو بدا لك أنّ حالتهم الطّبيّة مشابهة لحالتك.
لوسارتا بولوس غير مخصّص للأولاد والمراهقين الذين سنهم دون 18 ل.

1. لأيّ غرض مخصّص هذا الدواء؟

لوسارتا بولوس مخصّص لعلاج فرط ضغط الدم، وكذلك للمساهمة في تخفيف خطر الإصابة بسكتة دماغية لدى المرضى المصابين بفرط ضغط الدم وتضمخ الطين الأيسر (الحجرة الرئيسية) في القلب.
الفصيلة العلاجية: لوسارتا بولوس عبارة عن دمج بين حاصر مستقبل الأنجيوتنسين II (لوسارتان) ومُزَمِّر البول من نوع الثيازيد أنجيوتنسين II عبارة عن مادة يتم إنتاجها في الجسم، ترتبط بمستقبلات في الأوعية الدموية وتؤدي إلى تضيقها. ينجم عن ذلك ارتفاع في ضغط الدم.
يتمع لوسارتان ارتباط أنجيوتنسين II بهذه المستقبلات ويؤدي إلى ارتخاء الأوعية الدموية، وإلى خفض ضغط الدم نتيجة لذلك.

يعمل هيدروكلوروثيازيد عن طريق جعل الكليتين تمرران المزيد من الماء والملح عبرهما. يساعد هذا الشيء أيضًا على خفض ضغط الدم.

2. قبل استعمال الدواء:

❗ لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حاسنًا (أرجيًّا) للوسارتان، لهيدروكلوروثيازيد أو لأيّ واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء. (انظر معلومات إضافية في البنند 6).
- كنت حاسنًا (أرجيًّا) لمواد أخرى من مشتقات السولفوناميدات (مثل: ثيازيدات أخرى، بعض الأدوية المضادة للجراثيم مثل كورتيموكسازول، أسأل الطبيب إذا لم تكن متأكدًا).
- كان لديك خلل شديد في وظيفة الكبد.
- كانت لديك مستويات منخفضة للبتاسيوم، مستويات منخفضة للصوديوم أو مستويات مرتفعة للكالسيوم، والتي لا يمكن تعديلها عن طريق العلاج.
- كنت تعاني من النقرس (جوارت).
- كنت حاملًا لأكثر من 3 أشهر (يفضّل أيضًا الامتناع عن استعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، انظري الفصل "الحمل، الإرضاع والحصوية")
- كان لديك تضمر شديد في وظيفة الكليتين أو أن كليتيك لا تتجان البول بنتاق.
- كان لديك سكري أو خلل في الوظيفة الكلوية وكنت تستعمل دواءً لخفض ضغط الدم يحتوي على اليكسيريين.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء:

تحدّث مع طبيبك، مع الصيدلي أو مع المرمرضة قبل أن تستعمل الدواء.
إذا نشأ لديك انخفاض في الروية أو ألم في العين، فقد يكوننا عرضين لتراكم السوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو لارتفاع الضغط في العين، ومن الممكن أن يظهر في غضون ساعات إلى أسابيع من لحظة تناول **لوسارتا بولوس**. إذا لم تتم معالجة هذه الحالة، فقد تؤدي إلى فقدان

دائم للبصر. إذا كانت لديك في الماضي أرجية ليليبيين أو لسولفوناميد، فقد تكون أكثر عرضةً لخطر تطوير هذه الأعراض.
يتوجّب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تطّئين كآك حامل (أو قد تحطّئين). لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، ويتمع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا شديدًا لطفلك.
إذا استعملت في هذه المرحلة (انظري الفصل "الحمل، الإرضاع والحصوية")

❗ قبل العلاج بالدواء، أخبر الطبيب إذا:

- كانت لديك مشاكل في التنفّس أو مشاكل في الرئتين (بما في ذلك التهاب أو وجود سائل في الرئتين) بعد تناول هيدروكلوروثيازيد في الماضي. إذا نشأ لديك ضيق التنفّس الحظير أو صعوبات في التنفّس بعد تناول **لوسارتا بولوس**، فتوجه فورًا لتلقي العلاج الطبي.
- عانيت في الماضي من انتفاخ الوجه، الشفتين، الحلق أو اللسان.
- كنت تستعمل مُزَرِّات البول.
- كنت تتنّع حمية غذائيّة قليلة الملح.
- كنت تعاني أو عانيت من توقّظات وأ/و حالات إسهال شديدة.
- كان لديك قصور القلب.
- كان لديك خلل في وظيفة الكبد (انظر البنند 2 "لا يجوز استعمال الدواء إذا").
- كان لديك تضيق في الشرايين المؤدّيتين إلى كليتيك (تضيق شرياني الكلية) أو إذا كنت لديك كلية واحدة نشطة فقط، أو إذا خصّعت مؤخرًا لزراعة الكلية.
- كان لديك تضيق في الشرايين (تصلّب الشرايين)، ندحة صدرية (الأم في الصدر نتيجة لتدني وظيفة القلب).
- كان لديك تضيق في الصمام الأبهري أو الميتزالي (تضيق صمامات القلب) أو اعتلال عضلة القلب الضخامي (مرض يسبّب تضخّم عضلة القلب).
- كنت تعاني من السكري.
- كان لديك نقرس (جوارت).
- كانت لديك الأن أو كانت لديك في الماضي حالة أرجية، ربو أو حالة تشبّب الألام في المفاصل، الطفح الجلديّ والحمي (لويوس النذية الحمامية المجموعه)).
- كانت لديك مستويات مرتفعة للكالسيوم أو مستويات منخفضة للبتاسيوم أو كنت تتنّع حمية غذائيّة قليلة البوتاسيوم.
- كان عليك الخضوع للتخدير (حتّى عند طبيب الأسنان) أو كنت قبيل عمليّة جراحية، أو كنت على وشك الخضوع لفحوص وظيفة الغدّة المجاورة للدرقيّة، فيتوجّب عليك إخبار طبيبك أو الطاقم الطّبيّ بأنّك تستعمل أقراص **لوسارتا بولوس**.

- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونية الأوّلي (متلازمة تنتج عن خلل في الغدّة الكظرية وترتبط بارتفاع إفراز هورمون الألدوستيرون من قبل الغدّة)
- كنت تستعمل أيّ واحد من الأدوية التالية المستعملة لعلاج ضغط الدم المرتفع:
 - مثبّط ACE (مثلاً، اينالابريل، ليزينوپريل، رامبيريل)، خاصّة إذا كانت لديك مشاكل في الكليتين تتعلّق بالسكريّ.
 - اليكسيريين.
- قد يفحص طبيبك وظيفة الكليتين لديك، ضغط الدم وكميّة الكهارل (مثلاً، البتاسيوم) في دمك بفواصل زمنيّة ثابتة.
- انظر أيضًا معلومات المدرجة تحت العنوان "لا يجوز استعمال الدواء إذا".
- كنت تستعمل أدوية أخرى من شأنها أن ترفع مستويات البوتاسيوم في مصل الدم (انظر البنند 2 "التفاعلات بين الأدوية").
- أصبت في الماضي بسرطان الجلد، أو إذا تطوّرت لديك آفة جلديّة غير متوقّعة خلال فترة استعمال الدواء.

قد يزيد استعمال هيدروكلوروثيازيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما)، تحديدًا عند الاستعمال الطويل الأمد بجرعات دوّائتة عالية. يجب حماية الجلد من التعرّض لأشعّة الشمس وللأشعّة فوق البنفسجيّة (UV) خلال فترة استعمال **لوسارتا بولوس**.

❗ التفاعلات بين الأدوية:
إذا كنت تستعمل الأن أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائيّة، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

أخبر طبيبك إذا كنت تستعمل إضافات البتاسيوم، بدائل الملح التي تحتوي على البوتاسيوم، الأدوية الحافظة للبتاسيوم أو أدوية أخرى من شأنها أن ترفع مستويات البتاسيوم في مصل الدم (مثلاً، أدوية

تحتوي على تريميثوبريم)، ولا يوصى بدمجها مع **لوسارتا بولوس**.

قد يحدث تفاعل بين الأدوية المدرّجة للبول، مثلًا بين

هيدروكلوروثيازيد الموجود في **لوسارتا بولوس**، وأدوية أخرى.

لا يجوز استعمال **لوسارتا بولوس** بالدمج مع الدوية تحتوي على البتاسيوم دون مراقبة طبيبك عن كثب.
قد تكون وسائِل الحذر الخاصّة (مثل: فحوص الدم) ملائمة إذا كنت تستعمل مدرّات البول الأخرى، وبعض المواد المشمّلة، أدوية لعلاج النقرس (جوارت)، أدوية للسيطرة على نظم القلب أو أدوية للسكّريّ (الأدوية المعطّلة عن طريق الفم أو الإنسولين).

من المهمّ أيضًا أن يعلم طبيبك إذا كنت تستعمل:

- أدوية أخرى لخفض ضغط الدم.
- الستيرويدات.
- أدوية لعلاج السرطان.
- مسكّنات الألم.
- أدوية لعلاج التلثّوات الفطريّة.
- أدوية لعلاج التهاب المفاصل (آرثرينتين).
- المستحضرات التي تحتوي على الصمغيات (الارتينجات) لعلاج الكوليسترول المرتفع، مثل كوليستيرامين.
- أدوية لإرخاء العضلات.
- الحبوب المنوّمة.
- أدوية أفيونيّة مثل المورفين.
- "pressor amines" مثل الأدرينالين أو أدوية أخرى من نفس الفصيلة.
- الأدوية المعطّاة عن طريق الفم للسكّريّ، أو الإنسولين.

قد يفسط طبيبك إلى تغيير الجرعة و/أو إلى اتّخاذ وسائِل أخرى للحد من

المدرّحة تحت العنوانين "لا يجوز استعمال الدواء إذا" و"تحذيرات خاصّة تتعلّق باستعمال الدواء".
رجاء أعلم طبيبك أيضًا بأنّك تستعمل **لوسارتا بولوس** إذا كنت متّضع لتصوير قريبًا وتتلقّى مادة تبايّن تحتوي اليود.

❗ استعمال الدواء والطعام:

قد تؤدّي الكميّات المتعلّقة في الملح في التغذية إلى مناقضة تأثير

أقرص **لوسارتا بولوس**.

يمكن تناول أقراص **لوسارتا بولوس** مع أو بدون الطعام.

❗ استعمال الدواء واستهلاك الكحول:

يوصى بعدم شرب الكحول خلال فترة استعمال هذه الأقراص. قد يزيد كلّ من الكحول وأقراص **لوسارتا بولوس** من تأثيرات الأخر.

❗ الحمل، الإرضاع والحصوية:

الحمل
يتوجّب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تطّئين أنك حامل (أو قد تحطّئين).
يسويصك طبيبك عادة بالتوقّف عن استعمال **لوسارتا بولوس** قبل أن تحملي أو فور علمك بأنك حامل وسويصك باستعمال دواء آخر بدلًا من **لوسارتا بولوس**. لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** في بداية الحمل، ويتمع استعماله بعد الشهر الثالث من الحمل، لأنه قد يسبب ضررًا شديدًا لطفلك إذا استُعمل بعد الشهر الثالث من الحمل.

من الحمل.

أخبر طبيبك إذا كنت مرتضًا أو على وشك البدء بالإرضاع. لا يوصى باستعمال **لوسارتا بولوس** لدى الأمهات المرضعات، وقد يختار طبيبك لك علاجًا آخر إذا كنت معنيّة بالإرضاع.

❗ الاستعمال لدى المراهقين:

لا تتوقّف معلومات بخصوص استعمال **لوسارتا بولوس** لدى الأولاد، لذلك، لا يجوز إعطاء **لوسارتا بولوس** للأولاد.

❗ الاستعمال لدى البالغين:

يعمل **لوسارتا بولوس** ويختلّم بشكل جيد بنفس المقدار لدى معظم المرضى البالغين، المتقدّمين في السن والأصغر سنًا. الجرعة المطلوبة لمعظم المرضى المتقدّمين في السنّ هي نفس الجرعة المطلوبة للمرضى الأصغر سنًا.
السمية واستعمال المقات:
عندما تبدأ العلاج بهذا الدواء، لا يجوز إجراء مهامّ تتطلّب الانتباه الخاصّ (مثلاً: قيادة السيّارة أو تشغيل الماكينات الخطّرة) حتّى تعلم كيف يكون ردّ فعلك على هذا الدواء.

❗ معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي كلّ قرص من **لوسارتا بولوس** على ما يقارب 66 ملغ من اللاكتوز. إذا أخطرك الطبيب بأنّ لديك عدم تحمّل لسكّريّات معنيّة، فراج طبيبك قبل استعمال هذا الدواء.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال **لوسارتا بولوس** دائمًا بحسب تعليمات الطبيب.
عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كميّة العلاج باستمخض.

من المهمّ الاستمرار باستعمال **لوسارتا بولوس** ما دام طبيبك يصفه لك من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.
يمكن تناول **لوسارتا بولوس** مع أو بدون الطعام. يجب ابتلاع القرص مع كأس ماء.

الجرعة الدوائيّة وكميّة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الدوائيّة المتبعية عادة هي:

فرط ضغط الدم:

جرعة **لوسارتا بولوس** العاديّة لدى معظم مرضى ضغط الدم المرتفع هي قرص واحد من **لوسارتا بولوس** في اليوم، من أجل السيطرة على ضغط الدم لمدة 24 ساعة. الجرعة الدوائيّة اليومية القصوى هي قرصان في اليوم من **لوسارتا بولوس**، مرّة واحدة في اليوم.
المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع وتضخّم الكليتين الأيسر:
سيتمّ تحديد الجرعة الدوائية من قبل الطبيب فقط.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

الهرس/الشرط المصنّع:

لا يجوز الصنع. القرص مخصّص للتلع.

لا يجوز الشرط، لأنّ الجرعة الدوائيّة في كلّ نصف قرص غير متساوية.
لا تتوقّف معلومات بخصوص سحق/ هرس القرص.

لا تتوقّف معلومات بخصوص سحق/ هرس القرص.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائيّة أكبر

قد يسبّب فرط الجرعة هبوطًا في ضغط الدم، خفقانًا، نبضًا بطيئًا، تقوّظات في تركيب الدم وخفقانًا.
إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد ببلع الدواء خطأ، فتوجّه فورًا إلى غرفة الطوارئ في المستشفى واحضر معك عبوة الدواء.

إذا تسببت تناول الدواء

حاول أن تتناول **لوسارتا بولوس** كل يوم تمامًا وصفك لك لكن، إذا نسيبت تناول هذا الدواء في الوقت المحدّد، لا تتناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتياديّ واستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقّفت عن تناول الدواء

من المهمّ الاستمرار باستعمال **لوسارتا بولوس** ما دام طبيبك يصفه لك من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

لا يجوز تناول الأدوية في العمّة! يجب مراجعة المنسق والتأكد من الجرعة في كلِّ مرّة تتناول فيها دواء. يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توقّفت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية:

مثل كلّ دواء، قد يؤدي استعمال **لوسارتا بولوس** إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتلقّى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أيّ واحد منها.

يجب إيقاف استعمال الدواء والتوجّه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:

ردّ فعل تحسّسيّ متقدّم (طفح جلديّ، حكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو الحلق ممّا قد يسبب صعوبة في البلع أو في التنفّس). إنّ هذا عرضٌ جانبيّ خطير لكنه نادر، ويظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10.000. قد تحتاج إلى علاج طبّيّ مستعجل أو إلى الزرود في المستشفى.
أعراض جانبية نادرة جدًا (Very rare) - أعراض تظهر عند أقل من مستعمل واحد من بين 10.000:
• ضائقة تنفسية حادة (تشتمّل العلامات على ضيق التنفّس الحظير، الحمى، الضعف والارتباك).

أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية شائعة (Common) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 100:

- سعال، التهاب المسالك التنفسية العلوية، احتقان الأنف، التهاب الجيوب الأنفيّة، مشاكل في الجيوب الأنفيّة.
- إسهال، ألم في البطن، غثيان، مشاكل في الهضم.
- ألم في العضلات أو تقلصات، ألم في الرجل، الألم في الظهر.

- صداع، دوام.

أضغف، تعب، الألم في الصدر.

ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم (والتي قد تسبّب اختلالًا في نظم القلب)، انخفاض مستوى الميوكلوبروبين.

تقرّظات وطفح الكلبيتين، بما في ذلك قصور الكلبيتين.
سكّر منخفض أكثر من اللازم في الدم (نقص سكّر الدم).
أعراض جانبيّة غير شائعة (Uncommon) - أعراض تظهر عند 10-1 مستعملين من بين 1.000:

• فقر الدم، نقاط حمراء أو بنّيّة على الجلد (أحيانًا بالتحديد على القدمين، الرجّلين، الذراعين والمؤخرى، مع الألم في المفاصل، انتفاخ اليدين والقدمين والم في البطن)، كمّات، انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، مشاكل في تحكّر الدم، انخفاض عدد الصفائح.
• فقدان الشهية، ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو النقرس (جوارت)، ارتفاع مستويات السكر في الدم، مستويات شاذة للكهارل في الدم.
• قلق، عصبيّة، اضطراب الهلع (نوبات هلع متكرّرة)، ارتباك، اكتئاب، آلام شاذة، اضطرابات في النوم، ميل إلى النوم، تضرّر الذاكرة.

الإحساس بـ"دبابيس وإبر" أو أحاسيس مشابهة، ألم في الأطراف، ارتخاف، صداع نصفيّ (ميجرينا)، إغماء.
تشنّج الروية، شعور بالحرقة أو الخوخ في العينين، التهاب المتلمّحة، تدهور الروية، رؤية الأشياء باللون الأصفر.
• ظنين، دنين، ضخب أو طرق في الأذنين، فريتيجو (دوار).
• ضغط دم منخفض، قد يكون مرتبطًا بالتقرّظات أو الوضعية (الشعور بالدوار أو بالضعف عند الوقوف).
• ندحة صدرية (ألم في الصدر)، نظم قلبيّ غير سوّي، حدث دماغيّ (TIA - نوبة إقفاريّة عابرة، "سكتة مصغّرة")، نوبة قلبيةّ، خفقان.

التهاب الأوعية الدموية المصحوب في أحيان متقاربة بالطفح الجلديّ أو بالكمّات.

ألم في الحلق، ضيق التنفّس، التهاب الشعب الهوائيّة، التهاب الرئتين، ماء في الرئتين (يسبّب صعوبة في التنفّس)، وراعاف، سيلان الأنف، احتقان.

إسهال، إمساك شديد، غازات، انزعاج في البطن، تشنّجات في البطن، تقوّظات، جفاف الفم، التهاب غدّة اللعاب، ألم في الأسنان.
• براق (اصفرار العينين والجلد)، التهاب الكبد.
• شرى، حكة، التهاب الجلد، طفح جلديّ، احمرار الجلد، حساسية للضوء، جفاف الجلد، احمرار الوجه، تعرّق، تساقط الشعر.

ألم في الذراعين، الكتفين، الخنقيّين، الركبتين أو المفاصل الأخرى، انتفاخ المفاصل، تصلّب، ضعف العضلات.
• تبول كثير بما في ذلك في الليل، وظيفه غير سوّيّة للكليتين بما في ذلك التهاب الكلبيتين، تلثّث المسالك البوليّة، سكّر في البول، انخفاض في الشهوة الجنسيّة، الضعف الجنسيّ.
• انتفاخ الوجه، انتفاخ موضعيّ (وذمة)، حمّى.

أعراض جانبية نادرة (Rare) - أعراض تظهر عند 1-10 مستعملين من بين 10.000:

• التهاب الكبد، نتائج شاذة لفحوص وظائف الكبد.

أعراض جانبية مدى شوية غير معروف (أعراض لم يتمّ تحديد مدى شيوعها بعد)

- أعراض شبيهة بالإنتولزا.
- الألم غير مفسّرة في العضلات مع بول غامق (بولن الشاي) (احتلال الربيّات).
- مستويات منخفضة للصوديوم في الدم (نقص الصوديوم في الدم).
- شعور عامّ سئى.
- اضطراب في حسّاسة الذوق.
- سرطان الجلد والشفتين (سرطان جلد من نوع غير الميلانوما).
- انخفاض في الروية أو الألم في العينين نتيجة لضغط مرتفع (علامات محتملة على تراكم السوائل في طبقة الأوعية الدموية في العين (choroidal effusion) أو الجلاركوما الضيقة الزاوية الحادة).

إذا ظهر عرض جانبيّ، أو إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبيّ لم يُذكر في النشرة، فطيلك استشارة الطبيب.

بالإمكان التليّغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التليّغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة.

(www.health.gov.il) والذي يوجّه إلى الاستمارة المتّصلة

للتليّغ عن أعراض جانبيّة، أو عن طريق الدخول إلى الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

بعد التسمّي! يجب حفظ هذا الدواء وأيّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأولاد و/أو الأطفال الرضع ومجال ربيّهم وبذلك ستمنع التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال **لوسارتا بولوس** بعد تاريخ انتهاء الصلاحيّة (EXP) المدوّنة على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحيّة إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

خزّنه في درجة حرارة أقلّ من 25 درجة مئوية.

لا يجوز إلقاء الأدوية في المراض أو في النفايات البيئيّة. استشر الصيدلي بالنسبة لكيفيّة التخلص من الأدوية التي لم تُعدّ هناك حاجة لها. سيساهم اتّخاذ هذه الوسائل في الحفاظ على جودة البيئة.

6. معلومات إضافية:

بالإضافة إلى المواد الفعّالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Pregelatinised Starch, Opadry OY-L-32965
Yellow (contains: Lactose Monohydrate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Macrogol, Quinoline Yellow Aluminium Lake, Yellow Iron Oxide, Red Iron Oxide), Magnesium Stearate, Macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مستدير باللون الأصفر، محدّب من كلا الجانبين، مطليّ بالفيلم، مع خطّ إشارة.

تتوقّف عبوات من 7، 10، 30، 60، 100 قرص.

قد لا تتسوّق جميع أحجام العبوات.

صاحب الامتياز/ المصنّع ومولاه: ك ص ص للصلصاعات الكيماويّة مرض، م. كايكمندا 3، كريات ملاحى.

تم تحرير هذه النشرة في 10/2022 وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة: 141-24-31703-3

من أجل التبسيط ولتسهيل القراءة، تمّت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، فإنّ الدواء مخصّص لكلا الجنسين.

