

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

אנהידרול פורטה

תמיסה בבקבוק "רול און"

חומר פעיל וריכוזו

אלומיניום כלוריד הקסאהידראט 20% w/v (aluminum chloride hexahydrate)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה מיועדת לילדים, למבוגרים ולקשישים. עליך להשתמש על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם התסמינים מחמירים.

1. למה מיועדת התרופה?

אנהידרול פורטה מיועדת לטיפול מקומי בהזעת יתר בבית השחי, בכפות ידיים או בכפות רגליים.

קבוצה תרפויטית: תרכובות אלומיניום וכלור.

החומר הפעיל אלומיניום כלוריד הקסאהידראט מפחית את ההזעה על-ידי חסימת בלוטות הזיעה בעור ופועל כדאודורנט על-ידי השמדת החיידקים שגורמים לריח הגוף.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או למרכיב הנוסף אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- יש להגביל את המריחה לאזורים המזיעים בלבד, בית השחי, כפות ידיים או כפות רגליים.
- הקפד שאזורי העור שיטופלו יהיו **יבשים לחלוטין** לפני השימוש (ראה פרק 3).
- אל תמרח על עור סדוק או מגורה:
- בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלח את השיער בבית השחי ואל תשתמש בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש באנהידרול פורטה.
- **הימנע מנגע עם העיניים, האף והפה.**
- **הקפד שתוכן הבקבוק לא יישפך** שכן זה עלול לפגוע בך, בבגדים ובחפצים (ראה פרק 4):
- אל תנער את הבקבוק.
- אל תנסה להסיר את הגולה שמכסה את פתח הבקבוק.

- הקפד על סגירת מכסה הבקבוק בזמן שאינך משתמש בו.
- זהירות! החומר דליק מאוד. אין להשתמש ליד אש או מקור הצתה.

גילוח בית השחי/הסרת שיער

בזמן הטיפול בבית השחי אל תגלח את השיער בבית השחי ואל תשתמש בתכשיר כלשהו להורדת שיער מאזור זה, בתוך 12 שעות לפני או אחרי השימוש באנהידרול פורטה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אנהידרול פורטה אינו משפיע על תרופות אחרות ואינו מושפע משימוש בתרופות אחרות.

היריון והנקה

ניתן להשתמש בתכשיר בזמן ההיריון ובהנקה. מרכיבי התרופה בתכשיר זה ובתכשירים דומים הם בשימוש נרחב הרבה שנים ללא דיווחים על בעיות. עם זאת לא בוצעו בתרופה ניסויי בטיחות.

נהיגה ושימוש במכונות

לא ידוע כי השימוש בתרופה משפיע על היכולת לנהוג או להשתמש במכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

בילדים, מבוגרים וקשישים:

- אין לבלוע, לשימוש חיצוני בלבד.
- יש למרוח את התכשיר רק בבתי השחי, בכפות ידיים או בכפות רגליים.
- ודא שאזורי העור שיטופלו יהיו **יבשים לחלוטין** לפני השימוש באנהידרול פורטה.

כדי שאזורי הטיפול יהיו יבשים לחלוטין:

- אל תתקלח או אל תעשה אמבטיה מייד לפני הטיפול.
- **יש למרוח את התכשיר בלילה רק לפני שאתה הולך לישון**, לפני כניסתך למיטה (זאת מכיוון שבלוטות הזיעה נוטות להיות פחות פעילות במהלך השינה).
- לפני השימוש בתרופה ודא שמכסה הבקבוק מוברג היטב, אחר כך הטה את הבקבוק כדי להרטיב את הגולה שברולר. **אל תנער את הבקבוק.**
- הסר את מכסה הבקבוק ומרח את הנוזל באזורים המזיעים כנדרש.
- המתן עד שהנוזל יתייבש מעצמו (זה ייקח דקות ספורות), אחר-כך רחץ את ידיך (אלא אם הטיפול הוא בידיים).
- יש להישאר עם הטיפול כל הלילה, ורק בבוקר יש לרחוץ היטב את האזורים המטופלים.

- יש להשתמש באנהידרול פורטה באותו אופן במשך שני לילות רצופים ולאחר מכן להפסיק את הטיפול למשך שני הלילות הבאים.
- יש לחזור ולמרוח במשך שני לילות עם הפסקה נוספת למשך שני לילות לאחר מכן. יש להמשיך בטיפול המחזורי ככל שנדרש.
- הפחת או הגבר את תדירות הטיפול כדי להתאימה לצרכיך (שים לב, אם אתה חווה תופעות לוואי, כנראה שתדירות הטיפול גבוהה מדי (ראה פרק 4).

אין לעבור על המנה המומלצת.

שימוש בדאודורנטים או אנטיפרספירנטים (נוגדי הזעה) אחרים

השימוש בדאודורנטים או אנטיפרספירנטים רגילים איננו הכרחי בזמן השימוש באנהידרול פורטה. אם אתה רוצה להמשיך ולהשתמש בתכשירים אלו עליך:

- להשתמש בהם רק בימים שבהם אינך משתמש באנהידרול פורטה או
- להשתמש בהם בבוקר שלמוחרת רק לאחר שרחצת את האנהידרול פורטה. יש לוודא שלפני השימוש הבא באנהידרול פורטה, שטפת היטב את הדאודורנטים או האנטיפרספירנטים ועורך יבש לחלוטין לפני השימוש באנהידרול פורטה.

אם התכשיר נכנס לעיניים או לפה

התכשיר עלול לגרום לנזק אם הוא נכנס לעיניים או לפה. שטוף את העיניים או את הפה עם הרבה מים. בזמן שאתה שוטף עין אחת, שים לב שלא תעביר את התרופה לעין השנייה. מייד אחר כך פנה לבית חולים לטיפול.

אם השתמשת בתכשיר בתדירות גבוהה מדי

שימוש יתר עלול לגרום לגירוי באזורים המטופלים. אם אתה סובל מגירוי, השתמש בתכשיר בתדירות נמוכה יותר וטפל בתסמיני הגירוי המתוארים בפרק 4.

אם שכחת ליטול את התכשיר

אל תדאג אם לעיתים שכחת להשתמש בתרופה, המשך את הטיפול אחרי שנזכרת.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברוקח או ברופא.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באנהידרול פורטה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תגובה שכיחה לסוג טיפול כזה היא **גירוי עורי ואדמומיות** באזור המטופל. תגובה זו בדרך כלל קלה וזמנית. אם הגירוי מציק, נסה להפחית את תדירות הטיפול, או שניתן להשתמש בקרם הידרוקורטיזון בריכוז נמוך כדי להקל על הגירוי.

אם התכשיר נשפך על בגדים, בדים, תכשיטים או מתכות, או משטחים מבריקים הוא עלול לגרום להם נזק קבוע.

הפסק את השימוש בתרופה, פנה לרופא או לרוקח אם אחת מתופעות הלוואי החמירה או אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא הוזכרה בעלון זה.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תימנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- **תנאי אחסון:** אין לאחסן את התרופה בטמפרטורה העולה על 25°C. סגור את המכסה היטב לאחר השימוש. אחסן את התרופה במצב ניצב כדי למנוע שפיכה.
- התכשיר **דליק מאוד**, יש לאחסן הרחק מאש או מקורות הצתה.
- אין להשתמש בו ליד להבות או מקורות הצתה (סיגריות בוערות, או כל דבר אשר עלול לגרום להצתה עד ליבוש מוחלט של התכשיר).
- אין להשליך את התרופה לשירותים או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתכשירים שאין בהם צורך. צעדים אלה יגנו על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Industrial methylated spirit 95%

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

הבקבוק מכיל 60 מ"ל תמיסה של אנהידרול פורטה. לבקבוק יש גולה (בקבוק רול און) ומכסה הברגה. התמיסה צלולה ללא צבע.

בעל הרישום וכתובתו: תרופארם שיווק 1985 בע"מ, פארק תעשיות פולג, ת"ד 8105, א.ת. דרום נתניה.

שם יצרן וכתובתו: דרמל לבורטוריס בע"מ, טטמור פלייס, גוסמור, היצ'ן, הרטס, אנגליה.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות 060-38-27252

נערך באוקטובר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות. לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

PL-1059 01-07.22