

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986

يُسَوِّق الدواء بدون وصفة طبيب

پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل, حبسولات

تحتوي كل حبسولة:

پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ،

بيسودوفين هيدروكلوريد

(Pseudoephedrine hydrochloride) 25 ملغ،

ديكستروميثورفان هيدروبروميد

(Dextromethorphan) 10 ملغ،

كلوريفينيرامين مالات (Chlorpheniramine maleate)

2 ملغ.

مواد غير فعالة وميالات حساسية (مستأجرة) – انظر للبلند 6 "معلومات إضافية" للبلند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

أقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

يُعطى هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب وهو مُخصَّص للبالغين والأطفال فوق جيل 12 سنة. عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في الـبلند 3 "كيفية استعمال الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو أنها لا تتحسن بعد 5 أيام بالرغم من استعمال الدواء أو في كل وضع تظهر به أعراض جديدة.

1. لأي غرض مُخصَّص الدواء؟

الدواء مُخصَّص لتخفيف أعراض نزلات البرد، سعال واحتقان الأنف المصحوب بسخونة والآم - للعلاج في الليل.

الفصلية:

پاراسيتامول - مسكن الأم وخافض للحرارة.
بيسودوفين هيدروكلوريد - مخفف للاحتقان الأنف.
ديكستروميثورفان - مثبط للسعال.
كلوريفينيرامين - مضاد للهيستامين.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعاً.
- كنت حساساً (أرجي) للمواد الفعالة (پاراسيتامول، بيسودوفينيرامين، ديكستروميثورفان أو كلوريفينيرامين). مضاد آخر للهستامين أو لمضادات احتقان أخرى أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر للبلند 6).
- كنت تتعالج في نفس الوقت بأدوية من فصيلة منبّهات منوماين أوكسيداز (IMAOs) (الاكتئاب) أو بأدوية المنبّهات الكوكسة لمونوماين أوكسيداز (RIMAs) أو
- خالل 14 يوم من إيقاف العلاج بها.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة منبّهات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو كنت قد تناولتها خلال الأسبوعين الأخيرين.
- كنت تتناول أو تتناول في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية ذهانية، أدوية لحالات حسية أو أدوية لعلاج مرض الباركنسون.
- كنت تتعالج في نفس الوقت بمضادات أخرى لاحتقان الأنف، أدوية أخرى للربو والتهاب الشعب.
- مضادت تتناول أدوية لعلاج مشاكل في القلب من فصيلة مضدرات بيتا.
- كنت تعاني من أمراض قلب أو فرط ضغط الدم.

<div> <div><div>كان لديك سكري.</div></div> <ul style="list-style-type: none">كنت تظلم طول جيل 12 سنة. كنت تتعالج في نفس الوقت بمستحضرات أخرى التي تحتوي على پاراسيتامول (إذا لم تكن متأكدًا إذا كان الدواء الذي تتناوله يحتوي على پاراسيتامول، استشر الطبيب أو الصيدلي). كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية (الثايرويد). كنت تعاني من ضغط مرتفع داخل العين (الزرق). كنت تعاني من مرض كلي وخيم. كنت تعاني من ورم القواتم (ورم نادر في الغدة الكظرية الذي يؤثر على ضغط الدم ونظم القلب). كنت تتناول أدوية التي تخفف أو تثبط الشهية أو أدوية للربو (أدوية محاكية للودي). </div>

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- إذا طورت في السابق أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات التي تحتوي پاراسيتامول، لا يجوز تناول مستحضرات التي تحتوي على پاراسيتامول، كي لا ينتج عن ذلك أعراض جانبية جلدية وخيمة مررةً أخرى.
- يجوى المستحضر على پاراسيتامول الذي قد يسبب ضرراً للكلت عندما:
 - يُعطى جرعة أكبر من الموصى به أو لفترة متواصلة.
 - يتم غرق مشروبات كحولية في وقت العلاج.
 - يتم تناول أدوية إضافية التي تؤثر على وظائف الكبد.
- لا يجوز استعمال الدواء في فترات متقاربة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف الحرارة وتسكين الآلام وأدوية نزلات البرد بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي لمنع جرعة مفرطة أو تسمم من پاراسيتامول.
- عليك تبليغ الطبيب إذا كنت تبصد الخوض لفحوصات مخبرية، لأن العلاج بالدواء قد يؤثر على النتائج.

أقرص صمغ الحمل
أدوية لعلاج الصداع النصفي (Ergot alkaloids)
كلوروكينيد القلب (دواء الذي يعطي لعلاج اضطرابات في نظم القلب أو لتقصير القلب مثل ديجوكسين)
أدوية لمشاكل القلب مثل كيتيدين وإيمودارون
كريستينوسين (دواء الذي يعطي وقت الولادة لتقلص الرحم)
تريكينين
تريكينين لعلاج حالات ثلوث فطرية
سينكالتسيت لعلاج فرط النشاط الثاثوي للعددة الدرقية
ميثادون لعلاج ألم وخيم
إذا كنت تأخذ سوية مع پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل
كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:
مرض أو خلل في وظيفة القلب و/أو الأوعية الدموية (مثل: مرض شريان تاجية – انسداد شريان أو أوردة)
مرض أو خلل في جهاز التنفس، مثل: الربو، عيوبية، وأعراض إضافية مثل: سخونة فوق 38 درجة مئوية، ارتفاع على ضغط القلب، شعور بعدم الاستقرار، شعور بعدم مصحوب بالسخونة، والطفح أو بصداع مؤاخر أو أي مشكلة تترتب أخرى
مرض كبد أو خلل في وظائف الكبد
خلل في وظيفة الكلى
مشاكل في التبول أو بروتسائة متضخمة (تسبب التبول بوتيرة مرتفعة)
خلل في وظيفة الغدة الدرقية (الثايرويد)
خلل في وظيفة غدة البروستات

كنت أو ما زلت ممدّماً على الأفيونيات، على الكحول، على أدوية بوصفة طبية أو على مخدرات غير قانونية.
عانيت مؤخراً من أعراض الظلم عن الكحول أو عن المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرق أو رعاش

مررت بقرآن

تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، أخطر الطبيب أو الصيدلي بذلك.
الأشخاص يجب إعطاء الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ من المجموعات التالية أو إذا انتهيت للتو من العلاج بهذه الأدوية.

أدوية ذات فعالية مُضادة للفعل الكليني

(لعلاج الاختلاجات والتشنجات مثل آرتروبين)

• من فصيلة منبّهات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو كنت قد تناولتها خلال الأسبوعين الأخيرين (انظر للبلند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")

• أدوية مضادة لتخثر الدم على الأخص وارفارين
• أدوية مضادة للاكتئاب (تتضمن منبّهات RIMAs) – انظر للبلند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا" أو إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين

• مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات
• أدوية للاكتئاب، للأمراض الذهانية، لحالات حسية أو لعلاج مرض الباركنسون أو إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر للبلند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")
• موكلوبميد – دواء مضاد للاكتئاب
• أدوية أخرى مضادة للهستامينات تشمل أدوية مضادة للسعال والربو (مثل: لا يجوز استعمال الدواء إذا") التي تسبب لك شعوراً بالنهاس

• أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جواتنتيدين، ميليتانيدو، محصرات للعضونات الأدرينية (adrenergic noruen blockers)، ديسبروسكين، بروتينولوم وبيبتاتدين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: محصرات بيتا – انظر للبلند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")

• مستحضرات التي تسرع نشاط الإنزيمات في الكبد (مثل: الباربيتيورات)
• أدوية مضادة للاختلاجات (لعلاج الصرع) مثل: فينيتوين، كاربامازين

• ميثوكولبراميد أو دوميبيريون (لعلاج الغثبان، القيؤ ومشاكل هضم أخرى)
• كلوروفينكول أو ريفامبينوس (مضادات حيوية)
• برونوبريد (لعلاج الربو)
• كلوستيرامين (لتخض فرط دهنيات الدم)
• مستحضرات المضاد للالتهاب غير ستيرونيدية
• أدوية للقلق والتوتر
• أقراص صمغ الحمل
• أدوية لعلاج الصداع النصفي (Ergot alkaloids)
• كلوروكينيد القلب (دواء الذي يعطي لعلاج اضطرابات في نظم القلب أو لتقصير القلب مثل ديجوكسين)

• أدوية لمشاكل القلب مثل كيتيدين وإيمودارون
• كريستينوسين (دواء الذي يعطي وقت الولادة لتقلص الرحم)
• تريكينين
• تريكينين لعلاج حالات ثلوث فطرية
• سينكالتسيت لعلاج فرط النشاط الثاثوي للعددة الدرقية
• ميثادون لعلاج ألم وخيم

إذا كنت تأخذ سوية مع پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل
أدوية مضادة للاكتئاب أو أدوية مضادة للذهان، قد تواجه مخاطر تفاعلية (مثل: هوجان نفسي، هولسات، غيبوية)، وأعراض إضافية مثل: سخونة فوق 38 درجة مئوية، ارتفاع على ضغط الدم، شعور بعدم الاستقرار، شعور بعدم مصحوب بالسخونة، والطفح أو بصداع مؤاخر أو أي مشكلة تترتب أخرى
مرض كبد أو خلل في وظائف الكبد
خلل في وظيفة الكلى
مشاكل في التبول أو بروتسائة متضخمة (تسبب التبول بوتيرة مرتفعة)

خلل في وظيفة الغدة الدرقية (الثايرويد)
خلل في وظيفة غدة البروستات

كنت أو ما زلت ممدّماً على الأفيونيات، على الكحول، على أدوية بوصفة طبية أو على مخدرات غير قانونية.
عانيت مؤخراً من أعراض الظلم عن الكحول أو عن المخدرات مثل: هياج عاطفي، قلق، تعرق أو رعاش

الحمل والإرضاع

لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حامل أو مرضعاً.

السيفالة واستعمال الآلات

لا يجوز سيقاة مركبة أو تشغيل آلات خطيرة في فترة استعمال الدواء لأن هذا الدواء قد يضر بالبطانة، قد تشعر بعدمالاستقرار أو تشوش الرؤية. بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من الركوب على الدراجة الهوائية أو من ألعاب بالقرن من الشارع وما شابه.

الاستعمال لدى الأطفال

هذا الدواء مخصص للأطفال فوق جيل 12 سنة. انظر للبلند 3. على الوالد إبلاغ الطبيب المعالج عن كل الأعراض الجانبية وكل دواء إضافي يعطى للطفل.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليون صوديوم (23 ملغ) لكل حبسولة، مما يعني أنه في الواقع "خالٍ من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التفكير من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة المناسبة للعلاج بالدواء.
في غياب تعليمات أخرى من الطبيب الجرعة المتبعة عادة هي: البالغون والأطفال فوق جيل 12 سنة هي: 1-2 حبسولات قبل النوم.

المرضى فوق جيل 60 سنة: يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنه قد يكونوا حساسين لهذا النوع من المستحضرات.
لدى الاستعمال التزامن مع پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل لا يجوز تجاوز جرعة من 8 حبسولات بالمجمل خلال اليوم (عند الاستعمال بالتزامن مع پارامول أف وشيعول للعلاج في النهار، يجب استبدال جرعة من پارامول أف وشيعول للعلاج في النهار بجرعة من پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل، ولا يجوز تناولها كإضافة على الجرعة القصوى الموصى بها أعلاه من پارامول أف وشيعول للعلاج في الليل).

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة تناول:

يجب يجب الحصول مع الماء. يسمح بشرط الحبسولة، لا توجد معلومات بخصوصه صمغ أو سحق الحبسولة.
إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه على الفور إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

حتى إذا كان شعورك جيدًا، اطلب الفوري هو ضروري، بسبب **الاختلال لتطور صغر وخيم للكلد.**

الأعراض الجانبية قد تكون: غثبان وتقيؤ، إسهال، فقدان الشهية، الأم بطن، انتفاخ، زيادة التعرق، ألم أو حساسية في أعلى البطن.
من الممكن أن لا تكون من أعراض ظهوره لسخونة، تشنج العضلات، هيجان نفسي، ارتباك، غثبان، تضمر تنفس، التقيؤ (الوعي)، حرركات عينيون سريعة لا واردة، مشاكل قلب (قلع قلب مغناطيسي)، مشاكل في التنسيق، اضطراب في نفسي صعب المصحوب بالهلوسات، الميل لفرط الانفعال.

إذا نسبت تناول الدواء، خذ الجرعة التالية حسب الحاجة. بشرط أن الجرعة الأخيرة التي أخذت كانت على الأقل قبل 4 ساعات من تناول الجرعة الحالية. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقق من المصمم والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال پارامول أفا وشيعول للعلاج في الليل أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدئين. لا تفرح من فراءة قائمة الأعراض الجانبية من الممكن أن تصاب بأي واحد منها.

أعراض جانبية وخيمة

يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب عند ظهور:

• ردود فعل أرجية شديدة مثل: طفح وحكة، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان، الحلق الذي قد يسبب صعوبات في التنفس أو البلع.
• انتفاخ الأطراف
• پاراستمبول قادر على التسبب في حالات نادرة، بظهور أعراض جلد شديدة التي قد تكون علاماتها: احمرار، طفح، بقور، تضمر واسع في الجلد، أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضاً إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال پاراستمبول بدون مشكلة. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري

- ازعاج في البطن
- دوار، غثبان، ارتباك
- هولسات (نادر) (سماع أصوات وريوية
- منافظر غير موجودة، أفكار وأحاسيس غير منطقية)

• مشاكل في التبول، خصوصاً إذا كانت هناك مشكلة في غدة البروستات
• علامات على تغيرات في جهاز الدم مثل: تعب غير مبرر، زيف فقر دم، ظهور كدمات، تطور حالات ثلوث بسبوية

• نطق قلب غير منظم، ضغط في الصدر
- ألم رأس فجائي وخيم، غثبان، تقيؤ، ارتباك، تشنجات، اضطرابات في الرؤية

• بطن طين فجائي وخيم أو زيف شرطي (فتحة الشرج) ععب التهاب في القولون نتيجة امتداد دم غير كاف
• انخفاض في تنفق الدم للقلب الذي قد يسبب نبضة صدرية (عند الراحة أو ألم في الصدر، في الرقبة، في الظهر، في الأكتاف، في الأذنة)
• مشاكل ماضية (ضعف في الوجه، في الأترع أو في الرجلين أو استئصال نطق)

• اندفاع مفاجئ للعضوة، احمرار في الجلد، أو بقور قبيحة صغرية كثيرة (أعراض ممكنة ل Acute Generalised Exanthematous Pustulosis – AGEP) التي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا الدواء

• فقدان مغناطيس للرؤية

• مشاكل في الكبد تشمل اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

• قلة التنسيق

• ارتباك لدى المسنين

أعراض جانبية إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

• صداع

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 100):

• صدقات في النوم، عصبية، دوار

• خمول في القدم أو غثبان

أعراض جانبية شيو عنها غير معروف (أعراض لم يتم تحديدها بشكل قاطع، شعور بعدم الهدوء، انفعال، توتر أو شعور بالسعادة بشكل متطرف)

• اضطرابات النوم

• نبض قلب سريع أو غير منظم أو خفقان القلب (إدراك خفقان القلب)

• غثبان

• خمول دم مرتفع

• الإم بطن، إسهال، تقيؤ

• ألم عند التبول

• خدر أو قلة الإحساس بكفات اليدين والرجلين

• رجفان

• انخفاض تنفق الدم لعصب الرؤية (Ischaemic optic neuropathy)

• الضماد، والمان – عند إيقاف تناول الدواء قد تعاني من أعراض الظلم، التي تشمل: شعور بعدم الهدوء، صعوبات النوم، انفعال، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤ وغثبان، إسهال، رجفان، تعرق

• تعب

• خفاف في القدم، شبيهة منسنية، حرقة

• كوابيس، اكتئاب، انخفاض في ضغط الدم، طفح، حساسية للضوء، غثبان، زيادة لزوجة البليغم (قد يسبب السعال أو البليغم)
• طنين في الأذنين، تشوش الرؤية، قلة القدرة على التركيز، الشعور بالمرض، وهن العضلات، تشنج العضلات، فرط الحركة لدى الأطفال، مشاكل في مفاليص الدم مثل فقر الدم

• تضمر أصابع في الجلد، أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضاً إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال پاراستمبول بدون مشكلة. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تقرير عن أعراض جانبية" (أو عن طريق البريد الإلكتروني الموجود في صفحة الويب في موقع وزارة الصحة "www.health.gov.il") الموجه للاستشارة الإنترنيتية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق البريد الإلكتروني:
https://sideeffects.health.gov.il

5. كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (التاريخ (الموافق) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الذي تم فيه التسمم.

شروط التخزين: يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية. لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو سلة القمامات المنزلية. امل الصيدلي جرد كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة للمركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), macrogol, erythrosine aluminum lake (E127), silica colloidal anhydrous, indigo carmine aluminum lake (E132), quinoline yellow aluminum lake (E104), brilliant blue FCF aluminum lake (E133), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة بلون وردي مع خط شطر على الجانبين.

أحجام العبوات المصداق عليها: 10, 20, 30 حبسولة. قد لا تكون كافة أحجام العبوات مسؤقة.

قد تنتج في تشرين الأول 2022 حسب تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 127-900-30770

من أجل التبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المبكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لأبناء كلا الجنسين.

المنتج وصاحب التسجيل:

يُكسَل بِاسْم. شارع دِكسل 1، أور عِكفا 3060000، إسرائيل