

## نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) – 1986

يُسَوِّق الدواء بدون وصفة طبيب

## دكسامول كولد للعلاج في الليل، حبوبلات

تحتوي كل حبيولة:

باراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ

يسودوافرين هيدروكلوريد Pseudoephedrine

(hydrochloride) 25 ملغ،

ديكستروميثورفان هيدروزيروميد (Dextromethorphan)

10 ملغ، (Hydrobromide)

كلورفينيرامين مالات (Chlorpheniramine maleate)

ملغ 2.

مواد غير فعالة ومسيبات حساسية (مستأجرة) – أنظر للند 6
معلومات إضافية وللمند 2 "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".

**اقرأ النشرة يباعن حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.** تحتوي هذه النشرة على معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
يعطى هذا الدواء بدون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للتليفات والأطفال فوق 12 سنة. عليك تناول الدواء وفقاً للتعليمات في الوند 3 "كيفية استعمال الدواء". في هذه النشرة، استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو أنها لا تتحسن بعد 5 أيام بالرغم من استعمال الدواء أو في كل وضع تظهر به أعراض جديدة.

### 1. لأي غرض مخصّص الدواء؟

الدواء مخصّص لتخفيف أعراض نزلات البرد، سعال واحتقان الأنف المصحوب بسخونة الألم - للعلاج في الليل.

**الفصيلة العلاجية:**

باراسيتامول - مسكن الألم وخافض للحرارة.
يسودوافرين هيدروكلوريد - مخفف لاحتقان الأنف.
ديكستروميثورفان - منبط للسعال.
كلورفينيرامين - مضاد للهيستامين.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حاملاً أو مرضعة.
- كنت حساساً (أرجي) للمواد الفعالة (باراسيتامول، يسودوافرين،ديكستروميثورفان أو كلورفينيرامين)، مضاد آخر للهيستامين أو لمضادات احتقان أخرى أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء. (انظر للوند 6)
- كنت تتعالج في نفس الوقت بأدوية من فصيلة مثبطات موانعيمن أوكسيداز (MAOIs) (للاكتئاب) أو بأدوية المثبطات العكوسة لموانعيمن أوكسيداز (RIMAs) أو خلال 14 يوم من إيقاف العلاج بها.
- كنت تتناول أدوية من فصيلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو كنت قد تناولتها خلال الأسبوعين الأخيرين.
- كنت تتناول أو تناولت في الأسبوعين الأخيرين أدوية مضادة للاكتئاب، أدوية ذهانية، أدوية لتحللات حضية أو أدوية لعلاج مرض الباركنسون.

**أدوية أخرى بما في تلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات تغذّية:** أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، بالأخص يجب إعلام الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تأخذ دواء من المجموعات التالية أو

- أدوية ذات فعالية مضادة للقلق الكوليني (لعلاج الاختلاجات والتشنجات مثل ترنبول)
- أدوية من فصيلة مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية [SSRIs] (مضادات الاكتئاب أو القلق) أو كنت قد تناولتها خلال الأسبوعين الأخيرين (انظر للوند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")
- أدوية مضادة لتخثر الدم على الأخص وارفارين
- أدوية مضادة للاكتئاب (تشم مثبطات MAO، RIMAs – أنظر للوند 2، "لا يجوز استعمال الدواء") أو إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين
- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات
- أدوية للاكتئاب، للأمراض الذهانية، لحالات حسية أو لعلاج مرض الباركنسون أو إذا تناولتها في الأسبوعين الأخيرين (انظر للوند 2، "لا يجوز استعمال الدواء")
- موتوكويد – دواء مضاد للاكتئاب
- أدوية أخرى مضادة للتيفاتيشل تشمل أدوية مضادة للسعال والركام (مثل: أدوية أخرى مضادة لاحتقان الأنف، انظر للوند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا") التي تسبب لك شعوراً بالغملى
- أدوية لخفض ضغط الدم مثل: جواتينين، ميتوبوليتا، مضادات اللصويونات الأدرينية (adrenergic neuro blockers)، بروتينوبيون، بيتيديين أو أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثل: محصرات بيتا – انظر للوند 2، "لا يجوز استعمال الدواء إذا")
- مستحضرات التي تسرع نشاط الإنزيمات في الكبد (مثل: الاريبيوتوات)
- أدوية مضادة للاختلاجات (لعلاج الصرع) مثل: فينيبتونين، كاربامازين
- ميتوكلوپريميد أو دوميفريدون (لعلاج الغثيان، التقيؤ ومشاكل هضم أخرى)
- كلورمفينيكول أو ديفميسين (مضادات حيوية) برونيدسي (لعلاج التنفس)
- كوليسيتيرين (لخفض فرطدهنيات الدم)
- مستحضرات مضادة للتأهب غير ستيرويدية
- أدوية التئام وأحضر عيوه الدواء معك.

حتى إذا كان شعورك جيداً، العلاج الفوري هو ضروري، بسبب **الخطأ** لتطور ضرر وخيم للكبد.
الأعراض الإضافية قد تكون: غثيان، قيء، إسهال، فقدان الشهية، الإبط، انتفاخ، زيادة التعرق، ألم أو حساسية في أعلى البطن، من الممكن أنها لا تعكس عن خطورة الضرر. لتكنج، العضلات، هيجان نفسي، ارتباك، غثاس، تضمر شدة اليقظة (الوعي)، حركات تشنجية سريعة و لا ارادية، مشاكل قلب (ضبط قلب سريع)، مشاكل في التنسيق، التقيؤ، انقباض نصيب المصنوب بالهوليات، الميل لفرط الأنفعال.

إذا كنت تتناول الدواء،خذ الجرعة التالية حسب الحاجة؛ بشرط إلا الجرعة الأخيرة التي أخذت كانت على الأقل قبل 4 ساعات من تناول الجرعة التالية. لا تأخذ جرعة مضاعفة.
لا يجوز تناول الدواء في الظلام؛ تحقق من المصنق والجرعة **في كل مرة تتناول بها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

**استعمل الدواء والعطام** يجب تناول الدواء بعد الوجبة.

**استعمل الدواء واستهلاك الكحول** لا يجوز استهلاك مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بهذا الدواء بسبب زيادة الخطأ لتضرر في الكبد.

**الحمل والإرضاع** لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

**تفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أو

على الدراجة الهوائية أو من ألعاب بالقرب من الشارع وما شابه.

**الاستعمال لدى الأطفال**

هذا الدواء مخصص للأطفال فوق جيل 12 سنة. أنظر للوند 3.

على الودين إبلاغ الطبيب المعالج عن كل الأعراض الجانبية وكل دواء إضافي يعطى للطفل.

**معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء** يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملغ من كلوكسيبوميوم (23 ملغ) لكل حبيولة، ما يعني أنه في الواقع "خالٍ من الصوديوم".

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

**في غياب تعليمات أخرى من الطبيب الجرعة المتبعة عادة هي:**
**البالغون والأطفال فوق جيل 12 سنة هي:**
1-2 حبوبلات قبل النوم
المرضى فوق جيل 60 سنة: يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا الدواء لأنه قد يكونوا حساسين لهذا النوع من المستحضرات.

لدى الاستعمال بالتزامن مع دكسامول كولد للعلاج في النهار لا يجوز تجاوز جرعة من 8 حبوبلات بالمعجل خلال اليوم (عند الاستعمال بالتزامن مع دكسامول للعلاج في النهار، يجب استبدال جرعة من دكسامول كولد للعلاج في النهار بجرعة من دكسامول كولد للعلاج في الليل، ولا يجوز تناولها كإضافة على الجرعة القصوى الموصى بها عادة من دكسامول كولد في الليل).
لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

**يجب التوجه إلى الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت أعراض المرض أو أنها لا تتحسن بعد 5 أيام بالرغم من استعمال الدواء أو في كل وضع تظهر به أعراض جديدة.**

**طريقة تناول:**

يجب بلع الحبيولة مع الماء. يسمح بشرط الحبيولة. لا توجد معلومات بخصوص منع أو سحق الحبيولة.

إذا تناولت **بالخطأ جرعة أكبر**

إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه على الفور إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.
حتى إذا كان شعورك جيداً، العلاج الفوري هو ضروري، بسبب **الخطأ** لتطور ضرر وخيم للكبد.
الأعراض الجانبية قد تكون: غثيان، قيء، إسهال، فقدان الشهية، الإبط، انتفاخ، زيادة التعرق، ألم أو حساسية في أعلى البطن، من الممكن أنها لا تعكس عن خطورة الضرر. لتكنج، العضلات، هيجان نفسي، ارتباك، غثاس، تضمر شدة اليقظة (الوعي)، حركات تشنجية سريعة و لا ارادية، مشاكل قلب (ضبط قلب سريع)، مشاكل في التنسيق، التقيؤ، انقباض نصيب المصنوب بالهوليات، الميل لفرط الأنفعال.

إذا كنت تتناول الدواء،خذ الجرعة التالية حسب الحاجة؛ بشرط إلا الجرعة الأخيرة التي أخذت كانت على الأقل قبل 4 ساعات من تناول الجرعة التالية. لا تأخذ جرعة مضاعفة.
لا يجوز تناول الدواء في الظلام؛ تحقق من المصنق والجرعة **في كل مرة تتناول بها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

**استعمل الدواء والطبيب** يجب تناول الدواء بعد الوجبة.

**استعمل الدواء واستهلاك الكحول** لا يجوز استهلاك مشروبات كحولية خلال فترة العلاج بهذا الدواء بسبب زيادة الخطأ لتضرر في الكبد.

**الحمل والإرضاع** لا يجوز استعمال هذا الدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة.

**تفاعلات بين الأدوية** إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الأونة الأخيرة، أو تتشون الرؤية، بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من الركوب

أو البلع، انتفاخ الأطراف

- باراسيتامول قادر على التسبب في حالات نادرة، أعراضها أمراض جلد شديدة التي قد تكون علاماتها: احمرار، طفح، بقور، تضمر واسع في الجلد. أعراض جانبية جلدية شديدة قد تظهر أيضاً إذا تناولت في الماضي مستحضرات التي تحتوي على الزنك؛ الفعالم باراسيتامول بدون مشكلة. إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج والتوجه إلى الطبيب بشكل فوري
- انزعاج في البطن
- دوار، غثاس، إرتباك
- تورم وتضمر (تأخر) (صعاع أصوات وروية مناظر غير موجودة أفكار وأحاسيس غير منطقية)
- مشاكل في التبول، خصوصاً إذا كانت هنالك مشكلة في غدة البروستة
- علامات على تغيرات في جهاز الدم: تعب غير مبرر، خمول، غثاس، فقر دم، ظهور كدمات، تطوّر حالات تلوث بسبوية
- نظم قلب غير منتظم، ضغط في الصدر
- عدم رآس فحجاني ووخيم، غثيان، تقيؤ، ارتباك، تشنجات، اضطرابات في الرؤية
- عدم رآس فحجاني ووخيم أو نريف شرجي (قحة الشرج) عقب التهاب في القولون نتيجة إمداد دم غير كافي
- انخفاض في تنفق الدم للقلب الذي قد يسبب نبضة صدرية غير راحة أو ألم في الصدر، في الرقبة، في الظهر، في الكتف، في الأرع
- سكتة مخاعية (ضعف في الوجه، في الأترع أو في الرجلين أو مشاكل نطق)
- اندلاع مخاعية لسخونة، احمرار في الجلد، أو بقور قبيحة
- صفيضة كغثى (أعراض ممكنة لـ Acute Exanthematous Pustulosis – AEP) التي قد تحدث خلال أول يومين من العلاج بهذا الدواء
- فقدان مفاجئ للرؤية
- مشاكل في الكبد تشمل اليرقان (صفور الجلد والعينين) قلة التنسيق
- ارتباك لدى المسنين

أعراض جانبية إضافية:

بالإضافة للمركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:
Povidone, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), macrogol, erythrosine aluminum lake (E127), silica colloidal anhydrous, indigo carmine aluminum lake (E132), quinoline yellow aluminum lake (E104), brilliant blue FCF aluminum lake (E133), carnauba wax

تتبلغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضلع على الرابط "دعونا نحميتم لوانا، عكب نسيول نحموتنا" (www.health.gov.au) في صفحة البيت في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) للموجهة للإثرتية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:
https://sideeffects.gov.au

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

يجب التسعير؛ يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومحل رطوبة ويحتمل تمتع الشمس. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تأريخ انتهاء) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:** يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية في المراحي أو سلة النفايات المنزلية. أسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

مستندوم واحد من بين عشرة):

**أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر لدى 10-1 مستخدمين من بين 100):
صعوبات في النوم، عصبية، دوار
جفاف في الفم أو غثيان

**أعراض جانبية شوبعا غير معروف** (أعراض لم يتم تحديد مدى شوعوبها):

قلق، شعور بعدم الهدوء، انفعال، تورم أو شعور بالسعادة

مشاكل متطرف
اضطرابات النوم
نقص قلب أو غير منتظم أو خفقان القلب (إدراك خفقان القلب)

تغثس
ضعف دم مرتفع
الأم بطن، إسهال، تقيؤ
عدم عند التبول
خدر أو قلة الإحساس بكتات الينين والرجلين
رجفان

انخفاض تنفق الدم لعصب الرؤية (Ischaemic optic neuropathy)
اعتماد وادمان – عدم إيقاف تناول الدواء قد تعاني من أعراض الطغام، التي تشتمل: شعور بعدم الهدوء، صعوبات النوم، انفعال، قلق، خفقان القلب، ارتفاع ضغط الدم، تقيؤ وغثيان، إسهال، رجفان، تعرق

**المنتج وصاحب التسجيل:**
**دكسل م. ص.**
شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل

تسبب
جفاف في الفم، شوية متندنية، حرقة