

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986
يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

ديپاليت كرونو 500 ملغ أقراص ذات تحرير مطوّل

المواد الفعّالة:

كل قرص يحتوي على:

صوديوم فالپروئات 333 ملغ
حمض الفالپروئيك 145 ملغ
(Sodium valproate) (equivalent to 500 mg Sodium Valproate)

المواد غير الفعّالة - أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إنّا نوفر لك أدوية أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وُصِفَ هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

بالإضافة للنشرة، تتوفر لمركبات ديپاليت كرونو 500 ملغ بطاقة معلومات حول الأمراض والمتعلّجة والمسكّات للمتعلّجة، للحصول على معلومات حول المخاطر. هذه المواد المرقّفة تحتوي على معلومات هامة حول الأمان، التي يتوجب عليك معرفتها، قبل بدء العلاج وخلال العلاج ب ديپاليت كرونو والتصرف فقهها. يجب قراءة بطاقة المعلومات حول الأمان للمتعلّجة، كراسة المتعلّجة، قائمة المراقبة لتلقي معلومات حول المخاطر والنشرة للمستهلك بتمعن قبل بدء إستعمال المستحضر. يجب حفظها لقراءتها بتمعن ثانية إذا دعت الحاجة.

كرونو

قد يسبب فالپروات (ديپاليت كرونو 500 ملغ) ضرراً خطيراً للجنين عندما يتم تناوله خلال فترة الحمل. إنّا كنت امرأة بإمكانها الحمل، فعليك إستعمال وسيلة منع حمل ناجمة بدون توقف خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ. يتناقض معك طبيب بخصوص ذلك، لكن عليك التصرف أيضاً وفقاً للتوصية في الفقرة 2 من هذه النشرة.

حدي زيارة طارئة لدى طبيبك إذا كنت ترغبين في الحمل أو إذا كنت تعتقدين بأنك حامل.

كأمّ غير متعلّق بحالتك الصحية، لا يجوز أبداً التوقف عن تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ قبل أن تتحدثي عن ذلك مع الطبيب لأن حالتك قد تتفاقم.

1) لأي غرض مخصّص الدواء؟

هذا المستحضر مخصّص لعلاج نوبات جزئية، معممة أو مختلطة لمرض الصرع (epilepsy)، هذا المستحضر مخصص للعلاج و/أو لمنع حوادث النسخ الحادة الناتجة عن إضطراب ثنائي القطب.

الفصيلة العلاجية: من مضادات الصرع /مشققات الأحماض الدهنية/ مضادات الذهان

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) ل فالپروات أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مبصلة في الفقرة 6)،
- عانيت أنت أو أحد أفراد عائلتك ذات مرة من مرض كبدي خطير، أو إذا كنت تعاني حالياً من مرض كبدي أو من مرض خطير في البنكرياس،
- توفي أحد أفراد عائلتك جراء مرض كبدي خطير مرتبط بإستعمال حمض فالپروئيك،
- كنت تعاني من مرض وراثي أو مكتسب الذي يؤثر على إستقلاب الهيوميوغلوبين (الپورفيريا الكبدية)
- كنت تعاني من إضطراب في تخثر الدم،
- كنت تعاني من مشكلة وراثية تؤدي إلى إضطراب الميتوكوندريا (مثل متلازمة Alpers-Huttenlocher)،
- كنت تعاني من إضطراب في دورة اليوريا (نوع من الإضطراب الإستقلابي).

إضطراب ثنائي القطب

بالنسبة للإضطراب ثنائي القطب، لا يجوز إستعمال ديپاليت كرونو 500 ملغ إذا كنت في فترة الحمل.

بالنسبة للإضطراب ثنائي القطب، إنّا كنت امرأة قادرة على الحمل، فلا يجوز تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ، إنّا إنّا كنت تستعملين وسيلة منع حمل ناجمة خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ. لا يجوز التوقف عن تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ أو إستعمال وسيلة منع الحمل الخاصة بك قبل أن تتحدثي عن ذلك مع طبيبك. تقدم لك إستشارة إضافية من قبل طبيبك (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والحصوبة").

الصرع

- بالنسبة للصرع، لا يجوز إستعمال ديپاليت كرونو 500 ملغ إذا كنت في فترة الحمل، إلا إذا لم يكن هنالك أي علاج آخر ناجح بالنسبة لك.
- بالنسبة للصرع، إنّا كنت امرأة ذات قدر على الحمل، فلا يجوز تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ، إنّا إنّا كنت تستعملين وسيلة منع حمل ناجمة خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ. لا يجوز التوقف عن تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ أو إستعمال وسيلة منع الحمل الخاصة بك قبل أن تتحدثي عن ذلك مع طبيبك. تقدم لك إستشارة إضافية من قبل طبيبك (أنظري فقرة "الحمل، الإرضاع والحصوبة").

تحذيرات خاصة تتعلّق بإستعمال الدواء

قبل العلاج ب ديپاليت كرونو 500 ملغ، إحك الطبيب إذا:

- كنت تعاني من خلل في جهاز الدم (مثل خلل في التخثر وما شابه)،
- عانيت ذات مرة أو كنت تعاني من خلل في نخاع العظم،
- كنت تعاني من نُدبة إحصارية جهازية (مرض لوپوس) رد فعل يهاجم فيه جهاز مناعة الجسم النسيج الضام للجسم نفسه)،
- كنت تعاني من إضطراب إستقلابي، خاصة نقص إنزيم وراثي،
- الضعوع للعلاج بأدوية تحتوي على حمض فالپروئيك قد يؤدي إلى إرتفاع في نسب الأمونيا في الدم (hyperammonemia).

عليك إبلاغ طبيبك إذا كنت تعاني من أعراض مثل إنهاك، إرهاق، تقيؤات، إنخفاض في ضغط الدم أو زيادة في الإختلاجات. سراقب طبيبك نسب الأمونيا وحمض فالپروئيك في دمك وسيقرر فيما إذا يخفض المقدار الدوائي الخاص بك من ديپاليت كرونو 500 ملغ.

إذا كان هنالك شك لنقص في إنزيم دورة اليوريا، فيجب فحص نسب الأمونيا في دمك قبل أن تبدأ العلاج ب حمض فالپروئيك (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إنّا:" في الفقرة 2).

إنّا كنت تعاني من مرض إستقلابي ناجم عن نقص في إنزيم بإسم -

Type II carnitine palmitoyltransferase (CPT-II)، فإن خطورة تطور تفكك عضلي خطير (إنتحلال العضلات المخططة) تكون أكبر عند إستعمال أدوية تحتوي على حمض فالپروئيك،

- لديك سابقة عائلية معروفة لإضطراب الميتوكوندريا الناجم عن مشكلة وراثية،
- كنت تعاني من مرض كلوي و/أو نقص بروتين في الدم،
- كنت تخطط لإجتياف عملية جراحية أو إجراء علاجي في الأسنان (مثل إقتلاع سن)، أو إذا كنت مصاباً بجرح أو تعاني من نزف عفوي. نظراً لأن هذا الدواء قد يزيد من احتمال حدوث نزف، عليك إبلاغ الطاقم الطبي بأنك تتناول ديپاليت كرونو 500 ملغ قبل أن يكون بإمكانك ختثر دمك،
- كنت تتناول أدوية إضافية يمكنها تقليل تخثر الدم (مثل مضادات فيثامين K)، فإن الديق لديك لحدوث نزف قد يزداد. لذا يجب مراقبة تخثر دمك بشكل منتظم،
- كنت تتناول أيضاً حمض أستيليل ساليسيليك (أسبيرين)، لأنه من الجائز أن يحدث إرتفاع في تراكيز حمض فالپروئيك (المركب الفعال من ديپاليت كرونو 500 ملغ) في دمك،
- تفاقمت الإختلاجات لديك. بالمشابه لأدوية أخرى لعلاج الصرع، فإن العلاج ب ديپاليت كرونو 500 ملغ قد يؤدي إلى تفاقم الإختلاجات أو لزيادة وتيرتها. في هذه الحالة، توجه فوراً لطبيبك.
- أفكار إيذاء نفسك أو أفكار إنتحارية لوحظت لدى عدد أقل بكثير من الأشخاص الذين يتعالجون بأدوية مضادة للصرع مثل ديپاليت كرونو 500 ملغ. إنّا كنت تعاني من أفكار من هذا النوع في أي وقت كان، إتصل بطبيبك بشكل فوري.

الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصّص للأطفال بوزن أقلّ من 17 كلغ.

هذا الشكل من الإطعاع غير مخصّص للإستعمال لدى أطفال دون عمر 6 سنوات (مشكلة في بلع القرص وحبالاتي الإختلاجات).

- يجب توخي الحذر الخاص مع العلاج ب ديپاليت كرونو 500 ملغ
- لدى الأطفال الصغار الذين يتناولون أدوية إضافية لعلاج إضطرابات الإختلاجات،
- لدى أطفال ومراهقين لديهم إعاقات كفية وأنواع خطيرة من الإختلاجات،
- لا يجوز إستعمال ديپاليت كرونو 500 ملغ وحمض أستيليل ساليسيلك بشكل متزامن لعلاج أمراض تشرك سخونة لدى الرضع والأطفال، بالإمكان إعطاء العلاج المشترك هذا فقط لمراهقين و فقط إذا أصدر الطبيب تعليمات صريحة بذلك.

الفحوص والمتابعة

بُغِّع عن حالات غير شائعة لتضرر خطير في الكبد وحالات نادرة لتضرر البنكرياس. لدى متعالجين، خاصة الرضع، الأطفال الصغار والأطفال، يجب إجراء فحص وظائف الكبد قبل بدء العلاج. وخلال الأشهر الـ 6 الأولى من العلاج، خاصة لدى المتعالجين الذين هم ضمن مجموعات الخطورة.

تضرر الكبد أو البنكرياس يمكن أن يتجلّى بعلامات وأعراض غير محددة، عادة بظهور مغجأ، مثل تكرر الإختلاجات، تفاقم الإختلاجات أو تزايد وتيرتها. إضطراب في الوعي بما في ذلك إنرتاك، عدم هدوء، إضطرابات في الحركة، الشعور بوكة عامة والشعور بضعف، فقدان الشهية للطعام، نفور من مأكولات معروفة، نفور من حمض فالپروئيك، غثيان، تقيؤات، مثل أعلى البطن، حمول (lethargy)، نغاس، كدمات كثيرة بشكل شاذ (ورم دموي)، يرقان (إصفرار الجلد أو الجزء الأبيض من العينين)، رعاف (أو تراكم سوائل وورمة) في مناطق محددة من الجسم أو في كافة الجسم. إذا إستمرت أو تفاقمت هذه الأعراض، فعليك التوجه فوراً إلى الطبيب، الذي يقرر فيما إذا يجب مواصلة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ.

- **الكشف المبكر عن تضرر الكبد أو البنكرياس**

قبل بدء العلاج، يتوجب على طبيبك أن يسالك أسئلة مُصَّلة، أن يجري فحص جسدي وأن يطلب إجراء فحوص مخبرية (خاصةً فحوص لإستقلابية، لأمراض في الكبد أو البنكرياس ولمشاكل في تعداد الدم أو في تخثر الدم).

يجب إجراء الفحوص المخبرية ثانية بعد 4 أسابيع من بدء العلاج.

لدى متعالجين بدون علامات سريرية لكن لديهم قيم فحوص مرتفعة بشكل شاذ بعد 4 أسابيع، يجب إجراء فحوص متباعدة 3 مرات بفواصل قدرها أسبوعين على الأكثر، وبعد ذلك مرة في الشهر حتى الشهر السادس من العلاج.

على والديين أو المعالجين إبلاغ الطبيب بشكل فوري عن أية علامات سريرية، بعد علاقة بجداول المواعيد هذا.

- لدى المراهقين** (إبتداء من عمر 15 سنة) والكبار، يوصى بإجراء متابعة سريرية ومتباعدة بواسطة فحوص مخبرية مرة في الشهر خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العلاج، وكذلك قبل بدء العلاج.
- بعد 12 شهراً من العلاج بدون علامات سريرية، يتطلب الأمر متابعة من قبل الطبيب 2 حتى 3 مرات في السنة فقط.
- قد يزداد وزنك عند بداية العلاج. إخفض وزنك بشكل منتظم وتحدث مع الطبيب حول الوسائل المناسبة للسيطرة على وزنك إذا دعت الحاجة.

التداخل/التفاعلات بين الأدوية

إنّا كنت تتناول، إنّا تناولت مؤخراً، أو كنت تتوي تناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

يزداد التأثير وأحياناً الأعراض الجانبية لـ ديپاليت كرونو 500 ملغ بواسطة

- الأدوية التالية:
- سيپيدينيون (دواء يستعمل للعلاج في المعدة)،
- إيريتروميسين (دواء يستعمل لقرحة الجروح العميقة)،
- حمض أستيليل ساليسيليك (دواء يستعمل لعلاج السخونة والأمم)؛ يقلل حمض أستيليل ساليسيليك من إرتباط حمض فالپروئيك لبروتينات البلازما. قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة التأثير الضامض فالپروئيك لدى الكبد. أنظر أيضاً "الأطفال والمراهقون" في الفقرة 2 ("قبل إستعمال الدواء").

تضعف الأدوية التالية من تأثير ديپاليت كرونو 500 ملغ:

- فينوباربیتال، پريميدون، فينيٹوئين، كاربامازيبين (أدوية أخرى تستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات)،
- مفلوكويون (دواء يستعمل لعلاج الملاريا)،
- ريفامپيسين (دواء يستعمل لعلاج السل)،

- كاربابينامد مثل إيمبيبين، بانينبيدم وميروبيديم (مضادات حيوية تستعمل لعلاج التولوثات البكتيرية).

يجب الإمتناع عن الإستعمال المشترك لحمض فالپروئيك ومستحضرات تحتوي على كاربابيندم، نظراً لأن هذا الأمر قد يضعف من نجاعة حمض فالپروئيك،

● مثبّطات پروتياز مثل لوبينافير أو ريتوناير (أدوية تستعمل لعلاج الـ HIV)،

- مستحضرات تحتوي على إستروجين (بما في ذلك جزء من أقراص منع الحمل)،
- ميتاميزول (يستعمل لعلاج الآلام والسخونة)

قد يزداد أو يضعف تأثير ديپاليت كرونو 500 ملغ بواسطة الدواء التالي:

● فلواوكسيتين (دواء يستعمل لعلاج الإكتئاب). إن تراكيز حمض فالپروئيك (المركب الفعال في ديپاليت كرونو 500 ملغ) في الدم قد تزداد، لكن لوحظت أيضاً حالات معينة لإنخفاض التراكيز.

يزيد ديپاليت كرونو 500 ملغ من التأثيرات، وأحياناً الأعراض الجانبية، للأدوية التالية:

- فينوباربیتال، پريميدون، فينيٹوئين، كاربامازيبين، لاموتريجين (أدوية تستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات)،
- مضادات الذهان (أدوية تستعمل لعلاج الإضطرابات النفسية)، بينزيديازيبينات (أدوية تستعمل لعلاج حالات التوتر والقلق)، باريتوبرات (أدوية مهدئة) ونبطات MAO (أدوية تستعمل لعلاج الإكتئاب) وكذلك أدوية أخرى تستعمل لعلاج الإكتئاب،
- كودئين (دواء يستعمل لعلاج السعال)،
- زيدوفودين (دواء يستعمل لعلاج الـ HIV)،
- أدوية التي تقلل من تخثر الدم (مثل مضادات فيثامين K أو حمض أستيليل ساليسيليك). قد تؤدي هذه الأدوية إلى زيادة الميل لحدوث نزف،
- روفيناميد (دواء يستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات) (يتطلب الأمر الحذر الخاص لدى الأطفال)،
- پروفوفول (دواء يستعمل كمنحصر للتخدير).

لدى الأطفال، فإن نسب فينيٹوئين (دواء آخر يستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات) في الدم قد تزداد إنّا تم تناوله بالتزامن مع كلونازيبام (بينزيديازيبين الذي يستعمل لعلاج حالات التوتر والقلق، وإضطراب الإختلاجات) وحمض فالپروئيك.

لدى مرضى الديرية سابقة للإختلاجات مصحوبة بغيبية (نوع معين لإختلاج عام الذي يبدأ في كلا جانبي الدماغ)، خلال صراحة للإختلاجات مصحوبة بغيبية (حالة مطولة بلّغ عن صبايغ) بُلِّغ عن هذه الأعراض مع كلونازيبام (دواء يستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات) وأدوية تحتوي على حمض فالپروئيك.

لدى مرض واحد لدى إضطراب فصامي عاطفي (إضطراب نفسي)، فإن مشاركة حمض فالپروئيك، سترزالين (مضاد الإكتئاب) وريسبيريدون (دواء مضاد للذهان) أدت إلى حالة جمود (حالة تتميز بقلّة الحركة الذي يترافق بنصلب الذي لا يستجيب لمحفز خارجي).

تداخلات أخرى

- ديپاليت لا يؤثر على نسب الليثيوم في الدم،
- ديپاليت لا يضعف من تأثير وسائل منع الحمل الهرمونية (مثلاً أقراص منع الحمل).

لدى مرضى السكري، فإن فحص الكيتونات في البول قد يؤدي إلى نتائج إيجابية خاطئة، نظراً لأن حمض الفالپروئيك بذاته يحدّث إستقلاب جزئي إلى كيتونات،

● أدوية أخرى تضرر بإستقلاب الكبد، مثل كانديديول (المستعمل لعلاج الصرع وأمراض أخرى)، قد تزيد من خطورة إلحاق الضرر بالكبد،

● بُلِّغ عن علامت ضرر دماغي (encephalopathy) و/أو تزايد في نسب الأمونيا (hyperammonemia) عند مشاركة حمض فالپروئيك مع توبيرامات (دواء يستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات)،

● إنّا تم إستعمال ديپاليت مع أستيازولاميد (دواء يستعمل لعلاج الجلوكوما)، يحدث إرتفاع في نسب الأمونيا في الدم الذي يؤدي إلى خطورة حدوث ضرر دماغي (encephalopathy)،

● إنّا تم إستعمال حمض فالپروئيك بالتزامن مع فينوباربیتال أو فينيٹوئين، فمن الجائز حدوث زيادة في نسب الأمونيا في الدم. لذا، ستبايعك طبيبك بحرص بخصوص ذلك،

● إنّا تم إستعمال حمض فالپروئيك مع كوبيتاين (دواء يستعمل لعلاج الإضطرابات النفسية)، إن خطورة إنخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (leukopenia، neutropenia) قد تزداد،

● من شأن ديپاليت أن يقلل من تركزيز أولاترازيبين (دواء يستعمل لعلاج الإضطرابات النفسية) في الدم.

إستعمال الدواء والطعام

من المستحسن تناول الدواء مع الطعام.

إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

إنّ تأثيرات ديپاليت كرونو 500 ملغ قد تزداد أو تضعف، والأعراض الجانبية قد تزداد، إذا كنت تستهلك الكحول خلال فترة العلاج. لذا عليك الإمتناع عن شرب الكحول خلال العلاج.

الحمل، الإرضاع والحصوبة

معلومات هامة للنساء

أنظر أيضاً الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال إذا:".

مخاطر فالپروات عند تناوله خلال فترة الحمل (بدون علاقة بالمرض الذي يشكّل سبباً لإستعمال فالپروات)

تحدثي مع طبيبك بشكل فوري إذا كنت تخططين للحمل أو إذا كنت حاملأ.

● إنّا تناول فالپروات خلال الحمل منوطه بالخطر. كلما إك المقدار الدوائي أكبر، كانت المخاطر أكبر، لكن كافة المقادير الدوائية إستعمالها منوط بالخطر، بما في ذلك إستعمال فالپروات بمشاركة مستحضرات طبية أخرى لعلاج الصرع.

● قد يؤدي الدواء إلى تشوهات خلقية خطيرة وقد يؤثر على التطور الجسدي والعقلي للطفل خلال نموه بعد الولادة. التشوهات الخلقية الأكثر شيوعاً التي بُلِّغ عنها تشمل إنشقاق العمود الفقري (*spina bifida*)، عندما لا تتطور عظام العمود الفقري كما ينبغي؛ تشوهات في الوجه والجمجمة؛ تشوهات في القلب، الكلى، المسالك البولية والأعضاء التناسلية؛ تشوهات في الأطراف. كذلك بلغ عن عدد من التشوهات التي تظهر سوية وتتورّث على أعضاء وأجزاء أخرى من الجسم. قد تؤدي التشوهات الخلقية إلى عجز الذي من شأنه أن يشكل محدودية خطيرة.

● بُلِّغ عن حالات إمتلاك في السمع والصمم لدى الأطفال الذين تعرضوا لـ فالپروات خلال فترة الحمل.

● تشوهات في العين التي تظهر سوية مع تشوهات خلقية أخرى بلغ عنها لدى أطفال تعرضوا لـ فالپروات خلال فترة الحمل. قد تؤثر هذه التشوهات في العين على الرؤية.

● إنّا كنت تتناولين فالپروات خلال فترة الحمل، فأنت معرضة لخطورة أكبر مقارنة بنساء أخريات لولادة طفل لديه تشوهات خلقية التي توجب علاج طبي. لذا نساء تتناولن فالپروات، فإن حوالي 11 من بين كل 100 رضيع سيعانون

من تشوهات خلقية، ذلك مقارنة بـ 3 رضع من بين كل 100 الذين يولدون لئساء لـ يعانين من صرع.

- يجب التقديرات، حتى 40-30 من الأطفال في سن ما قبل المدرسة الذين ولدوا لأمهات تناولن فالپروات خلال الحمل قد يعانوا من مشاكل نمو في الطفولة المبكرة. الأطفال المصطرون قد يعانوا من تباطؤ في تطور المشي والنطق، من مستوى ذهني منخفض أكثر مقارنة بأطفال آخرين، وكذلك من صعوبات في اللغة والذاكرة.
- إضطرابات استمرارية التوحد تم تشخيصها بتواتر أكبر لدى أطفال تعرضوا لـ فالپروات. تتوفر أدلة معينة بأن الأطفال الذين تعرضوا لـ فالپروات خلال الحمل معرضون لخطورة أكبر بأن يتطور لديهم إضطراب الإصغاء والتركيز وفرط نشاط (ADHD).

- يشرح لك طبيبك ما قد يحدث لرضيعك إنّا أصبحت حاملأ خلال فترة تناول فالپروات وذلك قبل أن يصف لك هذا الدواء. إنّا قررت في مرحلة لاحقة أكثر بأنك ترغبين في الحمل، فلا يجوز التوقف عن تناول الدواء الخاص بك أو التوقف عن إستعمال وسيلة منع الحمل الخاصة بك إلى أن تتحدثي عن ذلك مع طبيبك.
- إنّا كنت والدا لطفلة تتعاجل بـ فالپروات أو تعالج طفلة تخضع للعلاج بـ فالپروات، فعليك التوجه لطبيبك عند ظهور الأعراض لدى الطفلة.
- أقراص معينة للحمل (أقراص منع حمل تحتوي على إستروجين) من شأنها أن تؤدي إلى خفض نسب فالپروات في دمك. تأكدتي من تحدثك مع طبيبك بخصوص طريقة منع الحمل الملائمة أكثر بالنسبة لك.

● إنساني طبيبك عن تناول حمض الفوليك عندما تحاولين الحمل. يمكن أن يقلل حمض الفوليك من الخطورة العامة للعيود الفقري وإلحاض مبكر الموجودة في كل حمل. مع ذلك، من غير المرجح أن يقلل الخطورة لحدوث تشوهات خلقية النموسية لإستعمال فالپروات.

● إنّا تناولت أدوية تحتوي على حمض الفالپروئيك خلال فترة الحمل، فإن مؤشرات تخثر الدم (نسب الصفائح وفيربونوجين) وعوامل التخثر لدى حديث الولادة

- الخاص بك يجب أن يتم فحصها لكافة الإضطرابات المحتملة لتخثر الدم.
- إن حديثي الولادة لدى نساء عولجن بمستحضرات طبية تحتوي على حمض فالپروئيك خلال الثلث الأخير من الحمل قد تظهر لديهم علامات متلازمة الفطام (مثلاً عدم هدوء، فرط الحركات، إرتجاج، إختلاجات أو إضطرابات في الإطعام).
- بُلِّغ عن حالات انخفاض نسب السكر في الدم لدى حديثي الولادة لأمهات عولجن بـ فالپروات خلال الثلث الأخير من الحمل.
- بُلِّغ أيضاً عن حالات نقصور الغدة الدرقية لدى حديثي الولادة لأمهات لديهن صرع وتلقين فالپروات خلال فترة الحمل.

الرجاء إختاري وإقرئي الحالات التي تنطبق عليك من بين الحالات الموصوفة فيما يلي:

- أنا أبدأ علاجاً ب ديپاليت كرونو 500 ملغ
- أنا أنتاول ديپاليت كرونو 500 ملغ ولا أخطط للحمل
- أنا أنتاول ديپاليت كرونو 500 ملغ وأخطط للحمل
- أنا حامل وأنتاول ديپاليت كرونو 500 ملغ

أنا أبدأ علاجاً ب ديپاليت كرونو 500 ملغ

إنّا كانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها وصف ديپاليت كرونو 500 ملغ من أهلك، سيشرح لك طبيبك عن المخاطر على الجنين إذا أصبحت حاملأ. عندما يكون بإمكانك الحمل، ستحتاجين للتأكد من أنك تستعملين وسيلة منع حمل ناجمة بدون توقف خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ. تحدثي مع طبيبك إذا كنت بحاجة لإستشارة بخصوص وسيلة لمنع الحمل.

رسائل رئيسية:

- يجب نفي وجود حمل قبل بدء العلاج ب ديپاليت كرونو 500 ملغ عن طريق نتيجة فحص الحمل، مصافق عليها من قبل طبيبك،
- عليك إستعمال وسيلة منع حمل ناجمة خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ.
- عليك مناقشة طبيبك بخصوص وسائل منع الحمل المناسبة. يوفر لك الطبيب معلومات بخصوص منع الحمل، ومن شأنه أن يوجهك إلى أخصائي بغرض الإستشارة بخصوص منع الحمل،
- عليك القدوم الزيارات المنتظمة (على الأقل مرة في السنة) لدى أخصائي ذو خبرة في علاج الإضطراب ثنائي القطب أو الصرع. خلال هذه الزيارة، يتأكد طبيبك من أنك تعلمين جيداً ومدركة لكافة المخاطر والتوصيات المتعلقة بإستعمال فالپروات خلال فترة الحمل،
- إحكي لطبيبك إذا كنت ترغبين في الحمل،
- إحكي لطبيبك بشكل فوري إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملأ.

أنا أنتاول ديپاليت كرونو 500 ملغ ولا أخطط للحمل

إنّا كنت مستمرة في العلاج ب ديپاليت كرونو 500 ملغ لكثك لا تخططين للحمل، عليك التأكد بأنك تستعملين وسيلة منع حمل ناجمة بدون توقف خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ. تحدثي مع طبيبك إذا كنت بحاجة لإستشارة بخصوص وسائل منع الحمل.

رسائل رئيسية:

- عليك إستعمال وسيلة منع حمل ناجمة خلال كامل فترة علاجك ب ديپاليت كرونو 500 ملغ.
- عليك مناقشة طبيبك بخصوص وسيلة منع الحمل. يوفر لك طبيبك معلومات حول منع الحمل، ومن شأنه أن يوجهك إلى أخصائي بغرض الإستشارة بخصوص وسائل منع الحمل،
- عليك القدوم الزيارات المنتظمة (على الأقل مرة في السنة) لدى أخصائي ذو خبرة في علاج الإضطراب ثنائي القطب أو الصرع. خلال هذه الزيارة، يتأكد طبيبك من أنك تعلمين جيداً ومدركة لكافة المخاطر والتوصيات المتعلقة بإستعمال فالپروات خلال فترة الحمل،
- إحكي لطبيبك إذا كنت ترغبين في الحمل،
- إحكي لطبيبك فوراً إذا كنت في فترة الحمل أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملأ.

أنا أنتاول ديپاليت كرونو 500 ملغ وأخطط للحمل

إنّا كنت تخططين للحمل، حدي أولاً زيارة لدى طبيبك.

لا تتوقفي عن تناول ديپاليت كرونو 500 ملغ أو عن إستعمال وسيلة منع الحمل الخاصة

بك قبل أن تتحدثي عن ذلك مع طبيبك.
تقدم لك إستشارة إضافية من قبل طبيبك.
إن الرضع الذين ولدوا لأمهات الواناوي عولجن بـ فالبروات معرضين لخطورة شديدة لحدوث تشوهات خلقية ومشاكل في النمو التي قد تؤدي إلى إعاقة خطيرة.
يوجهك طبيبك إلى أخصائي ذو خبرة في علاج الإضطراب ثنائي القطب أو الصرع، بحيث يكون بالإمكان تقييم خيارات علاج بدئية في مرحلة مبكرة.
بإمكان الأخصائي أن يتخذ عدة وسائل لكي تكون مسيرة حملك سليمة قدر الإمكان وأن يتم خفض قدر استطاع إلى خطورة طفيلة وعلى جنينك.

من شأن الأخصائي أن يقرر تغيير المقدار الدوائي الخاص بك من ديهاليت كرونو 500 ملغ أو أن يحوك إلى دواء آخر، أو يوقف العلاج بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ لفترة طويلة قبل أن تصبichi حاملا - ذلك من أجل التأكد من أن مرصك مستقر.
إسألني طبيبك عن تناول حمض الفوليك عندما تخططين للحمل. حمض الفوليك يمكن أن يقلل الخطورة العامة لإشفاقاق العمود الفقري ولإجهاض مبكر الموجودة في كل حمل. مع ذلك، من غير المرجح أن يقلل الخطورة لحدوث تشوهات خلقية المنسوبة لإستعمال فالبروات.

رسائل رئيسية:

- لا تتوقفي عن تناول ديهاليت كرونو 500 ملغ، إلا إذا أوصاك طبيبك بذلك، أو تتوقفي عن إستعمال وسائل منع الحمل الخاصة بك قبل أن تتحدثي مع الطبيب وقبل إستماذكما سوياً برنامج من أجل ضمان السيطرة على حالتك ويتم خفض المخاطر على رضيعك.
- في البداية حديدي زيارة لدى طبيبك. خلال هذه الزيارة، يتأكد طبيبك بأنك مدركة تماماً وبأنك فهمت كافة المخاطر والتوصيات المتعلقة بإستعمال فالبروات خلال الحمل.

- يعاol طبيبك أن يحولك إلى إستعمال دواء آخر أو التوقف عن العلاج بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ فترة طويلة قبل أن تصبichi حاملاً.
- حديدي زيارة طارئة لدى طبيبك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً.

أنا حامل وأتناول ديهاليت كرونو 500 ملغ

لا تتوقفي عن تناول ديهاليت كرونو 500 ملغ، إلا إذا أوصاك طبيبك بذلك لأن حالتك قد تتفاقم حديدي زيارة طارئة لدى طبيبك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً. سيتم تقديم إستشارة إضافية لك من قبل طبيبك.

إن الرضع الذين ولدوا لأمهات عولجن بـ فالبروات معرضون لخطورة شديدة لحدوث تشوهات خلقية ومشاكل في التطور التي قد تؤدي إلى إعاقة شديدة. سيتم توجيهك لأخصائي ذو خبرة في علاج الإضطراب ثنائي القطب أو الصرع، بحيث يكون بالإمكان تقييم خيارات علاج بدئية.

في ظروف إستثنائية بحيث يكون فيها ديهاليت كرونو 500 ملغ هو العلاج الوحيد المتوفر من أجلك خلال الحمل، ستخضعين لتأمية حثيئة سواء بغرض علاج الخلفية المرضية لديك وكذلك من أجل فحص نمو جنيتك. أنت وزوجك بإمكانكما تلقي إستشارة وعدم بخصوص الحمل المتابعه لدى الطبروات.

إسألني طبيبك عن تناول حمض الفوليك. يمكن أن يقلل حمض الفوليك الخطورة العامة لإشفاقاق العمود الفقري ولإجهاض مبكر الموجودة في كل حمل. مع ذلك، من غير المرجح أن يقلل الخطورة لحدوث تشوهات خلقية المنوطة بإستعمال فالبروات.

رسائل رئيسية:

- حديدي زيارة طارئة لدى طبيبك إذا كنت حاملاً أو تعتقدين بأنه من شأنك أن تكوني حاملاً.
- لا تتوقفي عن تناول ديهاليت كرونو 500 ملغ، إلا إذا أوصاك طبيبك بذلك.
- تأكدي من توجيهك إلى أخصائي ذو خبرة في علاج الصرع أو الإضطراب ثنائي القطب من أجل تقييم خيارات علاج بدئية.

- عليك تلقي إستشارة شاملة بخصوص المخاطر المنوطة بتناول ديهاليت كرونو 500 ملغ خلال فترة الحمل، بما في ذلك الفعل الماسخ (تشوهات خلقية) وإضطرابات في التطور الجسدي والعقلي لدى الأطفال.
- تأكدي من توجيهك إلى أخصائي للمتابعة قبل الولادة من أجل تشخيص ظهور محتمل لتشوهات.

في كافة الحالات، إحرصى على قراءة كراسة المتعاجة وطباعة المعلومات حول الأمان للمتعاجة التي ستحصلين عليها من طبيبك.

الإرضاع

تتطلب كميات قليلة من حمض فالبرويثك إلى حليب الأم. إذا كنت مرضعة، إستشيري طبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الخصوية

قد يلحق هذا الدواء الضرر بالخصوية لديك. مع ذلك، أظهرت البلاغات بأن هذه التأثيرات تقل بعد التوقف عن العلاج بالمركب الفعال أو من شأنها أن تقل بعد خفض المقدار الدوائي. لا تتوقف عن العلاج الخاص بك إلا إذا تحدثت عن ذلك مسبقاً مع طبيبك.

السياقة وإستعمال الماكناات

لا يجوز السياقة أو إستعمال الماكناات بدون إستشارة طبيبك.

عند بداية العلاج بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ، إذا كنت تتناول مقادير دوائية مرتفعة أو تتناول بالإضافة دواء آخر الذي يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، قد تعاني من أعراض في الجهاز العصبي المركزي مثل نعاس أو إرتباك، الأمر الذي قد يضعف من زمن إستجابتك، معنى ذلك بأن قدرتك على السياقة أو إستعمال الماكناات ستضعف.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي هذا الدواء على 47.21 ملغ صوديوم (المركب الأساسي في ملح الطاولة) في قرص واحد ذي تحرير مطوّل.

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إن لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر. المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.
العلاج بـ **ديهاليت كرونو 500** ملغ يجب أن يعطى للمرة الأولى وأن يكون تحت إشراف طبيب مختص بالصرع أو بالإضطراب ثنائي القطب.

من الجائز أن يوصي الطبيب بتقسيم المقدار الدوائي اللازم إلى مرتين في اليوم. يفضل تناول الدواء خلال وجبات الطعام، فمن الجائز أن يوصي طبيبك بعلاج إذا كان مرصك متوازناً جيداً بواسطة العلاج، فمن الجائز أن يوصي طبيبك بعلاج مرة في اليوم.

إذا وجد لك مرض كلوي و/ أو نقص بروتين في الدم، فمن الجائز حدوث إرتفاع في نسب المادة الفعالة لـ **ديهاليت كرونو 500** ملغ (حمض فالبرويتك) في دمك. إذا دعت الحاجة، يقلل الطبيب المقدار الدوائي اليومي الخاص بك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

عند الإنتقال إلى العلاج بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ من أقراص أخرى ليست ذات

تحرير مطوّل، يجب التأكد من أن نسب حمض الفالبرويثك في الدم مرتفعة بشكل كاف.
الإنتقال يتم بموجب تعليمات طبيبك.

يجب دائماً تناول الأقراص مع كأس كبيرة من الماء. لا يجوز تناول الأقراص ذات التحرير المطوّل مع مشروب غازي مثل ماء الصودا.

ممنوع مضع أو هرس الأقراص مع شاشة أو لها الأمر من شأنه أن يؤثر على طريقة امتصاص الدواء في الجسم.

بالإمكان شطر القرص عندما يتخطب الأمر مقداراً دوائياً ذي 250 ملغ (نصف قرص).
ديهاليت كرونو عبارة عن أقراص ذات تحرير مطوّل للمادة الفعالة. بعض المركبات غير الفعالة لا تمتص في الجهاز الهضمي وبالإمكان رؤيتها في البراز.

إذا تناولت بالخطأ مقدراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مغرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، إستشر طبيبك بشكل فوري لكي يتخذ كافة وسائل الطوارئ الضرورية أو توجه إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إن التأثيرات غير المرغوبة المفصلة تحت "أعراض جانبية" قد تزداد، أي أنه، سواء الكبار والأطفال قد يعانوا من إحتمال أكبر لإختلاجات أو لإضطرابات سلوكية.
بلُغ عن حالات وفاة متفردة بعد مقدار دوائي مفرد كبير.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الموعد المخصص، فلا يجوز تناول مقداراً دوائياً مضاعفاً. تناول المقدار الدوائي التالي في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب. يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

لا يجوز تغيير المقادير الدوائية، قطع أو التوقف عن علاجك بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ بدون إستشارة طبيبك. تحدث مع طبيبك **مسبقاً** إذا كنت تعتقد بأنه تطور لديك عدم تحمل أو تغير في حالتك الصحية.
ولا قد تعرض نجاح علاجك للخطر وتبدأ ثانية المتاعبات من إختلاجات.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.
إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر طبيبك أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال ديهاليت كرونو 500 ملغ قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهب من قائمة الأعراض الجانبية من الجائز ألا تعاني أياً منها.
شيعوع الأعراض الجانبية مصفني كالتالي:

شائعة جداً: <p>تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 متعالجين</p>
شائعة: <p>تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 100 متعالج</p>
غير شائعة: <p>تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 1,000 متعالج</p>
نادرة: <p>تظهر لدى 1 حتى 10 من بين 10,000 متعالج</p>
شائعة جداً: <p>تظهر لدى أقل من 1 من بين 10,000 متعالج</p>
شيعوع غير معروف: <p>لا يمكن تقييم الشيعوع من المعطيات المتوفرة</p>

أورام حميدة، خبيثة وغير مدعدة (بما في ذلك كيسيات ولحميات)

نادرة: لا تتطور الخلايا الجذعية لخلايا الدم كما يجب في نخاع العظم (متلازمة خلل التنسج النخاعي، لوبخت في تعداد الدم).

إضطرابات الدم والجهاز الليمفاوي

شائعة: إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)، الصفيحات الدموية (thrombocytopenia) أو إنخفاض خطير في خلايا الدم البيضاء (leukopenia).

غير شائعة: إنخفاض خطير لكافة خلايا الدم (pancytopenia).

نادرة: إضطراب في الأداء الوظيفي لنخاع العظم مع إنخفاض في عدد خلايا الدم البيضاء (lymphopenia, neutropenia) أو مع إنخفاض ملحوظ في نوع معين من خلايا الدم البيضاء (agranulocytosis)، عدم تشكل خلايا دم حمراء (aplasia)، أو مع تطور لخلايا دم حمراء ضخمة بأبعاد طبيعية (macrocytosis) أو قلبية (macrocytic anemia).
لوحظ هذا الأمر في تعداد الدم وأحياناً عن طريق علامات مثل سخونة وصعوبات في التنفس.

إضطرابات صمامية

غير شائعة: تزايد نسب الهورمون المضاد لإدرار البول (متلازمة الإفراز غير الملائم لهورمون ADH [مضاد لإدرار البول - SIADH])، فرط النمو الشعر لدى النساء، رجولة، حب الشباب، تساقط الشعر بنمط نكوري و/ أو فرط الإندروجينية.

نادرة: خلل في الأداء الوظيفي للغدة الدرقية الذي قد يؤدي إلى إرهاق وإلى زيادة في الوزن.

إضطرابات في الإستقلاب والتغذية

شائعة جداً: إرتفاع منفردي ومعدل في كمية الأمونيا في الدم (hyperammonemia) بدون تأثير على الأداء الوظيفي للكبد، لكن أحياناً مع أعراض في الجهاز العصبي المركزي مثل مشاكل في التوازن وفي تنسيق الحركات (coordination)، إرهاق أو قلة يقظة مترافقة بتقيؤات (أنظر أيضاً "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" في الفقرة 2).

شائعة: زيادة في الوزن (عامل خطورة لظهور مياض متعددة الكيسات) أو إنخفاض في الوزن، تزايد الشهية للطعام أو قلة الشهية للطعام، إنخفاض نسب الصوديوم في الدم (hyponatremia) الذي قد يؤدي إلى إرتباك.

نادرة: فرط بدانة.

إضطرابات نفسية

شائعة: إرتباك، هلوسة (رؤية، الشعور أو سماع أشياء غير واقعية)، عدوانية*، عدم هدوء*، إضطرابات في الإصغاء*.

غير شائعة: سخط، فرط نشاط.

نادرة: سلوك شاذ*، عجز تعليمي*، فرط نشاط نفسي وجسدي (نفسي - حركي)*.*
*لوحظت هذه الأعراض الجانبية خاصة لدى الأطفال.

إضطرابات في الجهاز العصبي

شائعة جداً: إرتجاف.

شائعة: إضطرابات خارج الهرمية (إضطرابات في الحركة التي تؤثر على طريقة تحكم الدماغ بنشاط العضلات، مثل إنقباضات عضلية خارجة عن السيطرة؛ بعض هذه الإضطرابات هو دائم)، حالة من ضبابية الوعي (فقر الوعي)*، نعاس، إرتجاف (تقلصات)*، خلل في الذاكرة، صداع، حركات سريعة وخارجة عن السيطرة للعينين (nystagmus)، دوام وخرر أو وخز (paresthesia).

غير شائعة: سبات*، ضرر دماغي*، إعتلال دماغي*،*، خمول (lethargy)*، متلازمة

باركينسون (حيث تكون عكوسة عندما يتم التوقف عن العلاج بحمض الفالبرويثك)، تصلب زائد للعضلات (spasticity)، صعوبة في تنسيق الحركات (ataxia) مثل المشي بشكل غير مستقر، تفاقم الإختلاجات (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" في الفقرة 2).

علامات تضمر الدماغ (encephalopathy) تم وصفها خلال وقت قصير بعد إستعمال أدوية التي تحتوي على حمض فالبرويثك. تكون هذه العلامات عكوسة عند التوقف عن العلاج، في حالات معينة. كانت هذه العلامات منوطة بإرتفاع نسب الأمونيا في الدم، وكذلك إرتفاع في نسب فينوباربیتال في الدم في حالة العلاج المشترك مع فينوباربیتال.

نادرة: إزدواج الرؤية، تدني ملحوظ في الأداء الوظيفي العقلي (خرف)، الذي هو كروس مع التوقف عن العلاج، وأحياناً منوط بإنخفاض حجم الدماغ؛ تراجع طفيف في الأداء الوظيفي العقلي (إضطراب إدراكي).

تم تلقي بلاغات نادرة عن مرض مناعي (اعتلال دماغي مَرْمَن) يترافق بتضمر الأداء الوظيفي الدماغي والقدرة العقلية، خاصة عن إستعمال مقادير دوائية مرتفعة أو في حالة العلاج المشترك مع أدوية أخرى تستعمل لعلاج إضطرابات الإختلاجات. شيعوع غير معروف: نعاس.

* بلغ عن حالات لضبابية الوعي (فقر الوعي) وخمول (lethargy) التي تؤدي إلى إضطرابات في الوعي، بما في ذلك سبات عابر أو تضمر الدماغ (encephalopathy)، التي كانت أحياناً منوطة بإختلاجات بشكل أكثر تواتراً، خاصة في حالة العلاج المشترك مع فينوباربیتال أو توپيرامات أو جراء رفع المقدار الدوائي بشكل مفاجئ. هذه الأعراض قابلة للكمس عند خفض المقدار الدوائي أو عند التوقف عن العلاج.
خلال **علاج طويل الأمد بـ ديهاليت كرونو 500** ملغ، خاصة إذا كان بالإشتراك مع فينيتوئين (دواء آخر لعلاج الصرع)، قد تظهر علامات لضمر دماغي (encephalopathy): إرتفاع في عدد الإختلاجات، إنعقاد الحافز، حالة من ضبابية الوعي (فقر الوعي)، إنخفاض توتر العضلات (نقص توتر العضلات) وتغيرات ملحوظة في النشاط الكهربائي للدماغ (EEG).

إضطرابات في الأذنين والأذن الباطنة (الأذن الداخلية)

شائعة: فقدان السمع (أحياناً للأبد).

شيعوع غير معروف: طنين (رنين في الأذنين).

إضطرابات في الأوعية الدموية

شائعة: رضوض عرضية أو نزف (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" و"الحمل، الإرضاع والخصوية" في الفقرة 2).

غير شائعة: التهاب في الأوعية الدموية (vasculitis).

إضطرابات في التنفّس، إضطرابات في الصدر والمنصف

غير شائعة: صعربات في التنفس والم جراء التهاب في غشاء الرئتين أو تراكم سوائل بين الرئتين والمنصف الصدري (انصباب جنبي).

إضطرابات في الجهاز الهضمي

شائعة جداً: غثيان.

شائعة: تقيؤات، إضطرابات في اللثة (خاصة فرط تنسج اللثة)، التهاب المخاطية في الفم(جرع، إنتفاخ، تقرحات وشعور بحرقة في الفم)، إسهال خاصة عند بداية العلاج، وألم في أعلى البطن الذي يخفني عادة خلال عدة أيام من دون التوقف عن العلاج.
غير شائعة: تضمر البنكرياس، أحياناً يكون الأمر مميتاً (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:" في الفقرة 2)، إنتاج متزايد للعاب (خاصة عند بداية العلاج).

إضطرابات في الكبد والطرق الصفراوية

شائعة: تضمر خفيف (أحياناً قاتل) في الكبد غير متعلق بالمقدار الدوائي (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا:" في الفقرة 2).

إضطرابات في الجلد والتنسج تحت الجلد

شائعة: فرط حساسية، تساقط عابر للشعر و/ أو متعلق بالمقدار الدوائي، إضطرابات في الأظافر وفي فراش الظفر.

غير شائعة: إنتفاخ (وذمة وعائية) مع شرى مؤلم، حاك، خاصة حول العينين، الشفتين، الحنجرة وصندوق الصوت، أحياناً أيضاً على اليدين، راحتي القدمين والأعضاء التناسلية؛ طفح جلدي، تغيرات في الشعر (مثل تغير في قوام الشعر، تغير في لون الشعر، نمو شان للشعر).

نادرة: ردود فعل جلدية خطيرة: حويصلات، تقشرات أو أنزفة جلدية (بما في ذلك الشفتين، العينين، الفم، الأنف، الأعضاء التناسلية، اليدين أو القدمين) مع أو بدون طفح، أحياناً مع أعراض شبيهة بالأنفلونزا مثل سخونة، قشعريرة أو الآم في العضلات (متلازمة ستيفنس - جونسون أو نخر بشروي سمي [Toxic epidermal necrolysis]، متلازمة لايل [Lyell syndrome]؛ طفح جلدي (خاصة في راحتي اليدين وأخمص القدمين) أو آفات جلدية مع محيط وردي/احمر ومركز شاحب التي من شأنها أن تكون شاكّة، حرشفية، أو مليئة بسائل (حمامي متعددة الأشكال [erythema multiforme]؛ متلازمة تترافق بطفح جلدي، سخونة، إنتفاخ في الغدد الليمفاوية وإرتفاع في عدد خلايا دم بيضاء معينة (eosinophils) مع تضمر محتمل لأعضاء أخرى ناجم عن الدواء (متلازمة الطفح الدوائي الذي يترافق بكثرة الحمضات وأعراض جهازية - DRESS).

إضطرابات في الجهاز العضلي والهيكلي وفي التنسج الضام

بلُغ عن حالات لإنخفاض في كثافة العظام (قلة العظم ومشاشة العظام)، التي تؤدي إلى حدوث كسور.
إستشر الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تتلقى علاجاً طويل الأمد بدواء مضاد للصرع.
إذا وُجدت لديك سابقة لمشاشة عظام، أو إذا كنت تتناول أيضاً كورتيزون أو هورمونات ستيروئيدية أخرى.

نادرة: رد فعل تتهاجم فيه أجهزة دفاع الجسم التنسج الضام للجسم نفسه مع علامات مثل ألم في المفاصل، سخونة، إرهاق وطفح جلدي (ذئبة إحمراوية جهازية [مرض لوپوس]، أنظر أيضاً "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" في الفقرة 2)، تفكك خفيف للعضلات مع ضعف وآلم عضلي (إنحلال العضلات المخططة).

إضطرابات في الكلى والجهاز البولي

شائعة: عدم السيطرة على التبول.

غير شائعة: قصور كلوي، علامات ذلك قد تشمل إنخفاض في نتاج البول.

نادرة: تيول لا إرادي، أو تزايد الرغبة في التبول، إضطراب يشرك التهاب في الكلى (التهاب الكلية الأنبوبي الخلالي)، خلل في الأداء الوظيفي الكلوي الذي يتميز بطرح الفوسفات، السكر ومركبات البروتين في البول (متلازمة فانكوني) حيث يترافق بغائض من الحمض في الدم (حماض إستقلابي).

إضطرابات في الجهاز التناسلي والتدبيريين

شائعة: آلام طمشية (dysmenorrhea).

غير شائعة: عدم إنتظام أو إنقطاع الطمث (amenorrhea).

نادرة: عدم الخصوبة لدى الرجال، الذي هو عادة عكوس بعد التوقف عن العلاج ومن شأنه أن يكون عكوس بعد خفض المقدار الدوائي.
لا تتوقف عن العلاج الخاص بك بدون التحدث مسبقاً مع طبيبك.

تزايد نسب الهورمون الجسدي تستوستيرون في الدم وتغيرات في الكيسات المبيضية (المبيض متعدد الكيسات).

إضطرابات خلقية (وراثية)، عائلية وجينية

أنظر فقرة "الحمل، الإرضاع والخصوية".

إضطرابات عامة

غير شائعة: حرارة منخفضة أكثر للجسم (hypothermia)، تراكم سائل في الزراعين و/أو الرجلين (وذمة محيطية).

أعراض جانبية في الفحص

نادرة: خلل في تحزّر الدم، الذي يمكن تشخيصه عن طريق عدم سلامة القيم في فحص التشنّز (أنظر أيضاً "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء" و"الحمل، الإرضاع والخصوبة" في الفقرة 2).
إنخفاض نسب فيتامين B7 في الدم (نقص في البيوتين).

أعراض إضافية

عليك إبلاغ طبيبك بشكل فوري إذا كنت تعاني من أعراض جانبية ليست متعلقة **بالمقدار الدوائي**، مثل علامات محتملة لتضمر الكبد أو البنكرياس (أنظر الفقرة 2 "قبل إستعمال الدواء")، هو سفير قيماً إذا يجب مواصلة العلاج بـ ديهاليت كرونو 500 ملغ.

أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال

بعض الأعراض الجانبية لـ فالبروات تحدث في أوقات مقاربة أكثر لدى الأطفال أو أنها تكون أشد خطورة لدى الأطفال مقارنة بالكبار. هذه تشمل تضمر الكبد، التهاب البنكرياس (pancreatitis)، عدوانية، عصبية، إضطرابات في الإصغاء، سلوك غير إعتيادي، فرط نشاط نفسي وجسدي (نفسي - حركي) وصعوبات في التعلم.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

https://sideeffects.health.gov.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

تحجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجان رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابيتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة واللويحة (بليستر).

يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين

لا توجد شروط تخزين خاصة.
يوصى بحفظ الدواء بدرجة حرارة الغرفة.

لا يجوز رمي أدوية في المجاري (مثلاً في المرحاض أو في المغسلة).
إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال.
تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Hypromellose, hydrated colloidal silica, polyacrylate 30% dispersion, ethylcellulose, saccharin sodium, macrogol 6000, talc, colloidal anhydrous silica, titanium dioxide

كمية الصوديوم في كل قرص هي 47.21 ملغ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

أقراص مطبولة، ماثالوة، لونها أبيض مع خط للسطر. 30 قرصاً ضمن عبلة لويحة.
صاحب الإمتياز والمستورد وعنوان: سانوفي أفنتيس إسرائيل م.ض.ب. ص.ب. 8090 تانانيا.

تم إعداها في تشرين الأول 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

1193327953

من أجل سهولة وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.