

ليكفيو 284 ملغم

محلول للحقن في محقنة جاهزة للاستعمال مع واقى إبرة، للحقن تحت الجلد

المادة الفعالة:

يحتوي كل 1.5 مل من المحلول في محقنة جاهزة للاستعمال مع واقى إبرة على إنكليسيران الصوديوم (inclisiran sodium) بما يعادل 284 ملغم إنكليسيران.

كل 1 مل يحتوي على إنكليسيران الصوديوم يعادل 189 ملغم من إنكليسيران.

المواد غير الفعالة ومسبيات الحساسية: انظر البند 6 "معلومات إضافية" والبند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مرئيات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

ويصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تتعطه للأخرين؛ لأنّه قد يضرهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك الصحية وحالتهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

ليكفيو معد للبالغين الذين لديهم فرط كوليسترول الدم الأولي (العائلي متغير الأزدواجه أو غير العائلي)، أو عسر شحميات الدم المختلط، كاضافة إلى الحمية الغذائية:

- بالدمج مع ستاتين أو بالدمج مع ستاتين وعلاجات أخرى لخفض مستويات الدهنيات في الدم، لدى متعالجين لا يحققون القيم المرجوة من الكوليسترول من نوع LDL عند إعطائهم الحد الأقصى من جرعة ستاتين التي يمكن تحملها، أو

- كعلاج وحيد أو بالدمج مع علاجات أخرى لخفض مستويات الدهنيات في الدم، لدى متعالجين لا يستطاعون تحمل ستاتينات أو أن هناك مانع استعمال لإعطائهم ستاتينات.

المجموعة العلاجية: أدوية تؤثر في الدهنيات (اللبيدات). أدوية أخرى تؤثر في الدهنيات (اللبيدات).

يحتوي ليكفيو على المادة الفعالة إنكليسيران. يخفض إنكليسيران مستويات الكوليسترول من نوع LDL ("السيسي")، الذي قد يسبب مشاكل في القلب والدورة الدموية عندما تكون مستوياته مرتفعة.

يعمل إنكليسيران عبر إعاقة الحمض النووي الريبيوزي (مادة وراثية في خلايا الجسم) للحد من إنتاج بروتين يدعى PCSK9. يمكن أن يرفع هذا البروتين مستويات الكوليسترول من نوع LDL، ويساعد منع إنتاجه على خفض مستويات الكوليسترول LDL.

2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجحية) لإنكليسيران أو لأحد المكونات الأخرى التي يحتويها الدواء (المفصلة في البند 6).

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بليكفيو أخبر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة إذا:

• كنت تتلقى علاجاً بغسيل الكلي

• كنت تعاني من مرض كيد خطير

• كنت تعاني من مرض كل خطير

الأطفال والمرأهقون:

هذا الدواء غير معد للأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاما.

ليست هناك معلومات متعلقة بسلامة ونجاعة استعمال هذا الدواء لدى الأطفال والمرأهقين دون سن 18 عاما.

التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية: إذا كنت تتناول أو تتناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طيبة ومكمّلات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل، الإعراض والخصوصية:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تظنين أنك حامل، أو تخططين للحمل، عليك استشارة الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

هناك معلومات محددة حول الاستعمال أثناء الحمل، لهذا يجب تجنب استعمال ليكفيو خلال الحمل.

ليس معروفاً فيما إذا كان ليكفيو ينتقل إلى حليب الأم. سيساعدك الطبيب في اتخاذ القرار فيما إذا كان يمكنك متابعة الرضاعة أو بدء العلاج بليكفيو. سينظر الطبيب في الفائدة التي تجنينه من العلاج مقابل الخطر المحتمل على طفلك عند الرضاعة خلال العلاج.

الخصوبة

لا تتوفر معلومات عن تأثير ليكفيو على الخصوبة لدى البشر. في الأبحاث على الحيوانات، لم يشاهد تأثير على الخصوبة.

السيارة واستعمال الماكينات:

يؤثر ليكفيو قليلاً أو لا يؤثر إطلاقاً في قدرتك على السيارة أو تشغيل الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مرئيات الدواء:

يحتوي ليكفيو على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملليمول من الصوديوم (23 ملغم) في كل جرعة، أي إنه يعتبر في الواقع "خالياً من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

عليك الفحص مع الطبيب، الممرضة أو الصيدلي إذا لم تكن متاكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

الجرعة الموصى بها غالباً من ليكفيو هي 284 ملغم بالحقن تحت الجلد. تُعطي الجرعة التالية بعد 3 أشهر، وبعد ذلك تُعطي جرعات إضافية كل 6 أشهر.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

قبل بدء العلاج بليكفيو، احرص على تناول تغذية لخفض الكوليسترول ومن المتوقع أن تتناول ستاتين. عليك أن تحافظ على اتباع هذه التغذية وتواصل تناول ستاتين طوال كل الفترة التي تتناول فيها ليكفيو.

ليكفيو معد للحقن تحت الجلد في منطقة البطن. يشتمل موقع الحقن البديل على الذراع العلوية أو الفخذ. يعطي طبيب أو ممرضة (أحد أفراد الطاقم الطبي) ليكفيو لك.

إذا تناولت عن طريق الخطأ، جرعة أعلى

سوف يقوم الطبيب أو الممرضة (جهة طبية) بإعطاءك الدواء. حالة غير مرحلة الحدوث، قد تُعطي أكثر من اللازم من الدواء (جرعة مفرطة)، عندها سوف يفحصك الطبيب أو جهة طبية أخرى تحسباً لحدوث أمراض جانبية.

إذا تسببت تناول جرعة ليكفيو

إذا تخطيت موعد الحقن، توجه إلى الطبيب أو الممرضة في أسرع وقت ممكن لتحديد موعد الحقن التالي الخاص بك.

يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، لا يجوز لك التوقف عن استعمال الدواء من دون استشارة الطبيب.

يمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ليكفيو أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل ألا تعاني من أي منها.

أعراض جانبية شائعة (common) أعراض تظهر لدى 10-10% من مستعملين من بين 100:

• رد فعل في موقع الحقن، مثل: آلم، احرار أو مفعح.

إذا ظهر عارض جانبي، إذا تفاقم أي من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

 من الممكن تبليغ وزارة الصحة بأعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يحوال إلى استماراة على الإنترن特 للت bliغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.**5. كيفية تخزين الدواء؟**

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤبة الأولاد / أو الأطفال، وهكذا تجنب التسمم. لا تسبّب التقيّف دون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة أقل من 30°C. يمنع التجميد.

سيفحص الطبيب، الصيدلي أو الممرضة الدواء، ويخلصون منه في حال كان يتضمن جزيئات.

لا يجوز التخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو في سلة النفايات المنزلية. يتخلص الطبيب، الصيدلي أو الممرضة من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

water for injections, sodium hydroxide, concentrated phosphoric acid.

(انظر البند 1 "يحتوي ليكفيو على الصوديوم")

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة

ليكفيو هو محلول صاف، عديم اللون ضارب إلى الأصفر الباهت، خال من الجزيئات.

تحتوي كل عبوة على محقنة جاهزة للاستعمال مع واقى إبرة، للاستعمال لمرة واحدة.

اسم صاحب التسجيل والمُستورد وعنوانه:

نوفاريس إسرائيل م.ض.، ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحريرها في تشرين الأول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 99-36715-15-93-67.

لتيسير قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. مع هذا فالدواء معذ لكلا الجنسين.