

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ז - 1986

התרופה משוקקת על פי מרשם רפואי בלבד

ג'נדבירה®

טבליות מצופות 150 מ"ג/150 מ"ג/200 מ"ג/10 מ"ג

150 מ"ג	אלביטגראביר (elvitegravir)	חומרים פעילים: כל טבליה מכילה –
150 מ"ג	(cobicistat)	קוביס'יסטאט (cobicistat)
200 מ"ג	(emtricitabine)	אמטריציטאבין (emtricitabine)
10 מ"ג	(tenofovir alafenamide)	טנוfovיבר אלאפנאמיד (tenofovir alafenamide)

חומרים בלתי פעילים ואלרגנים: ראה סעיף 6 "מידע נסף".

קראו בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה זו מכיוון שהוא מכיל מידע חשוב עבורך. עלון זה מכיל מידע חינני על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות נספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. שמור עלון זה. יתכן שתצטרכך לקרוא אותו שוב. תרופה זו נרשמה עבורה בלבד. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה לשלה. אם אתה חש בתופעות לוואי פנה לרופא או לרוקח, גם אם אתה חש בתופעות לוואי שאין מוזכרות בעalon (ראה סעיף 4).

תרופה זו מיועדת למבוגרים, למתבגרים וילדים בני 6 שנים ומעלה, השוקלים 25 ק"ג לפחות.

1. למה מיועדת ג'נדבירה?

ג'נדבירה היא טבליה יחידה לטיפול ב齊hom החיסוני האנושי 1 (1-HIV) במבוגרים, במתבגרים ובילדים בני 6 שנים ומעלה השוקלים 25 ק"ג לפחות.

אם ג'נדבירה רשום עבורך, המידע הקיים בעalon זה מיועד לך (אנא החלף את המילה " לך" במילה "לך").

קבוצה תרפואית: ג'נדבירה מכילה ארבעה חומרים פעילים:

- אלביטגראביר (elvitegravir), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב אינטגראז
- קובייסטאט (cobicistat), מאיץ (מגבר את השפעתו) של אלביטגראביר
- אמטריציטאבין (emtricitabine), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב טנסקריפטاز הופכי של נוקלאוזיד (NRTI)
- טנוfovיבר אלאפנאמיד (tenofovir alafenamide), תרופה נגדת נגיפי רטרו המוכרת כמעכב טנסקריפטاز הופכי של נוקלאוזיד (NtRTI)

ג'נדבירה מפחיתה את כמות ה-HIV בגוף. היא תשפר את תפקוד מערכת החיסון שלך ותפחית את הסיכון שתפתח מחלות הקשורות ב齊hom ב-HIV.

2. לפני שימוש בג'נדבירה

X אין להשתמש בתרופה אם

- אתה רגיש (אלרגי) לאלביטגראביר, קובייסטאט, אמטריציטאבין, טנוfovיבר אלאפנאמיד, או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה תרופה זו (רשומים בסעיף 6 של עalon זה).

אם אתה נוטל אחת מהתרופות הבאות:

- אלפוזוין (משמשת לטיפול בהגדלה של בלוטת הערמוניית)
- דיביגטロン (משמשת למניעה וטיפול בקרישוי דם)
- אמיודרואן, כינידין (משמשות להסדרת קצב לב בלתי סדיר)

- קרבמצפון, פנוברביטל, פניטואין (משמשות למניעת פרכוים)
- ריפאמיצין (משמשת למניעת שחפת וziehominis אחרים ולטיפול בהם)
- דיהידרוארגוטמיין, ארגומטרין, ארגוטמין (משמשות לטיפול באבי ראש מגנטוניים)
- ציסאפריד (משמשת להקלת על בעיות קיבת מסימות)
- פרע מחרור (<i>Hypericum perforatum</i> , צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון וחרדה או מוצאים המכילים אותו)
- לומיטפייד, לובסטטין, סימבסטטין (משמשות להפחחת רמת הcolesterol בدم)
- לורסידון, פימודיז (משמשת לטיפול במחשובות או תחששות לא תקין)
- סילדנפלייל (כאשר משתמשים בה לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורק - מחלת ריאות הגורמת לקשי נשימה)
- מידזולם, טרייזולם במנת פומי (עווזרות לשון /או לשך חרדה)
← אם אחד הדברים הללו חל עליו, אסור לך ליטול ג'נדבירה ועליך לספר על כך לרופאך מיד.

■ **ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה זו**

בעת נטילת ג'נדבירה עליך להישאר תחת השגחת רופא.

תרופה זו אינה מרפאת זיהום ב-VIH. בעת נטילת ג'נדבירה עדין יתכן שתפתח זיהומים או מחלות אחרות הקשורות בזיהום ב-VIH.

יש להיוועץ ברופא לפני נטילת ג'נדבירה:

- אם יש לך בעיות בכבד או עבר של מחלת כבד, כולל דלקת כבד. מטופלים עם מחלת כבד כרונית כולל דלקת כבד כרונית מסווג B או C, המטופלים בתרופות נוגדות נגיפי רטרו, נתונים בסיכון רב יותר לפתח סיבוכים חמוריים בכבד שיש להם פוטנציאל להיות קטלניים. אם יש לך זיהום בדלקת כבד מסווג B, הרופא שקול בקפידה מה משטר הטיפול הטוב ביותר עבורך.
- אם יש לך זיהום בדלקת כבד מסווג B, בעיות בכבד עלולות להחמיר אחרי שתפסיק ליטול ג'נדבירה. חשוב לא להפסיק ליטול ג'נדבירה בלי להיוועץ ברופא: ראה סעיף 3, "אל תפסיק ליטול ג'נדבירה".
- אם הייתה לך מחלת כליות בעבר או במידה ובבדיקות הדם העלו בעיות עם הכליות שלך. יתכן והרופא שלך יבקש לבצע בדיקות דם נוספת על מנת לבחון את פעילות הכליות שלך בתחילת ובמהלך הטיפול עם ג'נדבירה.

בעת נטילת ג'נדבירה

אחרי שהתחלת ליטול ג'נדבירה, עליך לשים לב:

- לסימני דלקת או זיהום
- לכאב מפרקיים, נוקשות או בעיות בעצמות

← אם תבחן באחד מהתסמים הללו ספר מיד לרופא. למידע נוסף ראה סעיף 4, "תופעות לוואי".

קיימת אפשרות כי תחווה בעיות בכליות בגלל נטילת ג'נדבירה במשך תקופה ארוכה (ראה "ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה זו").

ילדים ומתבגרים

אין לתת תרופה זו לילדים בני 5 שנים ומטה, או השוקלים פחות מ-25 ק"ג ללא תלות בגיל. השימוש בג'נדבירה בילדים בני 5 שנים ומטה עדין לא נחקר.

תרופות אחרות וג'נדבירה

אם אתה לוקת, לוקת לאחרונה, או יתכן ותיקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. ג'נדבירה עשויה להגיב עם תרופות אחרות. הדבר עשוי להשפיע על הכמות של

ג'נדבירה או תרופות אחרות בדם. התרופות שller עלולות להפוך לפעול כראוי, או שתופעות לוואי כלשהן עלולות להחמיר. במקרים מסוימים הרופא יצרר לשנות את מינון התרפיה או לבדוק את רמת התרפיה בדם.

תרופות שאין ליטול עם ג'נדבירה:

- אלפודזין (משמשת לטיפול בהגדלה של בלוטת הערמוניית)
- אמיידרון, כינידין (משמשות להסדרת קצב לב בלתי סדי)
- קרבנזfine, פנוברביטל, פנטואין (משמשות למניעת פרכוסים)
- דיביגטן (משמשת למניעת שחפת ויזומות אחרים ולטיפול בהם)
- ריפאמפיין (משמשת למניעת שחפת ויזומות אחרים ולטיפול בהם)
- דיהידרוגטמין, ארגומטרין, ארגוטמין (משמשות לטיפול במיגנה)
- ציסאפריד (משמשת להקלת על בעיות קיבה מסוימות)
- פרע מחורר (*Hypericum perforatum*, צמח מרפא המשמש לטיפול בדיכאון וחרדה) או מוצרים המכילים אותו
- לומיטפיד, לובסטטין, סימבסטטין (משמשות להפחחת רמת הcolesterol בדם)
- לורסידון, פימוזיד (משמשת לטיפול במחשבות או תוחשות לא תקין)
- סיילאנפיל (כאשר משתמשים בה לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי - מחלת ריאות הגורמת לקשה בשינה)
- מידזולים, טרייצולם במתן פומי (עוזרות לישון / או לשכך חרדה)

← אם אתה נוטל אחת מהתרופות האלה, **אל תיטול ג'נדבירה וספר מיד לרופא.**

תרופות המשמשות לטיפול בziehom בדלקת כבד מסוג B:

אסור ליטול ג'נדבירה עם תרופות המכילות:

- טנופובייר אלאנפאנמיד
- טנופובייר דיסופורוקסיל
- למיבודין
- אדפובייר דיפיבוקסיל

← **ספר לרופא** אם אתה נוטל אחת מהתרופות האלה.

סוגי תרופות אחרים:

ספר לרופא אם אתה נוטל:

- **תרופות נגדות פטריות**, המשמשות לטיפול בziehomים פטריטיים, כמו:
 - קטוקונזול, איטרקונזול, וויריקונזול, פוסקונזול ולוקונזול
- **אנטיביוטיקה**, המשמשת לטיפול בziehomים חידקיים כולל שחפת, המכילה:
 - ריבובוטין, קלריטרומיצין וטליתרומיצין
- **נגדי דיכאון**, משמשים לטיפול בדיכאון:
 - תרופות המכילות טרזודון או אציטילופרם
- **תרופות הרגעה ותרופות משרות שינה**, המשמשות לטיפול בחרדה:
 - בוספירון, קלוראזפאט, דיאזפאם, אסטצולם, פלורזפאם, זולפידם ולורזפאם
- **תרופות מדכאות מערכת החיסון**, משמשות לשילטה בתגובה מערכת החיסון אחריו השטלה, כמו:
 - צ'יקלוסופרין, סיורולימוס וטקרולימוס
- **קורטיקוסטרואידים** הכלולים
 - בטמטזון, בוזזונייד, פלאוטיקזון, מומטזון, פרדנייזון, טריאמquineולון.

תרופות אלו משמשות לטיפול באלהGIT, אסתמה, מחלות מעי דלקתיות, דלקות עור, עיניים, מפרקים, שרירים ודלקות אחרות. תרופות אלה ניתנות בדרך כלל במתן פומי, בשאיפה, בהזרקה או במריחה על העור או העין. אם לא ניתן ליטול חלופה, השימוש יהיה רק לאחר בחינה רפואיות ומעקב קפדי של רופאך לתופעות לוואי של קורטיקוסטרואידים.

תרופות המשמשות לטיפול בסוכרת:

- מטפורמין
- גלולות למניעת הירין, המשמשות למניעת הירין
- **תרופות לטיפול בכשל זקפה**, המשמשות לטיפול באין-אונות, כמו:
 - סיילאנפיל, טדילפיל וורדאנפיל

- **תרופות לטיפול בלב**, כמו:
 - דיגוקסין, דיזופיראמיד, פלקאיניד, לידוקאין (בهزקה), מקסילטין, פרופפנון, מטופרול, טימולול, אמלודיפין, דיליטازם, פלוידיפין, ניקרדיפין, ניפדייפין וורפמייל
- **תרופות המשמשות לטיפול בגין חץ דם ריאתי עורקי:**
 - בוסנטן וטדלפיל
 - נוגדי קריישה, המשמשים למניעה וטיפול בקרישי דם, כמו:
 - אפיקסבן, אדוקסבן, ריברוקסבן וואפרין
- **מרחיבי סימפונות**, משמשים לטיפול באסתמה ובעוות אחרות הקשורות לראיות:
 - סלמטרול
- **תרופות להפחחת רמת הcolesterol**, כמו:
 - אטורהסטטין ופייטבטטין
- **תרופות המשמשות לטיפול בשיגdon:**
 - קולכיצין
 - נוגדי צימות טסיות, המשמשים להפחחת הסיכון לקרישי דם, כגון:
 - קלופידיוגרל
- **תרופות או תוספי מזון הcalcium מינרלים** (כגון מגנזיום, אלומיניום, סיידן, ברזל, אבץ) כגון:
 - תוספי מינרלים, ויטמינים (כולל מולטי-ויטמינים), סוטרי חומצה ומשלשלים.
- ← אם אתה נוטל תרופות, **תוספי מזון, סוטרי חומצה או משלשלים הcalcium מינרלים** (כגון מגנזיום, אלומיניום, סיידן, ברזל, אבץ), יש ליטול אותם לפחות 4 שעות לפני או 4 שעות אחר נטילת ג'נדרה.

← ספר לרופא אם אתה נוטל אותן או תרופות אחרות כלשהן. אל תפיסק את הטיפול בלי להיוועץ קודם ברופא.

שימוש בתרופה ומזון
יש ליטול עם מזון.

הירין והנקה

אם הירך בהירין או מניקה, חשוב שיתכן שאתה בהירין, או מתכנת להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה זו.

- **ספר לרופא שלך מיד אם הירך בהירין, חשוב שיתכן שאתה בהירין, או מתכנת להרות.** אין ליטול ג'נדרה במהלך תקופת ההירין. כמות התרופה בגוף עלולה לדגד במהלך ההירין מה שעולם למניע מהנה לעבוד באופן תקין.
- **השתמש באמצעי מניעהיעיל בעת נטילת ג'נדרה.**
- **אין להניך במהלך טיפול בג'נדרה.** הסיבה לכך היא שחלק מהחומרים הפעילים בתרופה זו עוברים לחלב האם. הנקה אינה מומלצת בנשים החיות עם נגיף-ה-HIV כיון שזיהום ה-HIV עלול לעבור לתינוק דרך חלב האם. אם הירך מניקה או שוקלת הנקה, עליך להיוועץ ברופא שלך בהקדם האפשרי.

גהיגה ושימוש במכונות

ג'נדרה עלולה לגרום סחרחוות. אם אתה חש סחרחוות בעת נטילת ג'נדרה, אין לנוהג או לרכיב על אופניים ואין להפעיל כלים חמליים או מכונות חמליות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ג'נדרה מכילה נתרן.
תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטבליה, כך שניתן לומר שהיא "נטולת נתרן".

ג'נדרה מכילה לקטוז

אם נאמר לך על ידי הרופא שלך שיש לך אי-סיבות לסוכרים כלשהם, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תרופה זו.

← אם אחד הדברים הללו חל עליו, **ספר לרופא שלך לפני נטילת ג'נדרה.**

3. כיצד תשתמש בג'נדבירה?

יש להשתמש תמיד בהתאם להוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקבול:

מבוגרים וילדים בני 6 שנים ומעלה, השוקלים 25 ק"ג לפחות: טבליה אחת ביום עם האוכל
אין לעבור על המנה המומלצת.

עלקב טעמה המר, מומלץ שלא ללוועס או לכתוש את הטבליה.

אם יש לך קושי בבליעת טבליה שלמה, ניתן לחצוץ אותה לשניים. טול את שני החצאים אחד אחרי השני על מנת לקבל את המינון המלא. אל תאחסן את הטבליה החצאה.

תמיד תיטול את המנה כפי שהומלצת על ידי הרופא בלבד. זאת כדי לוודא שתרופהיעילות מרבית וכדי למנוע את הסיכון לפתח עמידות לטיפול. אל תנסה את המינון ללא הוראות מהרופא.

אל תיטול נוגדי חומצה או מולטי-ויטמינים באותו זמן עם ג'נדבירה. אם אתה נוטל תרופות, **תוספי מזון, סוטרי חומצה או משלשלים הכוללים מינרלים** (כגון מגנזיום, אלומיניום, סידן, ברזל, אבץ), טול אותם לפחות 4 שעות לפני או לאחר ג'נדבירה.

אם הנך עבר טיפול דיאליזה, קח את המנה היומית של ג'נדבירה לאחר השלמת הטיפול.

אם נטلت מנת ג'נדבירה גדולה מהדרש

אם נטلت בטעות יותר מהמנה המומלצת של ג'נדבירה יתכן ותהיה בסיכון מוגבר לחותות תופעת לוואי של התרופה (ראה סעיף 4, **תופעות לוואי**).

פנה מיד לרופא או לחדר מיין של בית החולים הקרוב והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול ג'נדבירה

חשוב לא להחמיר מנה של ג'נדבירה.

אם החמצת מנה:

- **אם הבחןת בכר בפחות 18 שעות** מהשעה שבה אתה בדרך כלל נוטל ג'נדבירה, יש ליטול את הטבליה בהקדם האפשרי. יש לקחת תמיד את הטבליה עם מזון. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.
- **אם הבחןת בכר 18 שעות או יותר** לאחר השעה בה אתה בדרך כלל נוטל ג'נדבירה, אל תיטול את המנה שהחמצצת. המtanן וקח את המנה הבאה, עם מזון, בשעה הרגילה.

אם הקאת פחות משעה אחת אחרי נטילת ג'נדבירה, טול טבליה נוספת עם מזון.

אל תפסיק ליטול ג'נדבירה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה **לא התיעשות עם הרופא.** אם תפסיק ליטול ג'נדבירה, תגובתך לטיפול בעתיד עלולה להיפגע באופן ממשועוט. אם אתה מפסיק את נטילת ג'נדבירה מסיבה כלשהי, היועץ ברופא לפני שתתחל ליטול שוב טבליות ג'נדבירה.

כאשר **כמות הג'נדבירה שלך מתחילה להיגמר,** גש לרופא כדי לקבל עוד. זה חשוב ביותר מכיוון שכמויות הווירוס יכולה לעלות גם אם מפסיקים ליטול את התרופה לזמן קצר. יתכן והמחלה תהיה קשה יותר לטיפול.

אם אתה נשא הן של HIV והן של דלקת כבד מסוג B, חשוב במינוח לא להפסיק את הטיפול בגין דברה בלבד להיוועץ קודם ברופא. אחריו הפסיקת הטיפול יתכן שהיא צריכה לבצע בדיקות דם ממשר מספר חדשניים. בטופולים אחדים עם מחלת כבד מתקדמת או שחמת כבד לא מומלץ להפסיק את הטיפול מכיוון שהדבר עלול לגרום להחמרה דלקת הכבד, העוללה להיות מסכנת חיים.

← ספר מיד לרופא על תסמינים חדשים ולא רגילים שהופיעו אחרי שהפסיקת את הטיפול, במיוחד תסמינים שאתה מקשר לזמן הנוכחי בדלקת כבד נגיפית מסוג B.

אין ליטול תרופות בחושר!
בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהן נוטל תרופה.
הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בגין דברה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהם.

יש לפנות מיד לרופא במקרים הבאים:

- **כל סימן לדלקת או לזמן.** בחלק מהמטופלים עם זמן מתקדם ב-HIV (אידס AIDS) ובערך של זמן רפואי (זמן המופיעים באנשים עם מערכת חיסון חלשה), סימנים ותסמינים של דלקת מזיהומיים קודמים עלולים להופיע מיד אחרי תחילת טיפול נגד-HIV. הסברת היא שסימנים אלה נגרמים בשל שיפור בתגובה החיסונית של הגוף, המאפשר לגוף להילחם בזיהומיים שאינם תסמינים ברורים.
- **מחלות אוטואימוניות,** מצב שבו מערכת החיסון תוקפת רקמות בריאות בגוף, עשוי להופיע גם לאחר התחלת נתילה של טיפול בזמן HIV. מחלות אוטואימוניות עלולות להתרפתח מחדש: רבים לאחר תחילת הטיפול. שים לב לכל תסמיני זמן או לתסמינים אחרים כמו:
 - חולשת שרירים
 - חולשה המתחלת בכפות הידיים והרגליים ומתרפעת מעלה לכיוון מרכז הגוף
 - דפוקות לב, רעד או פעלויות-יתר (היפראקטיביות).

← אם תבחן באחת מתופעות הלואוי שתוארו לעיל, ספר מיד לרופא.

תופעות לוואי שכיחות מאוד
(יכולות להשפיע על יותר מאדם אחד מתוך 10)
• **בחילה**

תופעות לוואי שכיחות
(יכולות להשפיע על עד אדם אחד מתוך 10)

•	חולנות חריגים
•	כאבי ראש
•	סחרחות
•	שלשלולים
•	הקאות
•	כאב בטן
•	газים
•	פריחה
•	עייפות (תשישות)

תופעות לוואי לא שכיחות

(יכולה להשפיע על עד אדם אחד מתוך 100)

• ספירה נמוכה של תא דם אדומיים (אנמיה)

• מוחשנות אובדן וניסיונות אובדן (במטופלים שחוו דיcano או בעיות בריאות נפשית קודם לכן).

• דיcano

• בעיות בעיכול הגורמות לאי נוחות אחרי אrhoות (יספסוףה)

• נפיחות של הפנים, השפטים, הלשון או הגרון (אנגיגיאדמה)

• גרד (גירוד)

• סרפתת (אורטיקרייה)

← אם תופעת לוואי כלשהי חמלה, ספר מיד לרופא.

תופעות אחרות שניתן לראות במהלך טיפול ב-VIH

התדריות של תופעות הלואוי הבאות אינה ידועה (לא ניתן להעריך את התדריות מתוך הנתונים הזמינים).

• בעיות בעצמות. אצל חלק מהמטופלים הנוטלים תרופות נוגדות נגיפי רטרו משולבות, כמו ג'נדברה, עלולה להתפתח מחלת עצם הנקראט נמק עצם (איסטאנקרוזיס), מותת של רקמת עצם הנגרם מאובדן אספקת דם לעצם). נטיילת תרופות מסווג זה במשך זמן רב, נטיילת קורטיקוסטרואידים, שתית אלכוהול, מערכת חיסון חלה מאוד ועודף משקל עשויים להיות חלק מגורמי הסיכון הרבים להתפתחות מחלת זו.

סימני נמק העצם כוללים:

- נזקשות מפרקים

- כאבים ומוחשים במפרקים (במיוחד בירך, בברך ובכתף)

- קשי תנועה

← אם תבחן באחד מהטנסינים הללו ספר לרופא.

בעת טיפול ב-VIH, יתכן שתיהה עלייה במשקל וברמות הליפידים והגלוקוז בדם. דבר זה קשור בחלקו לשיפור בריאות ולסגןן חיים, ובמקרה של ליפידים בדם, לעיתים לתרופות ה-VIH עצמן. הרופא שלך יבצע בדיקות לגלילי שימושים אלה.

← אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמלה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>.

ניתן בנוספף לדוח על כל תופעת לוואי לבעל הרישום באמצעות דוא"ל: DrugSafety.Israel@gilead.com.
תוכל לעזור לספק מידע נוסף על בטיחות התרופה באמצעות דיווח על תופעות לוואי.

5. איך לאחסן ג'נדברה

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לטוויה ראייתם ולהישג ידם של ילדים
/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה זו אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על הקרטון והבקבוק. תאריך התפוגה
מתיחס ליום האחרון של אותו חדש.

אין תנאי אחסון מיוחדים. מומלץ לשמור בטמפרטורת החדר.
אחסן את התרופות באריזה המקורית כדי להגן עליהם מפני לחות. שומר את הבקבוק סגור היטב.

אל תשליך תרופות לביב או לאשפה. יש להיוועץ ברוקח כיצד להשליך תרופות שאין משתמש בהן עוד.
אםצעים אלה יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה ג'נדבירה מכילה

בנוסף לרכיבים הפעילים, ג'נדבירה מכילה:

ליבת הטבילה.

Microcrystalline cellulose (E460), silicon dioxide (E551), croscarmellose sodium, lactose (as monohydrate), magnesium stearate, sodium lauryl sulfate, hydroxypropyl cellulose (E463),

ציפורן.

Polyvinyl alcohol (E1203), titanium dioxide (E171), polyethylene glycol (E1521), talc (E553b), indigo carmine aluminium lake (E132), iron oxide yellow (E172).

יכאך נראה ג'נדבירה ומה תוכן האזינה

טבליות מצופות של ג'נדבירה הן טבליות י Rogues בצורת כמוסה, שבצד אחד מוטבע עלייהן "GSI" ובצד השני של הטבילה מוטבע המספר "510". ג'נדבירה מגיעה בבקבוקים המכילים 30 טבליות (עם ג'ל סיליקון סופח לחות שחייב להישאר בתוך הבקבוק כדי להגן על הטבליות). ג'ל הסיליקון סופח הלוחות נתון בשקיק או במקל נפרד ואסור לבלווע אותו.

התכשיר מגיע בקרטון חיצוני המכיל בקבוק אחד ובו 30 טבליות מצופות.

היצן

Gilead Sciences Ireland UC
IDA Business & Technology Park
Carrigtohill, County Cork
Ireland

בעל רישיון

ג'לייד סיננסז ישראל בע"מ
רחוב החרש 4
הוד השרון
4524075
ישראל

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 34742

לשם הפשטות ולהקלת הקRIAה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בדצמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

עלון אסמכתא: EU SmPC from October 2022

IL-DEC22-EU-OCT22