

## فيكسي 180

أقرص مطلية

المادة الفعالة وكميتها:

كل قرص يحتوي:

فيكسوفينادين هيدروكلوريد (fexofenadine hydrochloride) 180 ملغ

المواد غير الفعالة: انظر الفقرة 6.

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

- احفظ هذه النشرة، من الجائز أن تحتاج لقراءتها ثانية.
- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- عليك تناول المستحضر وفق التعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت تحتاج إلى معلومات إضافية. توجه إلى الطبيب إذا تعاقمت أعراض (علامات) المرض أو إذا لم تتحسن بعد مرور بضعة أيام.

### 1. لأي عرض مخصص الدواء؟

يستخدم الدواء لتسكين حالات الطغ الجلدي المتواصل المصحوب بحكة.

الفصيلة العلاجية: مضادات الهيستامين.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

كانت لديك حساسية (أرجية) لفكسوفينادين أو لأحد المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بفيكسي 180 عليك استشارة الطبيب إذا:

- كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى أو الكبد.
- كنت تعاني أو إذا عانيت في الماضي من مرض في القلب، لأن دواء من هذا النوع يمكن أن يسبب نظم سريع أو غير منتظم للقلب.
- كنت مسنًا.

إذا كانت إحدى هذه الحالات تنطبق عليك أو إذا لم تكن متأكدًا، فأخبر الطبيب قبل أن تتناول فيكسي 180.

### الأطفال والمراهقون

هذا الدواء غير مخصص لأطفال دون سن 12 سنة.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأصاف غذائية، احكي للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي بالاضاف إذا كنت تتناول أدوية لمشاكل الهضم الحولية ألومنيوم أو مغنيزيوم التي من شأنها أن تقلل كمية فيكسي 180 الممتصة وتؤثر في عمل فيكسي 180. يوصى بتناول هذه الأدوية ساعتين قبل أو بعد تناول فيكسي 180.

استخدام الدواء والطعام

يجب بلع الدواء مع الماء قبل الأكل.

### الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة، تطنين أنك حامل أو تخططين للحمل، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال الدواء.

لا يجوز تناول فيكسي 180 في فترة الحمل دون توصية من الطبيب.

لا يوصى باستعمال فيكسي 180 أثناء الرضاعة.

### السياسة واستعمال الماكينات

من غير المتوقع أن يؤثر فيكسي 180 على قدرتك على القيادة أو تشغيل ماكينات، لكن عليك التأكد قبل القيادة أو تشغيل ماكينات بأن الأقرص لا تسبب لك النعاس أو الدوار.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك الاستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

للحديث والأطفال فوق عمر 12 سنة الجرعة الدوائية الموصى بها غالبًا هي:

قرص واحد (180 ملغ) مرة في اليوم.

يجب بلع الدواء مع الماء قبل الأكل.

لا يوجد خطر في القرص. لا تخط شطر في القرص. لا يوجد خطر في سحق/طحن القرص.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر من فيكسي 180 تزيد عن المطلوب

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفل بالخطأ من هذا الدواء، عليك التوجه حالاً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحبًا عبوة الدواء. أعراض فرط الجرعة لدى الكبار هي: دوار، نعاس، إرهاق وجفاف الفم.

### إذا نسيت تناول فيكسي 180

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الزمن المطلوب، فلا يجوز تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الزمن المعتاد حسب تعليمات الطبيب.

### إذا توقفت عن تناول فيكسي 180

إذا كنت ترغب في التوقف عن تناول فيكسي 180 قبل انتهاء العلاج الموصى به من قبل الطبيب، احكي للطبيب عن ذلك.

إذا توقفت عن تناول فيكسي 180 قبل الأوان فمن شأن الأعراض أن تعود.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! افحص ملصقة الدواء والجرعة في كل مرة تتناول فيها الدواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا توفرت لديك أسئلة أخرى حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال فيكسي 180 قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أباً منها.

راجع الطبيب حالاً وتوقف عن تناول فيكسي 180 إذا كنت تعاني من انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة ومن صعوبات في التنفس، لأن من شأن ذلك أن يدل على أنك تعاني من رد فعل تحسسي شديد.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية في التجارب السريرية مع فكسوفينادين، وكان مستوى شيوها شبيها بالمستوى الذي شوهد لدى مريض لم يتلق الدواء (دواء وهمي):

أعراض جانبية شائعة (تحدث لدى 1-10 مستعملين من بين 100): صداع، نعاس، غثيان ودوار.

أعراض جانبية غير شائعة (تحدث لدى مستعمل 1 من بين 100): إرهاق/الميل للنوم.

أعراض جانبية أخرى (ذات شيوح غير معروف) يمكن أن تحدث: أرق، اضطرابات في النوم، أحلام سيئة، عصبية، نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة، إسهال، طفح جلدي وحكة، شرى، ردود فعل تحسسية شديدة من شأنها أن تسبب انتفاخ في الوجه، الشفتين، اللسان أو الحنجرة، تورد الوجه، ضغط في الصدر وصعوبة التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تعاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ وزارة الصحة عن الأعراض الجانبية من خلال الضغط على رابط "تبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.au](http://www.health.gov.au))، الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو من خلال النحول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

كما يمكن التبليغ عن الأعراض الجانبية على البريد الإلكتروني: [safety@trima.co.il](mailto:safety@trima.co.il).

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي وعن مجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين في مكان جاف بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.
- لا تتخلص من أي دواء في مياه الصرف الصحي أو في النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي كيف عليك التخلص من الأدوية التي لم تعد قيد الاستعمال. تساعد هذه التدابير في حماية البيئة.

## 6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, opadry OY 8704 orange (hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C yellow #6/sunset yellow fcf aluminum lake, D&C yellow #10 aluminum lake).

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

قرص مطلي، مُطوّل، مُحدب من الجهتين ولونه برتقالي باهت.

تحتوي كل عبوة على 15 أو 30 قرصاً معبأً في لويحات (بليسترات).

هذه النشرة لا تشمل كافة المعلومات المتعلقة بالمستحضر. إذا خطر في بالك أي سؤال أو في حال عدم تأكّدك من شيء ما، الرجاء مراجعة الطبيب.

**المُنْتَج وصاحب التسجيل:** تريما للمنتجات الطبية الإسرائيلية معبروت م.ض.، معبروت 4023000، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في تموز 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 170-13-37246-99  
من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.



# تريما

معبروت 4023000  
منتجات طبية إسرائيلية  
معبروت م.ض.

0722A