

פקסי 180

טבליות מצופות

חומר פעיל וכמותו:

כל טבליה מכילה:

פקסופנאדין הידרוכלוריד (fexofenadine hydrochloride) 180 מ"ג

מרכיבים לא פעילים: ראה סעיף 6.

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- שמור על עלון זה, ייתכן שתצטרך לקרוא בו שוב.
- עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
- עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברקוח אם אתה זקוק למידע נוסף. פנה לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר מספר ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה משמשת להקלה במקרים של תפירת מתמשכת המלווה בגרד.

קבוצה תרופוטית: אנטיהיסטמיני.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש (אלרגי) לפקסופנאדין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפקסי 180 לתייעץ עם הרופא אם:

- אתה סובל מליקוי בתפקוד הכליה או הכבד.
- אתה סובל או סבלת בעבר ממחלת לב, כיוון שתרופה מסוג זה יכולה לגרום לקצב לב מהיר או לא סדיר.
- אתה קשיש.

אם אחד מהמצבים הללו רלוונטי אליך או אם אינך בטוח, ספר לרופא לפני שאתה נוטל פקסי 180.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 12.

אינטראקציות/תגובות בין-תרופוטיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות לא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח תרופות לבעיות עיכול שמכילות אלומיניום או מגנזיום שעשויות להקטין את כמות הפקסי 180 שנספגת ולהשפיע על פעילות פקסי 180. מומלץ ליטול תרופות אלו שעתים לפני או אחרי נטילת פקסי 180.

שימוש בתרופה ומדון

יש לבלוע את התרופה עם מים ולפני האוכל.

הריון והנקה

אם את בהריון או מיניקה, חושבת שאת בהריון או מתכננת הריון, יש היועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

אין לקחת פקסי 180 בהריון ללא הנחיית רופא.

פקסי 180 אינו מומלץ בזמן הנקה.

נהיגה ושימוש במכונית

לא סביר שפקסי 180 ישפיע על יכולתך לנהוג או להפעיל מכונית, אולם, עליך לוודא לפני שאתה נוהג או מפעיל מכונית שהטבליות לא גורמות לך לישנוניות או לסחרחורת.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

למבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טבליה אחת (180 מ"ג) פעם ביום.

יש לבלוע את התרופה עם מים לפני האוכל.

אין קו חציה בטבליה. אין מידע לגבי ריסוק/כתישה של הטבליה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר של פקסי 180 ממה שהיית צריך

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמינים של מנת יתר במבוגרים הם: סחרחורת, ישנוניות, עייפות ויובש בפה.

אם שכחת ליטול פקסי 180

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם הפסקת לקחת פקסי 180

אם אתה רוצה להפסיק לקחת פקסי 180 לפני סיום הטיפול שהומלץ על ידי הרופא, ספר זאת לרופא.

אם תפסיק לקחת פקסי 180 מוקדם מהמתוכנן הסימפטומים עלולים לחזור.

אין ליטול תרופות בחושה! בדוק תגויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברקוח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפקסי 180 עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

פנה לרופא מיד והפסק לקחת פקסי 180 אם אתה סובל מנפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון ומקשיים בנשימה, מכיוון שאלו עשויים להעיד שאתה סובל מתגובה אלרגית חמורה.

תופעות הלוואי הבאות דווחו בניסויים קליניים עם פקסופנאדין, בשכיחות דומה לאלו שנצפו בחולה שלא קיבל את התרופה (פלצבו):

תופעות לוואי שכיחות (מתרחשות ב-10-1 משתמשים מתוך 100): כאב ראש, נמנום, בחילה וסחרחורת.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מתרחשות במשתמש אחד מתוך 100): עייפות/ישנוניות.

תופעות לוואי נוספות (שכיחות לא ידועה) שיכולות לקרות: נדודי שינה, הפרעות שינה, חלומות רעים, עצבנות, דפיקות לב מהירות או לא סדירות, שלשול, פריחה בעור וגרד, חרלת, תגובות אלרגיות קשות העלולות לגרום לפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון או בגרון, הסמקה, לחץ בחזה וקשיי נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על



5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לשמור במקום יבש, מתחת ל-25°C.
- אל תזרוק תרופה כלשהי באמצעות שפכים או פסולת ביתית. שאל את הרוקח איך לזרוק את התרופות שאתה כבר לא משתמש בהן. צעדים אלו יסייעו להגן על איכות הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, pregelatinized starch, croscarmellose sodium, magnesium stearate, opadry OY 8704 orange (hydroxypropylmethyl cellulose (HPMC), titanium dioxide, polyethylene glycol, FD&C yellow #6/sunset yellow fcf aluminum lake, D&C yellow #10 aluminum lake).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבליה מצופה, מאורכת, קמורה משני הצדדים, בצבע כתום בהיר.

כל אריזה מכילה 15 או 30 טבליות הארוזות במגשיות (בליסטרים).

עלון זה לא כולל את כל המידע על התכשיר, אם יש לך שאלה כלשהי או אינך בטוח בדבר מה, אנא פנה לרופא.

יצרן ובעל הרישום: תרימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל.

עלון זה נערך ביולי 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

170-13-37246-99

לשם הפטנט ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.



0722A
מעברות 4023000
תוצרי רפואה ישראליים
מעברות בע"מ

