

نشرة طبيَّة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة

(مستحضرات 1986)

يُسوّق هذا الدواء بحسب وصفة طبيب فقط

ديباليب محلول 200 ملغ/مل

صوديوم فالبروات 200 ملغ/1 ملل

انتبه: ديباليب بالمحلول مركّز أكثر بـ 5 أضعاف من ديباليب بالشراب.
قبل إعطاء الدواء يجب التأكد من أن الجرعة الدوائية التي حددها الطبيب هي للمحلول.

المواد غير الفعالة ومثبتات الأرجية في المستحضر - انظر البند 6 والبنء 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء"

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك
للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات لمنسّخة عن الدواء. إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

قد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تخف.

قد يعزّضم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ مرضهم مشابه.

الدواء غير مخصّص لأولاد الذين وزنهم أقل من 17 كم.

تحذير
قد يسبب ديباليب ضرراً شديداً للجنين عند استعماله خلال فترة الحمل
مولد الإجهات الحامل يتناول فالبروات بالدواء وهن في سن الخصوبة.أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل، إذا كانت المرأة التي تستعمل الدواء تحتفظ بالحمل (والتي عليها استشارة الطبيب المعالج بالنسبة لإمكانية الانتقال إلى علاج بديل.

قد يؤدي هذا الدواء في حالات نادرة جدًا إلى الإضرار بالكبد (التهاب الكبد) أو بالبنكرياس (التهاب البنكرياس)، مما قد يكون خطيرًا ويشكّل خطرًا على الحياة.

سيحجب طبيبك إجراء فحوص الدم من أجل تقييم وظائف الكبد، خاصةً في الأشهر الـ 6 الأولى من العلاج.
عليك استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت الأعراض التالية:
• تعب فجائي، انعدام الشهية، إرقاق، غثاس، انتفاخ في الرجلين، ضعف عام.
• تقيّؤات متكررة، غثيان، ألم في البطن، اصفرار الجلد أو بياض العين (يرقان).
• عودة النوبات المتكررة، بالرغم من أنك تتناول الدواء بشكل صحيح.

بالإضافة إلى النشرة الطبيَّة، فإنّه يوجد للمستحضر ديباليب بطاقة معلومات وقتيَّة وملقاة العلاج.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقتيَّة هامة، يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج بيديباليب.وعلاجه عليك اتّباعها. يجب معالجة بطاقة المعلومات ملقاةً للعلاج ونشره المستهلك الطبيَّة قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعالجة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. أي عرض مخصّص هذا الدواء؟
الدواء مضاد للاختلاجات، ويعطى لعلاج أنواع معينة من مرض الصرع (البيبلويدس).
الفصلية العلاجية: تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة المواد المضادة للاختلاجات.

2. قبل استعمال الدواء:

ⓧ لا يجوز استعمال الدواء إذا كنت:

- حساسًا (لديك أرجية) للمادة الفعالة أو لأحد مركبات الدواء (انظر البند 6 – معلومات إضافية).
- حساسًا لدواء آخر من فصيلة فالبروات (فالبروات صوديوم، فالبروميون).
- تعاني من مرض في الكبد (التهاب الكبد الحاد أو المزمن).
- أو أن أحد أفراد عائلتك عانى في الماضي وبالعالي الآن من مرض خطير في الكبد، خاصة إذا نجح من استعمال الأدوية.

تعاني من البرفيرية الكبدية (مرض وراثي في الكبد).
تعاني من أمراض متعلّ: أقوال أو أفكار عن إيذاء النفس، أو أفكار عن إيذاء غير الآخرين.

اقرأ النشرة بعناية حتى نهايتها قبل استعمالك
للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات لمنسّخة عن الدواء. إذا توقّرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

قد وُصف هذا الدواء من أجلك. لا تخف.

قد يعزّضم الدواء حتّى لو بدا لك أنّ مرضهم مشابه.

الدواء غير مخصّص لأولاد الذين وزنهم أقل من 17 كم.

تحذيرات خاصة تتعلّق باستعمال الدواء

• لا يجوز إعطاء الدواء للنساء، الفتيات، النساء في سن الخصوبة والنساء الحوامل، إلا إذا تبين أن العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يتوجب على النساء اللواتي يتلقين العلاج بالدواء وهن في سن الخصوبة.أن يستعملن وسائل فعالة لمنع الحمل، إذا كانت المرأة التي تستعمل الدواء تحتفظ للحمل، فإن عليها استشارة الطبيب المعالج بالنسبة لإمكانية الانتقال إلى علاج بديل.

قد يؤدي هذا الدواء في حالات نادرة جدًا إلى الإضرار بالكبد (التهاب الكبد) أو بالبنكرياس (التهاب البنكرياس)، مما قد يكون خطيرًا ويشكّل خطرًا على الحياة.
سيحجب طبيبك إجراء فحوص الدم من أجل تقييم وظائف الكبد، خاصةً في الأشهر الـ 6 الأولى من العلاج.
عليك استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت الأعراض التالية:
• تعب فجائي، انعدام الشهية، إرقاق، غثاس، انتفاخ في الرجلين، ضعف عام.
• تقيّؤات متكررة، غثيان، ألم في البطن، اصفرار الجلد أو بياض العين (يرقان).
• عودة النوبات المتكررة، بالرغم من أنك تتناول الدواء بشكل صحيح.

بالإضافة إلى النشرة الطبيَّة، فإنّه يوجد للمستحضر ديباليب بطاقة معلومات وقتيَّة وملقاة العلاج.

تحتوي هذه البطاقة على معلومات وقتيَّة هامة، يتوجب عليك معرفتها، قبل البدء بالعلاج بيديباليب.وعلاجه عليك اتّباعها. يجب معالجة بطاقة المعلومات ملقاةً للعلاج ونشره المستهلك الطبيَّة قبل البدء باستعمال المستحضر. يجب الاحتفاظ بالبطاقة لمعالجة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

1. أي عرض مخصّص هذا الدواء؟
الدواء مضاد للاختلاجات، ويعطى لعلاج أنواع معينة من مرض الصرع (البيبلويدس).
الفصلية العلاجية: تنتمي المادة الفعالة إلى فصيلة المواد المضادة للاختلاجات.

• كما هو الحال مع الأدوية الأخرى المضادة للصرع، فإن استعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى تفاقم النوبات أو إلى زيادة في شوعها.

• حدثت بعد العلاج، فيجب استشارة الطبيب بشكل فوري.
• قد يسبب هذا الدواء ارتفاعًا في الوزن. استشر طبيبك بالنسبة لوسائل المحافظة على وزن الجسم السليم.
• قد يؤدي استعمال الأدوية المضادة للتشنجات إلى زياد خطر حدوث أفكار أو أفكار انتحارية. عليك وعلى أفراد عائلتك الانتباه خاصة إذا نجح من استعمال الأدوية.

وفي الأفعال، يجب متابعة العلامات التي تدل على خطر الانتحار متلّ: أقوال أو أفكار عن إيذاء النفس، أو أفكار عن إيذاء غير الآخرين.

تبيّة الإضرار بنفسك، انطواء وتباعد عن العائلة والأصدقاء، اكتئاب أو تفاقم الاكتئاب، القاتم، اشتغال في موضوع الموت، التخلّي عن أملاك قيمة أو تسليمها. إذا ظهرت أفكار من هذا النوع، فيجب التوجّه فورًا إلى الطبيب.

• إذا كنت تعاني من نقص في الزيماتase carmitine palmitoiltransferase (CPT) type II (مرض استقلابي وراثي)، فهناك خطر متزايد لانحلال العضل عند استعمال ديباليب.
• أخير الطبيب إذا كنت تشعر بأعراض مثل: الارتجاف، تصلّب الأطراف والصعوبات في المشي (اضطرابات خارج السبيل الهرمي) أو اضطرابات في الذاكرة أو في الوظيفة العقلية.
• سيخضع الطبيب ما إذا نجحت من مرض قائم أو من ديباليب. قد تكون هناك حاجة لإيقاف العلاج.

• عند علاج الأولاد، أخير الطبيب إذا كان ينك يستعمل علاجًا إضافيًا ضد الصرع أو إذا كان يعاني من مرض عضبي أو استقلابي أو من أشكال شديدة من الصرع.

• الفحوص والمتابع:
قبل البدء بالعلاج وفي الأشهر السمة الأولى من العلاج يجب إجراء فحوص للدم وظائف الكبد.

• التفاعلات بين الأدوية
ستؤثر أدوية معينة على فعالية فالبروات، والعكس صحيح.

• لا يجوز استعمال ديباليب، إذا كنت تستعمل الأدوية التالية:
St. John's wort - عشبة طيبة لعلاج الاكتئاب.

• لا يجوز استعمال ديباليب إذا كنت تستعمل الأن، استعمل موززا أو قد تستعمل الأدوية التالية، إلا إذا أرتأكد الطبيب إلى غير ذلك:
• لاموترجين (للعلاج آخر لمرض الصرع).
• أدوية من فصيلة البنينمات (الكارباميتس) (فصيلة من المضادات الحيوية لعلاج التوتّات الجرثوميّة).

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت موزّزا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبي و**إضافات غذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.** خاصة إذا كنت تستعمل:
• أدوية تحتوي على أستيازولاميد (لخضف أقوال عائلتك.

الضغط داخل العين أو مستويات ثاني أكسيد الكربون في الدم).
• مضادات حيوية (أدوية تحتوي على آزتريونام أو ريفامبيسين).

• قبل البدء بالعلاج، ستأكد الطبيب من أنك تست حملًا ومن أنك تستعملين وسيلة لمنع الحمل.

• فوسفينوتوين، بريميون، فينوباريتال، روفيماید، توپيرامات أو زونيساميد).
• نيوميديين - يُستعمل لمنع المضاعفات التي قد تحدث بعد الزيف الدموي المعاعي. قد يزيد ديباليب من تأثير نيوميديين.

• أدوية تحتوي على الإستروجين (بما في ذلك أنواع معينة من حبوب منع الحمل).

• بروبيول (دواء للتخدير).
• أدوية تحتوي على زيدوفيردين (علاج HIV).
• أدوية تحتوي على الليثيوم (لموازنة المزاج).
• أدوية تحتوي على ميثامزيرول/ديبيرون (علاج الحمى والألام).
• سياليسلات (بما في ذلك الأسبيرين).
• كانيديبول (علاج الصرع وحالات مرّضية إضافية).

بالأخص لدى الأولاد دون سن الـ 3، يجب الانتباه عن استعمال الأدوية التي تحتوي على سالييسلات (بما في ذلك الأسبيرين) خلال فترة العلاج بالدواء.

• استعمال الدواء والطعام
يُقتل تناول الدواء في وقت تناول وجبات الطعام.

• استعمال الدواء واستهلاك الكحول
لا يوصي بنرب المشروبات الكحولية في فترة العلاج بالدواء.

• استعمال الدواء والخصوبة
إنّ فالبروات ضارّ للجنين إذا استُعمل خلال فترة الحمل.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• اقربي بطاقة المعلومات الوقتية لمتلقية العلاج.

• لا يجوز تناول ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب على الوالدين أو مقامي الرعاية للبنات اللواتي يتلقين العلاج بفالبروات أن يُعلموا الطبيب عند ظهور الجوض الأول لدى انتهم.

• قد تقلل أنواع معينة من حبوب منع الحمل (حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين) مستويات فالبروات في الدم.

• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لوسيلة منع الحمل الأمثل لك.

مخاطر فالبروات عند استعماله خلال فترة الحمل:
• قد يعرض فالبروات الجنين عند استعماله أثناء الحمل، زيادة الخطر مع ارتفاع الجرعة الدوائية، لكنه قد يمانع من الحمل.

أخري لعلاج الصرع.
• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لمعالجة الحمل.
• أن توقفي وسيلة منع الحمل.
• استشرى الطبيب على الفور إذا كنت حاملًا أو تعتقدن أنك قد تكونين حاملًا.
• مواصلة استعمال ديباليب عندما لا تخطفين للحمل.
• تطوري في العمود الفقري حيث لا يتخلو بشكل سليم)، تنوهات في الوجه، في الشفة العليا، في الحنك وفي الجمجمة، عيوب في القلب، في الكليتين، في المسالك البولية وفي الأعضاء التناسلية؛ عيوب في الأطراف وضلع عيوب كثيرة أخرى تؤثر على

نقاط هامة:

• يجب على الطبيب المعالج أن يفحص بشكل متبليغ عن اضطرابات السمع وعن تضرر السمع لدى الأولاد الذين تعرّضوا لفالبروات في الرحم.

• تم التّبعين عن تنوهات في العينين يمكن أن تؤثر على البصر لدى الأولاد الذين تعرّضوا لفالبروات في الرحم.

• استعمال فالبروات خلال فترة الحمل يزيد من خطر الجناب ولد مصاب بعيوب خلقية يتطلب علاجًا طبيًا. وجد أنه لدى النساء اللواتي يستعملن فالبروات بما يقارب 11 طفلاً، مصابًا بعيوب خلقية من بين 100 طفل، وهذا بالمقارنة مع 3-2 أطفال من بين 100 علاج بقية السكان.

• بما يقارب 30%-40% من الأولاد في سن ما قبل المدرسة الذين تناولوا أمهاتهم فالبروات خلال فترة الحمل، قد يعانون من مشاكل تنورية في مرحلة الطفولة المبكرة، مثل: تأخر في البدء بالتعلّم والنطق، فترة عقلية أقل، صعوبات في اللمّة وفي الذاكرة.

• تُشخّص اضطرابات من المجال التوحدي بشيوع أكبر لدى الأولاد الذين تعرّضوا لفالبروات في الرحم.

• تتوفّر أدلة معينة بموجها يكون الأولاد الذين تعرّضوا لفالبروات في الرحم أكثر عرضة لنظر تطويز أعراض اضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط (ADHD).

• قبل إعطاء الدواء، سيشرح لك الطبيب المخاطر المحتملة على طفلك الرضيع في حالة التعرض لفالبروات خلال فترة الحمل.

• إذا قررت لاحقًا أنك ترغبين بالحمل، فلا يجوز التوقف عن تناول الدواء أو عن إيقاف العلاج.

• لا يجوز تناول ديباليب:
• لا يجوز تناول حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب على الوالدين أو مقامي الرعاية للبنات اللواتي يتلقين العلاج بفالبروات أن يُعلموا الطبيب عند ظهور الجوض الأول لدى انتهم.

• قد تقلل أنواع معينة من حبوب منع الحمل (حبوب منع الحمل التي تحتوي على الإستروجين) مستويات فالبروات في الدم.

• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لوسيلة لمنع الحمل الأمثل لك.

• لا يجوز تناول ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لمعالجة الحمل.
• أن توقفي وسيلة منع الحمل.
• استشرى الطبيب على الفور إذا كنت حاملًا أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا.
• مواصلة استعمال ديباليب عندما لا تخطفين للحمل.

• تطوري في العمود الفقري حيث لا يتخلو بشكل سليم)، تنوهات في الوجه، في الشفة العليا، في الحنك وفي الجمجمة، عيوب في القلب، في الكليتين، في المسالك البولية وفي الأعضاء التناسلية؛ عيوب في الأطراف وضلع عيوب كثيرة أخرى تؤثر على

• يستطيع الطبيب أن يبيحك إلى أخصائي يستطيع تقديم المشورة بالنسبة للحمل الخاضع للعلاج بفالبروات.

• يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج السوافة.

• سوف تخضعين للمتابعة عن كتب لإدارة وضعتك الصحي ولفحص تطور الجنين.
• استشرى طبيبك بالنسبة لتناول حمض الفوليك، من شأن تناول حمض الفوليك أن يسهل الحمل.

• باستعمال فالبروات أثناء الحمل، سيخضع طبيبك لاختلاجات.
• يجب إيقاف العلاج إذا كنت تحتفظين للحمل قبل موعدك، مع ذلك، لا يُرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلفية المتعلقة باستعمال فالبروات.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور لكي يتلقى العلاج الذي تمت ملاءمته من أجله، مبكرًا قدر الإمكان، بحسب الحاجة.

نقاط هامة:
• لا تتوقفي عن تناول ديباليب، إلا بأمر من الطبيب.

• يجب إيقاف ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لتناول حمض الفوليك، من شأن تناول حمض الفوليك أن يسهل الحمل.

• باستعمال فالبروات أثناء الحمل، سيخضع طبيبك لاختلاجات.
• يجب إيقاف العلاج إذا كنت تحتفظين للحمل قبل موعدك، مع ذلك، لا يُرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلفية المتعلقة باستعمال فالبروات.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور.

• يجب إيقاف ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

3. كيف تستعمل الدواء؟

• يجب استعمال المستحضر دومًا وفق تعليمات الطبيب.

• عليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج السويّف.

• سوف تخضعين للمتابعة عن كتب لإدارة وضعتك الصحي ولفحص تطور الجنين.
• استشرى طبيبك بالنسبة لتناول حمض الفوليك، من شأن تناول حمض الفوليك أن يسهل الحمل.

• باستعمال فالبروات أثناء الحمل، سيخضع طبيبك لاختلاجات.
• يجب إيقاف العلاج إذا كنت تحتفظين للحمل قبل موعدك، مع ذلك، لا يُرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلفية المتعلقة باستعمال فالبروات.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور لكي يتلقى العلاج الذي تمت ملاءمته من أجله، مبكرًا قدر الإمكان، بحسب الحاجة.

نقاط هامة:
• لا تتوقفي عن تناول ديباليب، إلا بأمر من الطبيب.

• يجب إيقاف ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب استشارة الطبيب بالنسبة لتناول حمض الفوليك، من شأن تناول حمض الفوليك أن يسهل الحمل.

• باستعمال فالبروات أثناء الحمل، سيخضع طبيبك لاختلاجات.
• يجب إيقاف العلاج إذا كنت تحتفظين للحمل قبل موعدك، مع ذلك، لا يُرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلفية المتعلقة باستعمال فالبروات.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور.

• يجب إيقاف ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• ويشكّل خطرًا على الحياة. قد تظهر هذه الأعراض بشكل فجائي مع تعب، فقدان الشهية، إرقاق، ميل إلى النوم، غثيان، تقيؤ وآلم في الأمعاء.

• رد فعل حسسي يشمل:

- الانتفاخ الفجائي للوجه وآو الرقية، مما يسبب صعوبة في التنفس ويشكّل خطرًا على الحياة (وذمة وعائية).
- مثل: الحمى، الطفح البكدي، تضخم الكبد، اللمفاوية، تضخم الكلى، تضسر الكبد، نتائح غير سوية لفحوص الدم، مثل: ارتفاع في نوع من خلايا الدم البيضاء (الليوزينيات).

• ظهور طفح على الجلد، مصحوب أحيانًا بظهور حورصات. قد تشمل منطقة الفم (*Erythema multiforme*).
• ظهور حورصات مع انفصال الجلد الذي قد ينتشر بسرعة على الجسم كله ويشكّل خطرًا على الحياة (Lydell's syndrome).

• يجب إيقاف الجرعة الموصى بها.

• هذا الدواء غير مخصّص لأولاد الذين وزنهم أقل من 17 كم.
• مدة العلاج: لا يجوز إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب.

• يجب إيقاف العلاج إذا كنت تحتفظين للحمل قبل موعدك، مع ذلك، لا يُرجح أن يقلل من خطر الإصابة بالعيوب الخلفية المتعلقة باستعمال فالبروات.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور لكي يتلقى العلاج الذي تمت ملاءمته من أجله، مبكرًا قدر الإمكان، بحسب الحاجة.

• قبل الولادة: سيفحص لك الطبيب قيمياتك معينة لكي لا يسبب هذا الدواء النزيف الدموي خلال الأيام الأولى من حياة طفلك الرضيع، أو التشنجات في العظام.

• بعد الولادة: قد يتلقى طفلك الرضيع حقنة قيمياتهم K لمنع النزيف الدموي.

• لدى الولد: أعمى طبيب الأطفال بأنك لتلقيت العلاج بفالبروات أثناء الحمل، سيخضع الولد للمتابعة العصبية المشددة للتطور.

• يجب إيقاف ديباليب:
• إذا كنت حاملًا، إلا إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، فسيصف لك الطبيب هذا الدواء فقط إذا تبين أنّ العلاجات البديلة غير ملائمة.

• يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي.

• يجب إيقاف الجرعة الموصى بها.

• هذا الدواء غير مخصّص لأولاد الذين وزنهم أقل من 17 كم.

• انخفاض في مستويات قيمياتهم B8 (البوتين) (فيتامين B12).

• ارتفاع مستويات البيريميون في الدم.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.

• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.
• تضرس البقطة الذي قد يتطور إلى غيبوبة مؤقتة، وينحسر بعد تقليل الجرعة الدوائية أو إيقاف العلاج.



LFL 100 12/22