

העלו לזכרון לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) תשל"ו-1986

התרופה משוקקת על פי מרשם רופא בלבד

רפנידאט® אל.איי 10,20,30,40,60 מ"ג כמוסות בשחרור מושהה

כל כמוסה בשחרור מושהה מכילה מתילפנידאט הידרוכלוריד (Methylphenidate hydrochloride) 10, 20, 30, 40 או 60 מ"ג בהתאמה.
חומרים בלתי פעילים וארגלינים בתרופה – ראה טעיף 2 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו ברטם שתשתק בתרופה. עלון זה מכיל מידע נמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מועידת התרופה?

לטיפול בהפרעות קשב וריכוז (ADHD - Attention Deficit) Hyperactivity Disorder.

קבוצה פרטיטית: מעורר מערכת העצבים המרכזית.

כמוסות **רפנידאט אל.איי** מילות את המרכיב הפעיל מתילפנידאט הידרוכלוריד. מתילפנידאט הידרוכלוריד הוא סטימולנט (מעורר) של מערכת העצבים המרכזית.

כמוסות **רפנידאט אל.איי** מילות את המרכיב הפועל מתילפנידאט הידרוכלוריד. מתילפנידאט הידרוכלוריד הוא סטימולנט (מעורר) של מערכת העצבים המרכזית.
כמוסות **רפנידאט אל.איי** משמשות לטיפול בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) או הפרעה היפוקינית) שהיא הפרעת התנהגות בילדים, מתבגרים ומבוגרים. קרוב ל-3% מהילדים סובלים מהפרעה זו, אשר אינה מאפשרת להם לשבת ברוגע או להתרכז במשימות למשך זמן כלשהו. לילדים עם הפרעה זו עלול להיות קושי בלימודים ובתכנת שיעור בית. לעיתים קרובות עשוי להיות קשה להתנהל מולם/ להתמודד איתם בבית הספר ובבית.

מבוגרים עם ADHD מתקשים לעיתים קרובות להתרכז. לעיתים קרובות הם מרגישים חסרי מנוחה, חסרי סבלנות, עם רמת קשב נמוכה והם משתעממים בקלות. הם עשויים להתקשות בארגון השגרים הפרטיים בעבודה.
שיעורים כי מתילפנידאט פועל על ידי יוסות כימיקלים מסוימים במוח המשפיעים על התנהגות. הוא מופעיל למקד את תשומת הלב, לחסום הסחות דעת ומאפשר לאנשים אימפולסיביים לחשוב לפני מעשה. אם הטיפול מצליח, הוא משפר את יכולת הקשב הטבעית של האדם.

תרופה זו היא חלק מתוכנית טיפולית הכוללת בדרך כלל גם טיפול פסיכוגי, חינוכי ותרבותי.

אם פסיכוגי של שאלה על היות הפעולה של **רפנידאט אל.איי** או מדוע תרופה זו נרשמה לך או לילדך, פנה לרופא שלך.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:
אם אתה גרש (אלרגי) לחומר הפעיל (מתילפנידאט) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה טעיף 6).
עליהם להימנע משימוש במוחש הגובה אלרגיתי במשך זמן קצר נשימה, צנפונה או קשי נשימה; נפוחות של הפנים, השפתיים, הלשון או של חלקים אחרים של הגוף; פריחה, גרד או תפרחת עורית (חולת).

אין לטויל רפנידאט אל.איי. אם אתה סובל מהמצבים הרפואיים הבאים:

התקופות של חרדה, מנח או אי שקט וסימנות טורט (מצב של תנועות גוף ודיבור חסינים נשלטים או טיקים) אם הם יש לך היסטוריה משפחתית של הפרעה זו (לחץ חות עיני מוגבר (גלאוקומה) פגיעלות יתר של בלוטת התריס (תירואיד) או יביעות לב כגון תרופות לב, דופק לא סדיר, כאבים בחזה (אנגינה פקטוריס), אי ספיקת לב, מחלת לב או בעיה מולדת בלב (לחץ דם גבוה מאוד (יתר לחץ דם) או היצרות של כלי דם עורקים) (חסמינת עורקים, אשר עלולה לגרום לכאב ברועות וברגליים) או של חלקים נדיר של בלוטת האדרנל (יתרת הכליה) הידוע בשם פאורכרומוציטומה

אם אתה לא בטוח אם אתה סובל מאחד מהמצבים הרפואיים שפורטו מעלה, שאל את הרופא.

אין לטויל רפנידאט אל.איי אם אתה נוטל תרופה מקבוצת מעכבי מונואמיני אוקסידאז (MAO) או אם נוטל מעכבי MAO בהחלק ה-14 הימים לפני התחלת הטיפול ברפנידאט אל.איי (ראה גם טעיף "התגובות בין תרופות")
נטילות רפנידאט אל.איי יחד עם תרופות מקבוצת מעכבי MAO עלולה לגרום להתגובה המורה הכוללת עלייה פתאומית בחום הגוף, לחץ דם גבוה בצורה קיצונית ועויותות חמורות.
שאל את הרופא אם אתה לא בטוח אם נוטל אחת מתרופות אלו.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה ספר לרופא אם אתה אלרגי לכל תרופה אחרת, מוזן, חומר יצבע או משמרים.
הרופא ירצה לדעת האם אתה נוטה לפתח אלרגיות.

לפני הטיפול ברפנידאט אל.איי ספר לרופא אם אתה סובל מחד מן ההתנהגויות של המצבים הפוריים המפורטים:

- פגמים בלב (כגון אי תקינות במבנה של המלב [structural cardiac abnormalities])
- טיקים (עויות שרירים המתרחשת בדרך כלל בפנים או בתכפיים) או אם לאחריך או לאחיותיך יש טיקים
- היסטוריה משפחתית של מוות פתאומי או דופק לא סדיר
- התקשות של העורקים
- כל בעיית לב אחרת עכשווית או קודמת
- אי תקינות של כלי הדם במוח, למשל היחלשות כלי הדם (מפרצת), שבץ מוחי או זדלקת כלי הדם (וסקולייטיס)
- דיכאון חמור, הפרעה דו-קוטבית או מחלת נפש אחרות
- התנהגויות או מחשבות אובדניות
- אפיילפסיה (פרכוסים, עויותות או התקפים) לחץ דם גבוה
- היסטוריה של התמכרות לאלכוהול, סמים או תלות בתרופות
- הפרעות נפש חרופות הגורמות לחשיבה ותפיסה חריגת (פסיכוזה) או לתחושה בלתי רגילה של ריגוש, פעלתנות יתר וחוסר אפיק (acute mania) - הרופא יאמר לא אתה סובל מעצבים אלה
- תסמינים פליכטיים כגון ראייה או הרגשת דברים שאינם קיימים במציאות (הזיות) התנהגות תקופתית
- אם יש לך אחד מהמצבים המפורטים לעיל, ייתכן שהרופא ירצה לקנות באמצעי הזירות מיוחדים.

אזהרות נוספות

- רפנידאט אל.איי** עשויה לתת תוצאה חיובית שגויה בבדיקות לשימוש בתרופות, כולל בבדיקות הערכות ספורט
- בחלק מהילדים המקבלים **רפנידאט אל.איי** לטווח ארוך עשויה להיות תאסה בגדילה, אך בדרך כלל הם יפיעו על כפיסו על ידי חזרה הטיפול יופסק (ראה גם טעיפים: "משך הטיפול" ו"בדיקות מעקב")
- במטופלים מסוימים **רפנידאט אל.איי** עשויה לגרום לאי נוחות בבטן, איבוד התיאבון וקשי שינה, במיוחד בהתחלת הטיפול. הרופא יכול

לסייע להפחית תסמינים אלה על ידי הקטנת המנה של **רפנידאט אל.איי** או שינוי זמן נטילת התרופה

- אם במהלך הטיפול **ברפנידאט אל.איי** או לאחר הפסקת הטיפול יש לך זיזקפות כאובות שהן באופן חריג ממושכות או חדות, ייתכן שאתה זקוק לטיפול רפואי דחוף. דף עשוי לקרות בכל קבוצת גיל. **אם זה קורה, פנה מייד לרופא**
- אם אתה נוטל **רפנידאט אל.איי** עם תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטוניניות, למשל סרטוליין ונלפאקסין המשמשות לטיפול בחזה ואתה חווה שיילוב של התסמינים הבאים: חוסר מנוחה, רעידות, התכווצויות שרירים פתאומיות, חום גבוה לא רגיל, בחילות והקאות, הפסק את הטיפול ב**רפנידאט אל.איי** ובתרופות אלה ופנה מייד לרופא שלך
- אם אתה עומד לעבור ניתוח, יש ליידע את הרופא כי אתה נוטל **רפנידאט אל.איי**. אין לקחת **רפנידאט אל.איי** ביום הניתוח אם ששתים שבועות לפני כן. חוסר מסיים פתאומית של מחלת הדם עלייה פתאומית בלחץ הדם במהלך הניתוח

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מועידת לילדים מתחת לגיל 6.

בדיקות מעקב

יש להקפיד להגיע לפגישות המעקב אצל הרופא כדי שניתן יהיה לעקוב אחר התקדמות הטיפול. הרופא יבדוק את לחץ הדם שלך ויערוך בדיקות דם מדי פעם כדי למונע הופעת תופעות לוואי.

אם ילדך לא גדל לגובה או לא עולה במשקל כצפוי, ייתכן שיידרשו הפסקות במזן **רפנידאט אל.איי**.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

- תרופות מסוימות **רפנידאט אל.איי** הניתלות יחידו, עלולות להפריע זו לזו. תרופות אלה כוללות:
 - תרופות המעלות את לחץ הדם
 - נוגדי קרישה הניתלים דרך הפה או וארפרין (תרופות המשמשות למניעת קרישי דם)
 - אגוניסטים לרצפטור מסוג אלפא 2 כגון קלודיין (המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה)
 - תרופות לטיפול בדיכאון, כגון נוגדי דיכאון טריציקליים ומעכבי מונואמיני אוקסידאז (MAO).
 - ראה גם טעיף "אין להשתמש בתרופה אם"
 - נוגדי פרסוסים מסוימים (תרופות המשמשות לטיפול באפילפסיה או בהתקפים)
 - פנילבטאזון (לטיפול בכאבים או בחום)
 - גואנתנין
 - מאלחשים

תרופות המשפיעות על רמת הדופמין בגוף (תרופות דופמינרגיות המשמשות לטיפול במחלת הפרקינסון או פארקינסון)

תרופות המעלות את רמת הסרוטונין בגוף (תרופות סרוטוניניות, למשל אלה המשמשות לטיפול בדיכאון כמו סרטוליין ונלפאקסין)

ייתכן שיהיה צורך לשנות את המינון של התרופות שלך או שצנטררך לקחת תרופות אחרות. היוועץ ברופא.

אם לא ספירת לרופא על תרופות נוספות שאתה נוטל, היוועץ בו לפני נטילת **רפנידאט אל.איי**.

אם אתה עומד להתחיל טיפול בתרופה חדשה, הזכר לרופא שלך, רופא השיניים או הרוקח כי אתה מטופל ב**רפנידאט אל.איי**.

שימוש בתרופה מוזן

ניתן לטויל כמוסות **רפנידאט אל.איי** עם או בלי מזון.

שימוש בתרופה וזריכת אלוהול

אין לצרוך אלוהול בתקופת **רפנידאט אל.איי** אל.איי. יש לזכור שמאלכוהיל מסוימים תרופות מסוימות מכילים אלוהול.

צריכת אלוהול עלולה לגרום להחמרה בחלק מתופעות הלוואי של **רפנידאט אל.איי**, כגון סחרחורת ונמנום.

היריון והנקה

אין להשתמש ב**רפנידאט אל.איי** במהלך ההיריון אלא אם הרופא הורה על כך במפורש. תרופה זו עלולה להשפיע על העובר אם את נוטלת אותה בעת ההיריון.

אם הרית בתקופת הטיפול ב**רפנידאט אל.איי**, היוועץ ברופא. הרופא יוכל לדון איתך בסיכונים ובתועלת של נטילת התרופה במהלך הריון.

הנקה

אין להניק במהלך טיפול ב**רפנידאט אל.איי**. החומר הפעיל ב**רפנידאט אל.איי** יכול לעבור לחלב אם.

נהגה ושימוש במכוונת

בתקופת הטיפול ב**רפנידאט אל.איי** יש להיזהר בנהיגה, הפעלת מכוונת או ביצוע משימות בהן נדרשת רעונת עד שתדע כיצד התרופה משפיעה עליך.

תרופה זו עלולה לגרום להזיות, סחרחורת, נמנום, ראייה מעורפלת או תופעות לוואי אחרות במערכת העצבים המרכזית אשר עלולות לפגום ביכולת הריכוז באנשים מסוימים. אם אתה חווה אחד מתסמינים אלו, אין להנוהג ברכב, להפעיל מכוונת או לבצע כל פעילות המחייבת תגובות מהירות או פעילות אשר עלולה להיות מסוכנת.

באשר לילדים, יש להזהרים מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
תרופה זו מכילה סוכרוז. אם נאמר לך בעבר על ידי רופא שיש לך אי סבילות לסוכרים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת התרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

מינון:

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד על פי צרכי המטופל ותגובות לטיפול.

אין לשנות את המינון מבלי להתייעץ עם הרופא. אם אתה כבור שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי, יש להתייעץ עם הרופא המטפל. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

משך הטיפול:

יש להמשיך לטויל **רפנידאט אל.איי** למשך הזמן עליו הורה הרופא.

תרופה זו מסייעת בזיזיות התסמינים, אך אינה מרפאת. הרופא יבדוק את השיפור במבצעך כדי לוודא שהתרופה פועלת כנדרש והוא ידון איתך בשאלה עד מתי יש להמשיך בטיפול.
משך הטיפול ב-ADHD שונה בין מטופל למטופל.

במהלך הטיפול ב-ADHD, ייתכן שהרופא יורה על הפסקת נטילת **רפנידאט אל.איי** שברוקי זמן מסוימים (למשל בסופי השבוע או בחופשות בית הספר) כדי לראות אם נטיילת עדיין נדרשת. הפסקות אלה בטיפול עוזרות גם להימנע מההאטה בגדילה אשר מתרחשת לעיתים כאשר ילדים נוטלים תרופה זו לאורך זמן.

צורת הטיפול:

ניתן לטויל **רפנידאט אל.איי** עם או בלי מזון. יש לבדוע את הכמוסה בשלמותה פעם אחת ביום, בבוקר, עד כוס מים מלאה. אין לכתוש, ללעוס או להצות את הכמוסות, מאחר שהן עלול לפגוע במנגנון שחרור התרופה.

- אם המטופל אינו יכול לבלוע את הכמוסה, ניתן לפתוח את הכמוסה בזהירות ולפיזר את תוכנה (כדורית קטנות) על כמות קטנה של מזון רך (כגון רסק פופונים):
- יש לוודא שהמזון אינו חם שכן הדבר עלול להשפיע על התכונות הייחודות של הכדוריות הנמצאות בכמוסה
- יש לאכול באופן מיידית את תערובת התרופה/מזון

בשלמותה

- אין לשמור את התערובת לשימוש עתידי

אם הכמוסות גורמות לך אי נוחות בטנית, ניתן לטויל אותן עם מזון, אך יש להקפיד ולטויל אותן תמיד באותו אופן (כלומר: תמיד עם מזון או תמיד ללא מזון). בדרך זו ההשפעה תמיד תהיה זהה.


הנחיות לפתיחת אריזת המגש:

תרופה זו זמינה באריזות מגש קשות-פתיחה לילדים, הניתנות לקילוף. שים לב בבקשה להוראות הפתיחה הבאות של אריזת המגש:

- אין לדחוף את הכמוסה החוצה מאריזת המגש מאחר שפעולה זו תמנעך את הכמוסה.
- החזק את אריזת המגש כך שנייר הכסף המודפס יופנה כלפי מעלה וכופף אותו לאחור לאורך הקו המנוקב. כופף את אריזת המגש בכיוון ההפוך וקרע לאורך הקו המנוקב.



- משוך מנה בודדת על ידי קריעה לאורך הקו המנוקב באריזת המגש וקלף לאחור את נייר הכסף על מנת לחשוף את הכמוסה.



אם נוטלת בטעות מינון גבוה יותר

חלק מהתסמינים של מנת יתר הם: הקאה, אי שקט, כאב ראש, רעידות, עויותות שרירים, דופק לא סדיר, הסמקה, חום, הזעה, אישונים מורחבים, קשי נשימה, בלבול, פרכוסים ועויותות שרירים המלות בחום ובשתי אדום-חום.

אם נוטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך. עשה זאת גם אם אין סימנים להרעלה או אי נוחות.

אם שכתה לטויל את התרופה

אם שכתה לטויל תרופה זו בזמן המיועד וזכרת לפעול אמצע היום, יש לטויל מנה מייד כשזכרת ולחזור ללוח הזמנים הרגיל ביום למחרת. אם לא זכרת ללוח לפני אמצע היום, דלג על המנה שנסכחה וקח את המנה הבאה בבוקר שלמחרת, כרגיל. אין לטויל שתי מנות ביחד על מנת לפנות את המנה שנשכחה. אם תעשה כך אתה עלול להגדיל את הסיכוי לתופעות לוואי.

אם קשה לך לזכור מתי לקחת את התרופה שלך, היוועץ ברוקח.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ לך על ידי הרופא.

כמו כל התכשירים המעוררים, **תרופה זו עלולה להיות מעכרת ומנוגלת לרעה על ידי אנשים מסוימים.** אם נטייל אותה בצורה נכונה כפי שהורה הרופא, ישנן טעות לרעה או תלות לא אמורים להוות בעיה, לאע כשת ולא בעתיד.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה מבלי להיוועץ ברופא. אם אתה מפסיק בפתאומית את הטיפול, ייתכן שיחזור מצבך הרפואי טרם הטיפול או שתופעה תופעות לוואי כגון דיכאון. כדי להמנע מכך, ייתכן שהרופא יורה על הקטנת המנה היומית באופן הדרגתי לפני הפסקת הטיפול לחלוטין. יש צורך בהשגחה רפואית לאחר הפסקת הטיפול.

אין לטויל תרופות בחושך! בדוק התויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה עוקק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

דווח לרופא בהקדם האפשרי אם אינך מרגיש טוב בזמן הטיפול ברפנידאט אל.איי.

כמו בכל תרופה, השימוש ב**רפנידאט אל.איי** עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל יתיבל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לדווח מייד לרופא או לפנות לחדר מיון במקרים הבאים:

- סימנים של אלרגיה כגון: התנפחות של הפנים, השפתיים או הלשון, קוצר נשימה, צנפונים או קושי בנשימה. אלה סימנים של תגובה אלרגית חמורה
- חולשה או שיתוק של הגפיים או הפנים, קושי בדיבור או התעלפות בלתי מוסברת
- פריחה בעור, גירוד, תמנים אדומים על העור, שלפוחיות או קילופי עור
- עלייה פתאומית בחום הגוף, הזעה, בלחץ הדם או כאב בחזה, קשינון שרירים ותנודות בחלק הדם אשר עלולות להוביל לתדרמים (קומה)
- מצב ממדי: יש נוכחות תסמינים זמניים שפעת כגון צמזמורות, חום, כאב גרון ונדלת, בלוטות נפוחות, כאבי שרירים או מפרקים
- דימום או חבורות עוריות או רגילים
- עיפות לא רגילה, קוצר נשימה במהלך פעילות גופנית, סחרחורת, עור חיוור
- טטויל לא רצוני של הגוף (סימנים של רעד) כגון עויותות, טטויל או תנועות התפתלות בלתי נשלטות
- פרכוסים (התקפים) או התעלפות בלתי מוסברת
- כאב או תעוקה בחזה
- דופק מהיר או לא סדיר
- הצבעה של העור או העיניים, גוון כהה לשתי או גוון בהיר לצואה
- בלבול, אשליית או הזיות (ראייה או תחושה של דברים שאינם קיימים)
- התרגשות, פעלתנות יתר והתנהגות נוטלת עכבות
- כאב ראש חמור או קבוע
- דיבור ותנועות גוף בלתי נשלטים (תסמונת טורט) זקפה ממושפת הגורמת לאי נוחות של הפין (סימן לפריאפיזס)
- מחשבות או ניסיונות להרוג את עצמך (חשיבה אובדנית או ניסיון התאבדות כולל התאבדות בפועל)
- האצבעות בדיים וברגליים חסרות תחושה, מרגיזות שרקות, מעקצצות ומשונות צבע (מלבן לכהול, זגז לאדום) כדור בחשיפה לקרי (תופעת ריינו, קור היקף)
- תופעות הלוואי שאינן מעלה עלולות להיות חמורות. ייתכן שיהיה צורך בהשגחה רפואית דחופה.

תופעות לוואי נוספות

דווח לרופא אם אתה מבחין באחת מהתופעות הבאות והיא מדיאגה אותך:

- תופעות לוואי שכיות מאוד** (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):
 - בחילה
 - איבוד התיאבון
 - כאב גרון ונדלת
 - עצבנות
 - דודדי שינה
 - יובש בפה

תופעות לוואי שכיות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- הקאה או כאב בטן
- אי נוחות בבטן או קשיי עיכול
- תחושת חרדה או אדגה
- תחושת מתח מוגבר
- אי שקט
- הפרעות שינה
- כאב ראש
- שיעול
- נמנום
- סחרחורת
- רגזנות
- נשירת שיער
- תפרחת עורית (חרלת)
- כאבי מפרקים
- כאבי שיניים
- הזעת יתר
- קצב לב לא נורמלי
- מועדות לפעימות הלב
- מועדות רגשית מופרזת או התרגשות
- ירידה במשקל
- תחושת דיכאון
- תחושת תוקפנות
- חריקת שיניים מופרזת

תופעות לוואי שאינן שכיות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- בצבית (נעילת) לטות - עוית בשרירי הלסת
- המקשה על פתיחת הפה

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- ירידה במשקל והאטה בגדילה בילדים
- ראייה מטושטשת או הפרעות במיקוד הראייה

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- מצב רוח ירוד, חולף
- עויותות שרירים
- אנמיה (ירידה במספר תאי דם אדומים), לויקופניה (ירידה במספר תאי דם לבנים), תרומבוציטופניה (ירידה במספר תאיטיות)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה הימנית (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- גמגום
- הרטבת לילה בילדים

תופעות לוואי נוספות שהתרחשו עם תרופות אחרות המכילות את אותו החומר הפעיל כמו רפנידאט אל.איי:

לדלק של דרכי הנאף והגרזן

ירידה בו זמנית במספר תאי הדם (תאי דם

אדומים, לבנים וטסיות)

התנפחות של האוזניים (סימן של תגובה אלרגית)

רגזנות, תוקפנות, שינויים בצבע רוח, התנהגות או חשיבה לא תקינות, כעס, מועדות יתר לסכבה, תחושת ריגוש לא רגילה, פעלתנות יתר וחוסר מרגשות (מניה), חוסר התמצאות (דיסאוריינטציה), שינוי בהנחיית יומיו, חוסר רגש לדבר אחד, בלבול, התמכרות