

**עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי**  
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד  
לשימוש בבעלי חיים בלבד

**1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה**  
גלפניקול תמיסה וטרינרי, תמיסה למתן במי שתיה לתרנגולות, המכילה פלורפניקול 10%

**2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון**  
**Florfenicol 10% w/v**  
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר- ראו בסעיף 13 "מידע נוסף"

**3. למה מיועדת התרופה**  
לטיפול בזיהומים חיידקיים הרגישים לפלורפניקול בתרנגולות.  
קבוצה תרפויטית: תכשיר אנטיביוטי, מקבוצת ה Amphenicols, בעל פעילות רחבת טווח  
כנגד חיידקים גראם-חיוביים וגראם שליליים.

**4. התוויות נגד**  
אין להשתמש בתרנגולות המטילות ביצי מאכל.  
אין לתת לעופות רבייה, התכשיר עלול לגרום לתמותת עוברים וירידה חדה בבקיעה.  
אין להשתמש במקרה של רגישות יתר לחומר הפעיל (פלורפניקול).

**5. תופעות לוואי**  
ירידה בצריכת המזון והמים נצפו לאחר שימוש וכן לשלשת רכה (שלשול) אשר נעלמו עם  
הפסקת הטיפול.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על  
תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות  
(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,  
או ע"י כניסה לקישור : [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

**6. חיות מטרה: תרנגולות**

**7. מינון ואופן המתן**  
30 מ"ג/ק"ג משקל גוף בנתינה מרוכזת במי השתייה ל 6-8 שעות למשך 3-5 ימים, או על  
פי המלצות הרופא הווטרינר המטפל.

**8. אופן השימוש בתכשיר**  
למתן במי השתייה לפי ההוראות בסעיף 7.

**9. זמן המתנה- זמן המתנה לשחיטה לבשר: 7 ימים**

**10. אזהרות**

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר  
המרכיב הבלתי פעיל N-methylpyrrolidone (NMP) עלול לגרום לנזק לעובר, לפיכך  
נשים בגיל הפוריות צריכות לנקוט זהירות רבה על מנת להימנע מנזילה של התכשיר על  
העור בזמן הטיפול בתכשיר. אם את בהריון, חושבת שאת בהריון או מנסה להרות, אל  
תטפלי בתכשיר.

### 11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C
- חיי מדף לאחר מיהול במי שתייה: 24 שעות

### 12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

### 13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם Propylene glycol, n-methylpyrrolidone
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה- תמיסה צלולה חסרת צבע עד צהבהבה
- גודלי האריזות : 500 מ"ל, 1 ליטר, ייתכן ולא כל גדלי האריזות משווקים.

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30, אור עקיבא, 3060000

### נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות :

149-46-33423-00

הערות	אסמכתא לעדכון	פרקים שהתעדכנו	תאריך עדכון העלון
	1. עבור התווית הנגד- עלון הולנדי של התכשיר Introflor שהוגש בעת הערכה מחודשת אושר כאסמכתא ע"י חני מנדלסון – ראה מצ"ב אישורה 2. אישור מגר חני מנדלסון להוספת אזהרה על מרכיב בלתי פעיל- מצ"ב 3. תעודת רישום עדכון חיי מדף לאחר פתיחה	פרקים 1, 4, 10, 11, 13	12.2020
	עדכון זמן המתנה מ 3 ל 7 ימים לפי החלטת משרד הבריאות בהערכה מחודשת.	9. זמן המתנה	11.2022