

## مسحوق لتحضير محلول للشرب

المواد الفعالة وكيفيتها:

كبس 1 يحتوي على:

مايكروجول (يعرف أيضًا باسم بوليبيتيلين جليكول) 3350

كبريتات الصوديوم لامانة 100 غرام

كلوريد الصوديوم 7.5 غرام

كلوريد البوتاسيوم 2.691 غرام

كيس 2 يحتوي على:

حامض الأسكوربيك 4.7 غرام

اسكوربات الصوديوم 5.9 غرام

تركيز أيونات الكهارول (الكترولينات) بعد إذابة الكبسين في الماء لتحضير لتر واحد من محلول هو:

صوديوم 181.6 ملليمول/لتر (من بينها ليس أكثر من 56.2 ملليمول

قابلة للأمتصاص).

كلوريد 59.8 ملليمول/لتر

سولفات 52.8 ملليمول/لتر

بوتاسيوم 14.2 ملليمول/لتر

اسكوربات 29.8 ملليمول/لتر

مواد غير فعالة ومتبرة الحساسية في الدواء: انظر بند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بامتنان حتى تهابها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلحة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء لعلاج مرضاً، لا تتعاطه إلى آخر. فهو قد يسبب الضرر لهم، حتى إذا بدا ذلك أن وضعهم الصحي مشابه.

## 1. لأي غرض مخصوص الدواء؟

يمكن إعطاء العلاج بالتقسيم لجرعتين أو كله في جرعة واحدة، كما هو موصوف فيما يلي:

1. في جرعتين: لتر واحد من موقيبريب في المساء قبل الإجراء السريري، والتر واحد من موقيبريب بأكرا في صباح اليوم الذي سيتم فيه الإجراء السريري.

2. جرعة واحدة: لتران في المساء قبل الإجراء السريري أو لتران في صباح اليوم الذي سيتم فيه الإجراء السريري.

للعلاج الذي يغطي بجرعتين والعلاج الذي يغطي في جرعة واحدة مسافة قبل الإجراء السريري يجب ترك فترة زمنية

من ساعة على الأقل بين إنهاء شرب أي سائل كان (موقيبريب أو سائل صاف) وبين بدء تنفيذ فحص تنظير القولون.


للعلاج الذي يغطي بجرعة واحدة صباح يوم الإجراء السريري، يجب ترك فترة زمنية من ساعتين على الأقل قبل إنهاء

تناول موقيبريب وساعة واحدة على الأقل قبل إنهاء شرب أي سائل صاف وبدء تنفيذ فحص تنظير القولون.

مهم: لا تأكل غذاء صلب من اللحظة التي تبدأ بها بشرب موقيبريب، وحتى بعد الفحص.

كيف يتم تحضير موقيبريب

- افتح كبس شفاف واحد وأخرجه منه الأكياس 1 و 2.
- أضف محتويات الكبسين - كبس 1 و كبس 2 إلى وعاء قياس الذي يحتوي على لتر واحد.
- أضف ماء حتى الخط الذي يشير في الوعاء إلى لتر واحد وأخلط الماء حتى ذوبان كل المسحوق والحصول على محلول موقيبريب صاف أو عكر قليلاً. قد تستمر هذه العملية لمدة خمس دقائق.



## كيف يتم شرب موقيبريب

اشرب اللتر الأول من محلول موقيبريب خلال ساعة حتى ساعتين. حاول شرب كأس كاملة كل 10 حتى 15 دقيقة. حين تكون جاهزاً، حضر واسحر اللتر الثاني من محلول موقيبريب الذي ستقوم بتحضيره من الأكياس 1 و 2 من الكبس المنشطة.

خلال هذا العلاج، يوصى بتناول لتر إضافي آخر من سائل صاف، لكن لا يشعر بالعطش الشديد وحتى لا تصاب بالجفاف.

المشروبات المائية في الماء، حساء صاف، عصير الفاكهة (بدون قشر الفاكهة)، مشربات حفظية، شاي أو قهوة (بدون حليب). بإمكانك شرب هذه المشروبات متى شئت.

## ماذا من المتوقع أن يحدث؟

عندما تبدأ بشرب محلول موقيبريب، من المهم أن تبقى قريباً من المرحاض. في لحظة ما، ستبدأ لديك حركة أمعاء مائية. هذا أمر متوقع، وبينن أن محلول موقيبريب يعلم. حركة الأمعاء ستتوقف بعد وقت قصير من بدء أن تنتهي شرب محلول.

إذا عملت بحسب هذه التعليمات، ستفوز بأعماوك، وهذا سيساعد في نجاح الفحص. بعد شرب الجرعة الأخيرة يجب عليك ترك مدة زمنية كافية من أجل السفر إلى مكان إجراء فحص تنظير القولون.

إذا تناولت عن طريق الخطأ كمية أكبر مما ينبغي من موقيبريب، من المهم أن تطور إسهال حاد الذي يمكن أن يؤدي إلى جفاف. اشرب كميات كبيرة من السوائل، خاصة عصائر الفاكهة. إذا كنت قلقاً، اتصل بطبيبك أو الصيدلي.

إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلغ طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدوا، توجه فوراً إلى الطبيب أو غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسبت تناول الدواء في الوقت المحدد، اشرب الجرعة حالاً عندما تكتشف بذلك لم تتناولها.

إذا حصل ذلك بعد ساعات بعد الوقت الذي كان عليك شربه، توجه إلى طبيبك أو إلى الصيدلي وتشاور معهم. من المهم إكمال تحضيرك لثانية واحدة على الأقل قبل الفحص عند تناولك موقيبريب بقسم جرعتين، وساعتين على الأقل قبل الفحص إذا كنت ستتناول كل جرعة موقيبريب الخاصة بك في صباح الفحص.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق والجرعة في كل مرة تتناول بها دواء. يجب وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أي أسلحة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كل أي دواء، قد يسبب استعمال موقيبريب أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تُنزع من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تصيب بأي واحد منها.

الإسهال هو ظاهرة عادي عند تناول موقيبريب.

## 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب النسم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك تمنع النسم. لا يسبب التقier بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. انتبه أنه من الممكن أن يكون تاريخ انتهاء صلاحية مختلف لكبسات مختلفة.

تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين الأكياس من موقيبريب دون دون 25 درجة مئوية.

بعد أن أنتبه موقيبريب في الماء، يمكن تخزين المحلول (في وعاء مغلق) بدرجة حرارة الغرفة (أقل من 25 درجة مئوية). يمكن أيضاً تخزينه في الثلاجة (2-8 درجات مئوية). لا تحتفظ به لأكثر من 24 ساعة.

يجرب استخدام الكبس بعد فتحه.

لا يجوز تناول الخالص من الدواء في مياه الصرف الصحي أو في التفاسيات البيئية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من الدواء. إن ذلك سيساهم في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمواد الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على: مادة طعم بنكهة الليمون، aspartame, potassium aceulfame potassium, مكملات.

## معلومات إضافية أنظر للبند 2.

## كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

تحتوي هذه العبوة على كبسين شفاف يحتوي كل واحد منها على زوج من الأكياس: كبس 1 و كبس 2. يجب إذابة كل زوج من الأكياس (2x1) في لتر واحد من الماء.

مسحوق موقيبريب في الأكياس معد لـ تحضير محلول للشرب ويتم تسويقه في زرم من عبوة واحدة.

صاحب التسجيل: يادجيتس إسرايل وكالات. م. ض، شارع راكيفت 1، ش. هـ.

المنتج: نورجني ليبيتيد، ميدلسكس، إنجلترا.

تم التسجيل في أيلول 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 33156 38 145.

للتبسيط وتبسيط القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. بالرغم من ذلك، الدواء مخصوص لأبناء كلا الجنسين.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تتعاطى من عرض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

13.09.22