

يسوق الدواء بدون وصفة طبية

دكسامول پلوس، حبوبلات

500 ملج حبوبلة كل حبوبلة على ايراستامول (Paracetamol) 50 ملج Caffeine) 50 ملج

مواد غير فعالة ومبيبات الحساسية في الدواء - انظر للبلند 6 مركبات اضافية* والبلند 2 معلومات مهمة عن جزء من مكونات الدواء*.

اقرأ النشرة بالباعن حتى نهايتها قبل ان تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. اذا كانت لديك ابلنة اضافية، توجه الى الطبيب أو الى الصيدلي. يعطى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للبالغين والاطفال فوق عمر 12 سنة. يجب تناول الدواء حسب التعليمات في بند 4 "كيف تستعمل الدواء" في هذه النشرة. استشر الصيدلي اذا كنت بحاجة لمعلومات اضافية. يجب مراجعة الطبيب اذا استمرت الحبوبلة لأكثر من 3 أيام أو اذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام على الزرع من استعمال الدواء.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

دكسامول پلوس مخصص لتسكين الألم وتخفيف الحبوبلة الناتجة عن أسباب مختلفة مثل: صداع الالام، الالام الأسنان، زكام، انفلونزا، الالام الروماتزمية (rheumatic) والالام الدورة الشهرية (المضمت).

الفصيلة العلاجية: دكسامول - مسكن للألم وخافض للحرارة. كفلين - مشتقة الكاسيتان (xanthine derivatives)، يساعد في تخفيف الالام.

2. كيف استعمال الدواء

- **لا يجوز استعمال الدواء إلا:**
 - كنت حساناً (أرجحاً) للمادة الفعالة (ايراستامول أو كفلين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (النظر للبلند 6).
 - إذا لم تكن متأكدًا، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
إذا تطورت لديك في الماضي أعراض حساسية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على ايراستامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على ايراستامول. كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية وخيمة.

يجب على المستحضر على ايراستامول الذي قد يسبب الضرر لذلك عندها:

- عطي بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
- مرض شرويوات الكحولية خلال فترة العلاج.
- عند تناول اىوية اضافية التي تؤثر على عمل الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متقاربة بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول اىوية اضافية لتخفيف الحبوبلة وتسكين الالام، أو اىوية للزكام بدون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع فرط الجرعة التسمم بباراستامول.
- لا يجوز تناول اىوية اضافية من عائلة دكسامول وأو مستحضرات التسمم بباراستامول.
- يجب تجنب تناول جرعة عالية (ضمن الحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

احك الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- حساسية لغذاء معين أو الدواء معين
- مرض كبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلية
- الالام عن الكحول
- بركان
- إذا كنت تشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثلاً الشاي والقهوة
- إذا كنت حاملًا أو ممرضة

إذا لم تكن متأكدًا من أن إحدى هذه الحالات صحيحة بالنسبة لكَ، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

تفاعلات بين اىوية
إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخرًا أو إذا قد تتناول، اىوية أخرى بما في ذلك اىوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

لا يجوز تناول اىوية أخرى تحتوي على ايراستامول أثناء تناول دكسامول پلوس.
بالإصح كك اىوية، والصيدلي اذا كنت تتناول: دوميپرودون أو ميثوكلوپراميد (علاج القيحان، التقيؤات ومشاكل هضم أخرى)، من الممكن أن تزيد تأثير تسكين الالام للإيراستامول.

كولسترولين (تخفيف فرط دهنيات الدم)، قد تقلل تأثير تسكين الالام للإيراستامول.
دوريفرين أو كورميتنغز أخرى (لتسليم الدم) - إذا كنت تتناول دوريفرين، وورفيرين، بريكباتك تناول دكسامول پلوس بين الفينة والأخرى، لكن استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء بشكل اعتيادي.

ايزونيوزيد (للسل) ممكن أن يزيد تأثير الكفلين.
مغربيات (تخفيف القلق، توتر ضد العضل)، ممكن أن يزيد تأثير الكفلين.
فيلوكسيتيسين (مضاد حيوي)، بسبب إخطار شديد لإضراب إلى الدم وفي الوسائل (الحماض الأضي مع مجال اىوية مرتفع)، الذي يلازم علاجًا مستجدًا ومن الممكن أن تحدث بالأصح في حال اعتدال شديد في الكلى، تعفن الدم (عندما تتواجد الجرثيم وموسمها في الدورة الدموية وتسبب ضررًا في الضوض)، سوء التغذية، إيمان مزمن في الكحول، وإذا تم استعمال الجرعات القسوى في اليوم من ايراستامول.

مستحضرات التي تحفز إنتاج ايزيمات في الكبد (مثلًا):
ريفامبينسين، باربيورات، اىوية للمصرع، فينوبوتين، كاربامازيبين.
مستحضرات مضادات الالتهاب الالسترويديية.
كلورفينيكول (مضاد حيوي).
بروبيتايد (العلاج القوي).

إذا لم تكن متأكدًا من أحد هذه البنود صحيحة بالنسبة لك، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

استعمال اىوية وإسهول الكحول
لا يجوز شرب المشرويات الكحولية خلال فترة العلاج بالادواء.
استعمال اىوية والغذاء
بما أن هذا الدواء يحتوي على كفلين يجب الامتناع عن شرب مشرويات تحتوي على كفلين مثل الشاي أو القهوة أثناء العلاج بالادواء.

الحمل والأرضاع
إذا كنت حاملًا أو ممرضة، تعتقدن أنك من الممكن أن تكوني حاملًا أو إذا كنت تحظين لحمل، استشري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.
إذا كنت هناك بصورة يمكن تناول الدواء أثناء الحمل، يجب تناول اىوية الالام الفعالة لك لتسكين الألم أو لتخفيف الحبوبلة لفترة الأربعة الالمر السبعة استشر اىوية إذا لم يطرأ تحسن في الألم و/أو في الحبوبلة أو إذا كنت بحاجة لتناول اىوية لفترة متقاربة أكثر.
الكفلين الذي في الدواء من الممكن أن يؤثر على طفلك.

الاستعمال لدى الأطفال
هذا الدواء مخصص للبالغين والأطفال ما فوق جيل 12 سنة، انظر للبلند 3.
يجب على الوالدين تبليغ الطبيب المعالج عن جميع الظواهر الجانبية وكذلك عن كل دواء إضافي يعطى للطفل.

معلومات هامة عن قسم من مركبات الدواء
FD&C yellow No. 6 aluminum lake (E110) الذي من شأنه أن يسبب ردود فعل أوجه. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ملغوم صوديوم (23 ملغ) الحساسة. أي أنه فعليًا "خال من الصوديوم".

3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا من الجرعة وطريقة العلاج بالادواء.
في حال عدم وجود توصية آخرى من الطبيب فإن

الجرعة الموصى بها بشكل عام هي:
البالغون والأطفال فوق جيل 12 سنة: 1-2 حبوبلة، 4-6 ساعات حسب الحاجة.
لا يجوز تجاوز جرعة 8 حبوبلات لليوم.
لا يجوز تجاوز اىوية الموصى بها.
عليك التوجه للطبيب إذا استمرت الحبوبلة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تخفف الحبوبلة في غضون 3 أيام رغم استعمال الدواء.

طريقة تناول:
يجب بلع الدواء مع الماء لتسهيل عملية البلع. يجب أن كانت هناك ضرورة بشطر الحبوبلة لإستعمال فوري، يجب بلع الحبوبلة سويًا فورًا بعد الشطر. لا توجد معلومات بالنسبة لاسحق أو مضغ الحبوبلة.

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة
إذا تناولت بالخطأ جرعة مفرطة أو إذا تناولت جرعة من الدواء عن طريق الخطأ توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى عرفة الطوارئ في المستشفى، واحضر عبوة الدواء معك. لا يجب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

حتى لو كان شكوك جبار، العلاج الفوري ضروري، بسبب إخطار تطور ضرر وخيم في الكبد.
أعراض جانبية من الممكن أن تكون غثيان، وتقيؤات، إسهال، فقدان الشهية، الالام في البطن، انتفاخ تعرق زائد، ألم أو حساسية في أعلى البطن مع الجفاف أحيانًا لا تعكس وخامة الضرر الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول اىوية في الظلام. تحقق من المصق والجرعة في كل مرة تناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة اليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، استعمال دكسامول پلوس من الممكن أن يسبب أعراضًا جانبية مثل الدوار، لدى بعض المستخدمين. لا تفرح مع قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها.
الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

أعراض جانبية وخيمة.

يجب التوقف عن استعمال ومراجعة الطبيب حاله عند ظهور:
• ردود فعل أوجه، وخيمة مثل طفح وحكة، انتفاخ العينين، الشفتين، اللسان، الخد، العنق التي من الممكن أن تؤدي لصعوبة في التنفس أو البلع، انتفاخ الأطراف.
• في حالات نادرة، أمراض جلد وخيمة التي قد تكون أعراضها: احمرار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة.
• تظهر أعراض جانبية وخيمة حتى لو تناولت في العافية مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعال ايراستامول بدون مشككة.

إذا ظهرت أعراض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالًا. علامات العلامات في جهاز الدم مثل: نزف، ظهور كدمات بسهولة، تطور التهات ببطء أكبر نتيجة انخفاض وخيم بعدد خلايا الدم البيضاء.

• ضيق تنفس (نادر)

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمت أو استمرت الأعراض الجانبية التالية أكثر من عدة أيام:

- غثيان
- الدوي الرأس
- آرق
- طفح في الجلد

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية غير متوقعة من الربط "الربط "إيراسول علا من خلال النسخة لواء يركب تسيول رويوت" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الإستمارة الإلكترونيّة للتبليغ عن أعراض جانبية. عن طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- يجب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وهكذا تمنع التسمم. لا تتسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (التاريخ المضمون الظاهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شرط التخزين: يجب التخزين ما دون 30°C.
- لا يجوز التخلص من اىوية في المجاري، في سلة النفايات المنزلية، أو في الصنابير، حول خفيئة التخلص من اىوية التي لم تعد قيد استعمالها. سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعال يحتوي الدواء أيضًا على:

- Povidone, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, iron oxide yellow (E172), titanium dioxide (E171), macrogol 400, iron oxide red (E172), FD&C yellow No. 6 aluminum lake (E110), iron oxide black (E172), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: حبوبلة بلون بني مع خط للسطر من كلا الجانبين.

أحجام العبوات المصادق: 10، 20، 30، 32 حبوبلة. قد لا تكون جميع أحجام العبوة متوفرة.

التاريخ في أب 2022 وفقًا لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل اىوية الحكومي هي وزارة الصحة:

042-81-25950-00

للتبليغ وتسهيل الفعالة تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.

المنتج وصاحب المنتج:

دكسل ص.م.ض.

شارع دكسل 1، أور عكيفا
3060000، إسرائيل