

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب

## پارامول پلوس، حبسولات

تحتوي كل حبسولة على پاراسيتامول (Paracetamol) 500 ملغ وكافئين (Caffeine) 60 ملغ  
 مرصقات الدواء،  
 6 "معلومات إضافية" ولبند 2 و"معلومات مهمة" عن جزء من

أقرأ النشرة بالعلماء حتى نهتمها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. يعطى هذا الدواء من دون حاجة لوصفة طبيب وهو مخصص للبالغين والأطفال فوق عمر 12 سنة. يجب تناول الدواء حسب التعليمات في بند 3 "كيف تستعمل الدواء" في هذه النشرة. يستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب مراجعة الطبيب إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمّت علامات المرض أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام على الرغم من استعمال الدواء.

### 1. لا غرّ في شخص الدواء؟

**پارامول پلوس** مخصص لتسكين الآلام وتخفيف السخونة الناتجة عن أسباب مختلفة مثل: صداع، الآلام، الأسنان، زكام، التهابات الرئة، وروماتيزم (rheumatic) وآلام الدورة الشهرية (الطمث).

### الفصلية العلاجية:

پاراسيتامول - مسكن للآلام وخافض للسخونة  
 كافئين - مشتقة الكافئينين (xanthine derivatives)، يساعد في تخفيف الآلام.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجحاً) للسادة الفعالة (پاراسيتامول أو كافئين) أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر اللبند 6).
- إذا لم تكن متأكداً، استشر الطبيب، الصيدلي أو الممرضة قبل استعمال الدواء.

### تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

- إذا تطورت لديك في الماضي أعراض جانبية جلدية نتيجة تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، فلا يجوز تناول مستحضرات تحتوي على پاراسيتامول، كي لا تحدث ثانية أعراض جلدية وخيمة.
- يحتوي المستحضر على پاراسيتامول الذي قد يسبب الضرر للكبد عندما:

- يعطى بجرعة أعلى من الموصى بها أو لفترة طويلة.
- شرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج.
- عدم تناول أدوية أخرى إضافية التي تؤثر على عمل الكبد.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لفترات متتالية بدون استشارة الطبيب.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية لتخفيف السخونة وتسكين الآلام أو أدوية لا يمكن بدون استشارة طبيب أو صيدلي لمنع طرف العلاج، التسمم بالأدوية.
- لا يجوز تناول أدوية إضافية من عائلة پارامول وآل مستحضرات إضافية تحتوي على پاراسيتامول.
- يجب تجنب تناول جرعة عالية (ضمن الحد الموصى به) من هذا الدواء أثناء الصوم.

### احث تطبيقك قبل البدء بالعلاج إذا كنت عانيت في

- المغاضي من:
- حساسية لغذاء معين أو لدواء معين
- مرض كبد أو خلل في وظيفة الكبد
- خلل في وظيفة الكلى
- الإدمان على الكحول
- يرقق
- إذا كنت تشرب الكثير من المشروبات التي تحتوي على كافئين، مثلاً الشاي والقهوة.
- إذا كنت حاملاً أو مرضعة

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التأكد من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً من الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. في حال عدم وجود توصية أخرى من الطبيب فإن الجرعة الموصى بها بشكل عام هي: البالغون والأطفال فوق 12 سنة: 1-2 حبسولات كل 4-6 ساعات حسب الحاجة. لا يجوز تجاوز جرعة 8 حبسولات يومياً. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها. عليك تجنب الطبيب إذا استمرت السخونة لأكثر من 3 أيام أو إذا لم تحفّ الأعراض في غضون 3 أيام رغب استعمال الدواء.

### طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع الماء لتسهيل عملية البلع. يسمح إذا كانت هناك ضرورة بقطر حبسولة الإستعمال فوق سطح اللسان. يجب بلع القسمين بسهولة وإقرراً بعد الفطري. لا توجد معلومات بالتسليم لسحق أو مضغ الحبسولة.

### 4. تناولت بالخطأ جرعة زائدة

إذا تناولت بالخطأ جرعة زائدة أو إذا تناولت مطلقاً من الدواء عن طريق الخطأ، توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، واتصل بمرشد عبوة الدواء، أو مكتب التفتيش دون تأخير مبرح من صحتك. حتى لو كان شعورك جيداً، العلاج الفوري ضروري. بسبب إخطار تطوّر ضرر وخيم في الكبد. أعراض جانبية من الممكن أن تكون غيبان، وتقيحات، إسهال، فحان الشبيهة، الآلام في البطن، والقيح، تعرق زائد، ألم وحساسية في أعلى البطن، ومنع الجائز أنها لا تعكس وخامة الضرر. الحاصل للكبد.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقق من المصنع والجرعة على كل مرة تتناول فيها الدواء. وضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب، الصيدلي،

### 4. الأعراض الجانبية

كما هو الحال مع أي دواء، استعمال پارامول يولس من الممكن أن يسبب أعراض جانبية مثل: الصداع، آلام في بعض العضلات، حمى، وتفرغ من قرأة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحد منها. الأعراض الجانبية قد تكون وخيمة أكثر لدى المسنين.

### أعراض جانبية وخيمة:

يجب التوقف عن الإستعمال ومراجعة الطبيب حاله عند ظهور:

- ردود فعل أرجحية وخيمة مثل طفح وحكة
- انتفاخ الوجه، انتفاخ اللسان، الحلق، العين
- التي من الممكن أن تؤدي لصعوبة في التنفس أو في انتفاخ الأطراف.
- في حالات نادرة: أمراض جلد وخيمة التي قد تكون أعراضاً: إمرار، طفح، حويصلات، إصابة جلدية واسعة. قد تظهر أعراض جانبية جلدية وخيمة حتى عند تناول في الماضي مستحضرات التي تحتوي على المركب الفعّل پاراسيتامول بدون مشكلة.

إذا تطوّر عرض جانبية جلدية، يجب إيقاف العلاج ومراجعة الطبيب حالاً. علامات تفرغات في جهاز الدم: أنزفة، ظهور كدمات بسهولة، تطور التهابات بسهولة، كحلي نتيجة انخفاض وخيم بعدد خلايا الدم البيضاء. ضيق تنفس (نادر).

بلغ الطبيب أو الصيدلي إذا تفاقمّت أو استمرت الأعراض الجانبية التالية أكثر من عدة أيام:

- غثبان
- ألم في الرأس
- أرق
- طفح في الجلد
- إذا ظهر عند أخذ
- الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جدي من النشرة. عليك استشارة الطبيب.

### التعليق عن أعراض جانبية

من قبيل تقييم ريد على أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "معلومات إضافية" في الصفحة الرئيسية موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى الإستمارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو على طريق دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال وأول الربيع وهكذا تمتع التسمم. لا يجب التفتيش دون تعليمات صريحة من الطبيب ولا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. شروط التخزين: في مكان جاف، بعيداً عن الضوء، درجة الحرارة: 15°C - 25°C.

لا يجوز التخلص من الأدوية في المجاري أو في قاذورات المنزل. الأسمدة الصيدلية حول التخلص من الأدوية السائلة التي لم تعد قيد الإستعمال، سوف تساعد هذه الوسائل في حماية البيئة.

### 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّل يحتوي الدواء أيضاً على:

Povidone, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, iron oxide yellow (E172), titanium dioxide (E171), macrogol 400, iron oxide red (E172), FD&C yellow No. 6 aluminum lake (E110), iron oxide black (E172), carnauba wax

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

حبسولة بوزن بيتي مع خط للشطر من كلا الجانبين.

50 حبسولة المصالح عليها: 20, 10, 30, 30

أحجام حبسولة قد لا تكون جميعها ألواناً مميّزة.

مؤدفة

من التبليغ في أب سجد وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية القومي هي: وزارة الصحة: 127-94-30766-0

التسليم وتسهيل القراءة، تمت تصاغة هذه النشرة بصيغة المتكسر، بالرغم من ذلك، الدواء مخصص للأشخاص.

### المنتج وصاحب التسجيل:

**دكسل م. ص.** شارع دكسل 1, أور عكبنا 3060000, إسرائيل