

פראמול® פולס, life

קפילות

כל קפליה מכילה פראצטמול (Paracetamol) 500 מ"ג וקפאין (Caffeine) 50 מ"ג. מוסרימ בלתי מאלרגיית התרופה - ראה סופר 3 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה, אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

התרופה זו ניתנת ללא צורך במרשם רופא והיא מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים. על ליקוי תגובת התרופה על היסטוריה של סוכרת, 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" בעלון זה. היועץ הרפואי אם אתה הולך לקוד מידע נוסף.

יש לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 3 ימים למרות השימוש בתרופה.

1. למה מיועדת התרופה?

פראמול פולס מיועדת לשיכוך כאבים ולהורדת חום הגורמים חסיבות שונות כגון: כאבי ראש, כאבי שיניים, העטנת, שפעת, כאבי שיניים (ראומטיים) וכאבי מחזור.

פראמול פולס מכשך כאבים מוריד חום. קפאין - מגדיר על מסמך (xanthine derivatives), מסייע לשיכוך כאבים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה גרש (אלרגי) לתכשירים הפעילים (פראצטמול או קפאין) או זיל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סופר 6).
- אתה אינך בטוח, היועץ הרפואי, רוקח או אחות לפני השימוש בתרופה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אם פיתחת חום בתופעות לואי עוריות כתוצאה מנטילת תכשירים המכילים פראצטמול, אין לטויל תכשירים המכילים פראצטמול, כל של יגרשו שוב תופעות עוריות מחורות.
- התכשיר מכיל פראצטמול העלול לגרום לנזק בכבד כאשר:
- ניתן במינון גבוה מהמומלץ או לתקופה ממושכת.
- בזמן הטיפול שותים משקאות אלכוהוליים.
- נטילת תרופות נוספות המשפיעות על פעילות הכבד.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות בלי היועץ הרפואי.
- אין לטויל תרופות נוספות להורדת חום ושיכוך כאבים או תרופות להעטנת לילד התינוקות עם רופא או רוקח למידע מיון יתר או הרעלה של פראצטמול.
- אין לטויל תרופות נוספות משפחת פראמול ו/או לתכשירים נוספים המכילים פראצטמול.
- יש להימנע מלקחת מין גבוה (גבול המומלץ) של תרופה זו בזמן צום.

ספר לרופא לפני התחלת הטיפול אם אתה

- **סובל או סבלת בעבר מ:**
- גישות לזמן לזמן או לרופא על התרופה כלשהי
- מחלת כבד או ליקוי בתפקוד הכבד
- ליקוי בתפקוד הכליה

- אלה שותה הרבה משקאות המכילים קפאין, למשל תה וקפה
- אם את בריריו או מניקה
- אם אינך בטוח אם אחד מהמצבים לעיל נכון לגביך, היועץ הרפואי, רוקח או אחות לפני השימוש בתרופה.

תגובות בתרופות

אם אתה לוקה, אם לקחת לאחרונה או אם אתה עשוי לקחת, התרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזון, ספר על כך לרופא או לרוקח.

פראצטמול בזמן טויל פראמול פולס

במידה וספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקה, דומפרידון או מנוקולוראמיל (לטיפול בחבלה, הקאה ובעיות עיכול נוספות), עלול להגביר את השפעת שיכוך הכאב של פראצטמול.

כולסטרמיין (להפחתת יתר שומני הדם), עלול להפחית את השפעת הכאב של פראצטמול.

וופרין או מוקרנים אחרים (לדילול הדם) - אם אתה לוקה וופרין, אתה יתה לך לקחת **פראמול פולס** מדי פעם, אך היועץ הרפואי או רוקח יתה לך לקחת תרופה זו באופן שגרתי.

איונואיד (שפעת), עלול להגביר את השפעת קפאין.

מפרובאמטל (להפחתת חרדה, מתח ועייבות שירים), עלול להגביר את השפעת קפאין.

פוליקוקסילין (אנטיביוטיקה), עקב סיכון חמור להפרעה בדם ובנוזלים (חצבת מנטבולית עם מרווח אינוי גבוה), אשר מייבת מינון דחוף ועשוי להתרחש במידה וטיפול של ליקוי חמור בליבות, אלזה עם (כאשר חידשים ההרגלים של נעגאים במחזור הדם ונרמנים נלק באיבר).

יש להימנע מלשתות אלכוהוליים כרזין, ואם נעשה שימוש במינונים המקסימליים ביום של פראצטמול.

תכשירים המזרימים יצור אנזימים בכבד (דוגמה: רופמפיצין, פרוברטרסין).

תרופות אלפא-לפטסי - פנטוויין, קרבמפיין, תכשירים מגדילת שנתים סטרואידים.

לדומפרידון (אנטיביוטיקה), פרונובול (לטיפול בסידון).

אם אינך בטוח אם אחד מהמספיים לעיל נכון לגביך, היועץ הרפואי, רוקח או אחות לפני השימוש בתרופה.

שימוש בתרופה וזריחת הטיפול

אין לצרוך אלוכלי בה הטיפול בתרופה.

שימוש בתרופה ומזון

מאחר שתתופה זו מכילה קפאין יש להימנע משתייה מרובה של משקאות הפכילים קפאין כגון תה או קפה בזמן הטיפול בתרופה.

הריון והנקה

אם את בריריו או מניקה, חושבת שאת עשוי להיות בריריו או מתכנתת הריון, היועץ הרפואי או רוקח לפני השימוש בתרופה.

אם יש צורך, ניתן לקחת את התרופה במהלך ההריון. יש לטויל את המנה המומלצת בלי העילה לעבור לשיכוך הכאב ו/או להורדת החום, למשך הזמן המיועץ ברוח האפשרי.

היועץ הרפואי אם אין הקלה בכאב ו/או בחום אם את אתה זריכה לטויל את התרופה לעיתים תכופות יותר.

הקפאין בתרופה זו עלול להשפיע על ילדך.

שימוש בילדים

תרופה זו מיועדת למבוגרים וילדים מעל גיל

12 שנים, מספיק 3. על ההורים לדווח לרופא מוספת על התופעות הלואי וכן על כל תרופה נוספת הניתנת לילד.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה (E110) FD&C yellow No. 6 aluminum lake.

העלול לגרום להגמנות אלרגיות.

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לקפליה, כלומר היא למעשה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליו לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח במגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

בהעדר הוראה אחרת מהרופא, המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12: 1-2 קפילות כל 4-6 שעות לפי העורך. אין לעבור על מינון של 48 קפילות ללמנה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

עליו לפנות לרופא אם החום נמשך יותר מ-3 ימים או אם התסמינים מחמירים או אינם חולפים תוך 3 ימים למרות השימוש בתרופה.

צורת הטויל:

יש לבלוע את התרופה עם מים. על מנת להקל על הבלועה, ניתן במידת הצורך לחכות את ההקפאה לשימוש מיידי. יש לבלוע את שני התכשירים יחד מדי לאחר החיפה. אין מידע לגבי נתישה או לעיסה של החיפה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע לך מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים. ובא אריות התרופה איתך. אל נגרמם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא!

גם אם הרגשתך טובה, יש מידע ליוני, **בגלל הסיכון להפחתות נזק חמור לכבד.**

תופעות לואי יכולות להיות בחבלה הוקאה, שלשול, אובדן תיאבון, כאבי בטן, נפיחות, היעה מוגברת, כאב או גרישות בבטן העליונה וזרימת שןן לא משפיע על חומרת המקל לכבד.

אם יש לטויל תרופות נוספות בדוק התוויות והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרוב משפיים אם אתה לוקה להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ הרפואי או רוקח.

4. תופעות לואי

גם ככל הרופא, השימוש בפראמול פולס עלול לגרום לתופעות לואי כגון, חסרורות, חבלה מתמשכתשים. אל תיבלה למקרה רשימת התופעות הלואי. ייתכן של תסכול מאף אחת מןן.

תופעות הלואי עלולות להיות מחורות יותר בקשישים.

תופעות לואי מחורות:

יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא בהופעת:

- תגובות אלרגיות חריפות כגון פריחה גורד, הנחפות של הפנים, העלפים, הלשון, הגרון, הצוואר אשר עלולים לגרום לקשיי נשימה או בליעה, התנפחות הגפיים.
- במקרים דרורים, מחלות עור חריפות שסמינים שלדים יכילים להיות אדם, פריחה, שלפוחיות, פגיעה עורית נרחבת.
- תופעות לואי עוריות חריפות עלולות להופיע גם אם בעבר נטלת תכשירים המכילים את המרכיב הפעיל פראצטמול ללא בעיה.

- אם מופיעות תופעות לואי עוריות, יש להפסיק הטיפול ולפנות לרופא באופן מיידי.
- למכשירים יש שינויים במערכת הדם כגון: דימומים, הופעת חבורות בקלות, התפתחות דלקות בירת קלות כתוצאה מירידה חמורה במספרת תאי הדם הלבנים.
- קוצר נשימה (נדיר).

פראמול פולס או לרוקח אם תופעות הלואי הבאות מחמירות או נמשכות מעבר למספר ימים:

- בחילה
- כאב ראש
- נדודי שינה
- פריחה בעור

אם מופיעה תופעת לואי, אם אחת מתופעות הלואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעות לואי שאל צוינה בעלון, עליו להתייעץ עם הרופא.

דין על תופעות לואי

ניתן לדווח על תופעות לואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לואי" עקב טיפול תרופתי" שמצג בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס מקוון לדיווח על תופעות לואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. אין לאחסן את התרופה?

מגע הרעלה תרופה זו חל לתרופה אחרת. יש לשמור במקום קריר ומוזל להישג יד יד וטווח ארייתם של ילדים ו/או נתיקות ועל ידי כך נמנע הרעלה. אל נגרמם להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי התפוגה המופיע על גבי האריזה. אתה תגרוך את מתיחת יום האחרון של אותו חומר.

חנאי אסוחין: יש לאחסן מתחת ל-25°C.

אין להשתין תרופות לביוב או לפח אשפה בית. יש אלת את הרוקח אין להשתין תרופות שאינן שימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Povidone, croscarmellose sodium, hypromellose, magnesium stearate, iron oxide yellow (E172), titanium dioxide (E171), macrogol 400, iron oxide red (E172), FD&C yellow No. 6 aluminum lake (E110), iron oxide black (E172), carnauba wax

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

קפליה בעברת חום עם קו חלקה בשיש הגדדים: 50, 30, 20, 10, גודל אריות מאושרים: 10, 20, 30, 50 קפילות. יתכן שלתל על גודל האריות משוקיים. נערי באוטוס 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופות בבנקס התרופות הממלכתית במשרד הבריאות:

127-9430766-0

לשם הפטנט והתקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לנבי יש ממינים.

יצרן ובעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל