

شديد لا يزول في منطقة البطن لديك. من الجائز أن تشعر بالألم بIntensity من بطنه حتى ظهرك. قد يظهر الألم مع أو دون تقييّد. قد تكون هذه أعراض التهاب في البنكرياس.

### 2.3.3 الفحوص والمتابعة

إفحص السكر لديك في الدم كما أمرك الطبيب.

سوف يقوم طبيبك بمراقبة السكر في دمك من خلال فحوصات دم منتظمة، والتي تشمل فحص نسبة السكر لديك في الدم والهيماوجلوبين A1C الخاص بك.

قد يجري لك طبيبك فحوصات دم لفحص نسبة فيتامين 12.

### 2.4.4 التداخلات / التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين أو إذا تناولت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إحدى طبيب أو الصيدلي عن ذلك.

بالأخص إذا كنت تتناولين:

- توبيرامات (العلاج الاختلالات والشقيقة).
- أسيتيلازولاميد (العلاج الذهمة، كلوكوماً ومرض دوار البحر).
- دولووترجافير (العلاج ثلوث - HIV).
- سيميتيدين (العلاج القرحة الهضمية).
- راندولازين.
- فانديتلين.

قد يؤثر سيatar پلوس على طريقة عمل أدوية أخرى، وقد تؤثر أدوية أخرى على طريقة عمل سيatar پلوس.

تعرف على الأدوية التي تتناولها، احتفظ بقائمة الأدوية الخاصة بك وأرها طبيبك وللصيدلي عند تناولك دواءً جديداً.

### 2.5. استعمال سيatar پلوس والطعام

يجب تناول سيatar پلوس مع وجبات الطعام للمساعدة في تقليل الإحتمال لديك للmeal مع اضطرابات في الجهاز الهضمي.

### 2.6. الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً أو تخاططين للحمل: من غير المعرفة إذا كان سيatar

پلوس سيفيلن الضرر يحيّن. إذا كنت حاملاً، تحدثي مع طبيب بخصوص طريقة الأفضل للتحكم بنسب طبيب لديك أثناء الحمل.

إذا كنت مرضعة أو تخاططين للرضاع: ليس معروفاً إذا كان سيatar

پلوس ينتقل إلى طبع الأم لديك. تحدثي مع طبيبك عن أفضل طريقة لإطعام رضيعك إذا كنت تتناولين سيatar پلوس.

إذا كنت أمراً ما تجترن سن اليأس (قبل سن اليأس)، وليس لديها مطهٍ متمنٍ على الإطلاق: يمكن أن يؤدي سيatar پلوس لنزيف بويضة من البباض (إيابس) لدى المرأة. يمكن لهذا أن يزيد من احتتمال لديك في حدوث حمل. أخبري طبيبك فوراً في حال حدوث حمل لديك أثناء تناول سيatar پلوس.

### 2.7. معلومات عامة من بعض مركبات الدواء

يحتوي سيatar پلوس على صوديوم، يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول صوديوم (23 ملخ) لكل قرص، مما يعني أنه عاليًا "حال من الصوديوم".

يحتوي سيatar پلوس على لكتوز، إنليل لك من قبل الطبيب أنْ لديك عدم تحمل لأنواع معينة من السكر، يرجي التوجه إلى الطبيب قبل تناولك سيatar پلوس.

### 2.8. كيفية استعمال سيatar پلوس؟

يجب إستعمال سيatar پلوس دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. سيخبرك طبيبك بخصوص عدد أقراص سيatar پلوس التي عليك أن تتناول ومتى عليك تناولها.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

قد يغير طبيبك المقدار الدوائي من سيatar پلوس حسب الحاجة.

يجب تناول سيatar پلوس مع وجبات الطعام للمساعدة في تقليل الإحتمال لديك للmeal مع اضطرابات في الجهاز الهضمي.

قد يقول لك طبيبك بأن تناول سيatar پلوس سوية مع أدوية معينة أخرى للسكر، قد يحدث اختلاف السكر في الدم (hypoglycemia) (في أيّات

القرفة 4" الأخرى) (الأعراض الجانبيّة)".

هذا الدواء يزيد من خصوصية للأطعمة لدى الأطفال دون عمر 18 سنة.

لا تتوفر معلومات حول سحق، شطّر، أو مضاعف هذه الأعراض. أخبر طبيبك إن لم تكن قادرًا على بلع أقراص سيatar پلوس كاملة. في حال وجّد لديك اختلاف في الفضل الكلي، فقم بتقطيع الأقراص إلى نصفها.

إذا تناولت سيatar پلوس ما ينافي، تحدثي مع طبيبك فوراً.

إذا تناولت مقدارًا دوائيًا مفرطاً أو إذا بلغ طفلك الخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك عليه الدواء.

إذا فاتك تناول المقدار الدوائي الثاني، قوت المقدار الدوائي المنسى وعد إلى الجدول الزمني العادي الذي تناولت لا يجوز تناول مقدارين دوائيين من سيatar پلوس في نفس الوقت.

من الجائز أن تحتاج للتوقف عن تناول سيatar پلوس لوقت قصير. إنصل طبيبك للتلقى تعليمات إذا كنت:

• تعاني من الحفاف (فقد سوائل جسم أكثر من اللازم). قد يحدث التحافت إذا كنت مريضاً وتعاني من تقيّمات شديدة، إسهال أو سخونة، أو إذا كنت تشرب سوائل أقل بكثير من المعتاد.

• تخطط للخضوع لعملية جراحية.

• مقدماً على تناول حقنة ملؤنة أو مادة غلالية من أجل التصوير بالأشعة السينية. (أنظر البند 2.2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال سيatar

پلوس" والقرفة 4" الأخرى) (الأعراض الجانبيّة)".

عندما يكون جسمك مسؤولاً تحت أنواع مختلفة من الضغط مثل: سخونة، صدمة (مثلًا حادث طرق)، ثلوث أو عملية جراحية، قد تتغير كمية دواء السكر التي تحتاج إليها. أخبر طبيبك فوراً إذا كانت لديك آية حالة من هذه الحالات وتصرّف حسب تعليمات طبيبك. استمر باللحمة التي وُضفت لك وبرنامج الفعالية البدنية أثناء تناول سيatar پلوس.

تحدد مع طبيبك على كمية تناولك لسيatar پلوس. (إرتقاع السكر في الدم) (hypoglycemia) ومشكلة موجودة لديك بسبب السكري.

وأصل تناول سيatar پلوس طالما يقول لك الطبيب فعل ذلك.

يجب الم關注ة على العلاج حسب توصية الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة طبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد

## سيtar پلوس 50 / 500

أقراض مطلوبة

يحتوي كل قرص على:

سيtaglitin (as hydrochloride) 50 mg ملغ 50

Metformin Hydrochloride 500 mg ملغ 500

ملع 500

## سيtar پلوس 50 / 850

أقراض مطلوبة

يحتوي كل قرص على:

سيtaglitin (as hydrochloride) 50 mg ملغ 50

Metformin Hydrochloride 850 mg ملغ 850

## سيtar پلوس 50 / 1000

أقراض مطلوبة

يحتوي كل قرص على:

سيtaglitin (as hydrochloride) 50 mg ملغ 50

Metformin Hydrochloride 1000 mg ملغ 1000

ملع 1000

للماء الماء غير الفعالة ومواد الحساسية في المستحضر يرجى التوجّه للقرفة 6 "معلومات إضافية". انظر أيضًا البند 2.7 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن سيtar پلوس. إذا توفرت لديك أسلطة أضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

• يُوصى هذا الدواء للعلاج من آنجل. لا تتعاطي هذا العلاج من الآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أنّ حالي الطيبة مشابهة لحالتك.

• هذا الدواء غير مخصص للإعطاء لدى الأطفال دون عمر 18 سنة.

### (1) لأي غرض مخصوص يستار پلوس؟

ما هو سيtar پلوس؟

الفصيلة العلاجية: سيtaglitin: مثبط الإنزيم DPP-4. ميتفورمين: بيفاونيد.

### 2.1 ما هو سيtar پلوس؟

سيtar پلوس هو قرص يحتوي على دواعين ملزمتين بوصفة طبيب،

التي يتمتع بها المرضى، الذين يخافون من ارتفاع السكر في الدم. سيtaglitin، المفترض إلى فصيلة الأدوية المسماة مشطات dipeptidyl (DPP-4) (peptidase-4 inhibitors)، وميتفورمين، الذي يتمتع إلى فصيلة البيغوانيدات، حيث يعملان معًا من أجل تحسين نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري من نوع 2، الذين يناسبونه هذا الدمج.

سيtar پلوس يشارك حمية موصى بها وبرنامج رياضية بدنية، مخصوص لتحسين نسب السكر في الدم لدى مرضى السكري من نوع 2.

### (2) قبل استخدام سيtar پلوس

#### 2.1 لا يجوز إستعمال سيtar پلوس إذا:

• يوجد لديك سكري من نوع 1.

• وُجد لديك اختلاف في وظيفة الكلى يشكّل خطيراً (سيحدّد طبيب ما هو مستوى الضرر في وظيفة الكلى لديك).

• وُجد لديك حمض كيتوني سكري (نسب متزايدة من الكيتونات في دمك) أو في بولك: اختلاط للسكر الذي تناولت نسب متزايدة من السكر في الدم في الداء، فقدان حسناً في الرغبة في الذهاب إلى廁所، غثيان أو تقيّبات.

• كانت حساساً لكل واحد من المركبات في سيtar پلوس (انظر الفقرة 6 "معلومات إضافية") لإقامة المركبات الكاملة في سيtar پلوس (أعراض القرفة 6 رد الفعل التحسسي الخطير لسيtar پلوس قد تشمل: طفح، بقع بازرة، حمّاء على جلدك (رثى) أو انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والحنجرة الذي قد يؤدي إلى صعوبة في التنفس أو في البالغ.

### 2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال سيtar پلوس

قبل بدء العلاج بـ سيtar پلوس، إحدى طبيبك عن جميع مشاكل الطيبة، بما في ذلك إذا:

• يوجد لديك حالياً أو جد لديك في الماضي إتهاب البنكرياس (pancreatitis). في حال كان لديك إتهاب البنكرياس في الماضي، من غير المعروف أن يكون لديك احتمال أكبر للإصابة بإتهاب البنكرياس أثناء تناول سيtar

پلوس (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

• وجدت لديك مشاكل في الكلى.

• يوجد لديك حالياً أو كان لديك حصى في كيس العدارة.

• وجدت لديك نسب مرتفعة من الشحوم الثلاثية في الدم.

• وجدت لديك قصور في القلب.

• كنت تشرب الكحول في فترات متقاربة جدًا، أو تشرب الكثير من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة. إذا كنت في السابق مدعماً على الكحول.

• كنت مقاماً على تناول حقنة ملؤنة أو مواد ضليلة من أجل التصوير بالأشعة السينية، من الجائز أن تكون هناك حاجة للتوقف عن تناول سيtar پلوس لفترة قصيرة. إسترثري طبيك بخصوص متى عليك التوقف عن تناول سيtar

پلوس، وهي على الأرجح مدعماً. (انظر الفقرة 4 "الأعراض الجانبية").

• وُجدت لديك نسب منخفضة من فيتامين B<sub>12</sub> في الدم.

• كنت حاملاً أو تناولت للحمل (أنظر للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع

والخصوبة").

• كنت مرضعة أو تناولت للحمل (أنظر للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

• كنت منظم أو على الإطلاق (أنظر للبند 2.6 "الحمل، الإرضاع والخصوبة").

• توفّق عن تناول سيtar پلوس وإتصل طبيبك على الفور إذا كان لديك ألم

● إنسداد أو سيلان الأنف وألم في الحنجرة.  
● إلتهاب في الطرق التنفسية العلوية.  
● إسهال.  
● غثيان وقيحات.  
● غازات، إنزعاج في البطن، مشاكل في الهضم.

● ضعف.  
● صداع.  
● انتفاخ في البطن، مشاكل في الهضم.  
● إنخفاض السكر في الدم (hypoglycemia) عند الإستعمال بمشاركة أدوية معينة، مثل سوفونيل بورا أو أنسولين.  
● إن تناول سيتار بلوس مع وجبات الطعام يمكنه المساعدة بقليل للأعراض الجانبية الشائعة التي تحدث عادة في بداية العلاج، إذا كنت تعاني من مشاكل شاذة أو مفاجئة في البطن، تحدث مع طبيبك، إن المشاكل في البطن التي تبدأ في مرحلة متاخرة من العلاج قد تكون إشارة إلى شيء أكثر خطورة.

#### قد تكون لـ سيتار بلوس أعراض جانبية أخرى، تشمل:

- إنتفاخ البطنين أو الرجلين، قد يحدث إنتفاخ البطنين أو الرجلين إذا كنت تتناول سيتار بلوس بمشاركة روزيجيلاتازون، روزيجيلاتازون هو دواء من نوع آخر للسكري.
- آلام مفصلية.
- آلام عضلية.
- ألم في الذراع أو في الرجل.
- ألم ظهر.
- حكة.
- حوصلات.

هذه ليست جميع الأعراض الجانبية الممكنة لـ سيتار بلوس، لمعلومات إضافية، إسأل طبيبك.  
أخبر طبيبك إذا كان لديك أي عرض جانبى الذي يزعجك، أو أنه لا يزول، إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

**التبلغ عن أعراض جانبية:**  
بالإمكان التبلغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى المنزوج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية.  
بالإضافة إلى ذلك، بالإمكان تبليغ شركة "يونيفارام، م.ض." على العنوان:

<https://unipharm.co.il/>

#### 5. كيفية تخزين سيتار بلوس؟

- يجب حفظ هذه الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن منتجات ألبى ومحالل رغوية للأطفال / أو الرضيع، وذلك لتفادي أصبعهم بالتنفس. لا تسبب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب!
- لا يجوز إستعمال سيتار بلوس بعد انتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● لا يجوز تخزين فوق 25 درجة مئوية.  
● لا يوجد أدوية إلى المجاري أو للقامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تقدر الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

#### 6. معلومات إضافية

##### 6.1 ماذا تحتوى سيتار بلوس؟

يحتوى الدواء بالإضافة إلى المركبات الفعالة أيضاً على:

Cellulose Microcrystalline, Povidone (K29/32), Sodium Stearyl Fumarate, Sodium Laurylsulfate, Purified Water.

يحتوى طلاء القرص (50 / 500) على المركبات غير الفعالة التالية: Polyvinyl alcohol, Titanium Dioxide (E171), Macrogol/ Polyethylene glycol, Talc, Iron Oxide yellow, Iron Oxide Red.

يحتوى طلاء القرص (50 / 850) على المركبات غير الفعالة التالية: Lactose Monohydrate, Hypromellose, Titanium Dioxide, Triacetin, Iron Oxide Red.

يحتوى طلاء القرص (50 / 1000) على المركبات غير الفعالة التالية: Polyvinyl alcohol, Macrogol/Polyethylene glycol, Talc, Titanium Dioxide, Iron Oxide Red, Iron Oxide Black.

##### 6.2 كفى بيدو سيتار بلوس وما هو محتوى العلبة

سيتار بلوس هي أقراص مطلية، بيضاء ومودية من كل الجنين، برقاقة اللون، مختومة بـ "S475" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

سيتار بلوس 850 / 50 هي أقراص مطلية، بيضاء ومودية من الجنين، وردية اللون، مختومة بـ "S476" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

سيتار بلوس 1000 / 50 هي أقراص مطلية، بيضاء ومودية من الجنين، بنية اللون، مختومة بـ "S477" من جانب واحد وملساء من الجانب الآخر.

##### أحجام العلبة:

سيتار بلوس 50 / 500: علبة بحجم، 28. 198 قرصاً مطلياً.  
سيتار بلوس 850 / 50: علبة بحجم، 14. 30.28 قرصاً مطلياً.

سيتار بلوس 1000 / 50: علبة بحجم، 14. 30.28 قرصاً مطلياً.

من الجائز أن ألسقّع كافة أحجام العلبة.

صاحب الإمتياز والمستورد: يونيفارام للتجارة. م.ض.، ص.ب. 21429

تل أبيب، 6121301.

تم إعدادها في تشرين الثاني 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

سيتار بلوس 50 / 500: 36970. . .

سيتار بلوس 850 / 50: 168.97.36684.99

سيتار بلوس 1000 / 50: 168.98.36685.99

من أجل سهولة وتوسيع القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة.

على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.  
إذا توفرت لديك أستئنة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو المصدي.

#### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال سيتار بلوس قد يسبب أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز الآتعاني أي منها.

قد يسبب سيتار بلوس أعراض جانبية خطيرة، بما في ذلك:

● 4.1 مضار لبني، يتقوّرون، أحد الأدوية في سيتار بلوس، قد يؤدي لحالة نادرةً (يمكن أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 مستعمل) لكنها خطيرة تسمى حمض لبني (lactic acidosis) (تراكم الحمض في الدم)، والذي قد يؤدي إلى الوفاة. حمض لبني هو حالة طارئة تستوجب علاجها في المستشفى.

توقف عن تناول سيتار بلوس وتحدث مع طبيك فوراً إذا كان لديك أحد الأعراض التالية، التي قد تكون علامات لحمض لبني (lactic acidosis):

● 4.2 كثت تشعر ببرودة في يديك أو راحتي قد تهدأ.

● 4.3 كثت تشعر بدوار أو بدوحة.

● 4.4 كثت تشعر بألم ضعيف أو بغير منظم.

● 4.5 كثت تشعر بآلام غير اعتيادية في العضلات (شاذة).

● 4.6 كثت تشعر بالعناس أو بالميل إلى النوم.

● 4.7 كثت تشعر بألم في البطن، غثيان أوقيحات.

غالبية الأشخاص الذين كان لهم حمض لبني معينون يعانون من أمور أخرى، التي يشاركة ميتقوّرمين أدى إلى حمض لبني. أخبر طبيك إذا كان لديك أي من الأمور التالية، لأن لديك احتمال أعلى لتتطور حمض لبني (lactic acidosis) (مع سيتار بلوس إذا كانت:

● 4.8 تعاني من مشاكل شديدة في الكلى أو أن الكلى لديك متاثرة من فحوصات أشعة سينية معينة التي تم بها إستعمال مادة ملوثة عن طريق الحقن.

● 4.9 تعاني من مشاكل في الكبد.

● 4.10 تشرب الكحول في فترات متقاربة جداً أو تشرب كمية كبيرة من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة.

● 4.11 تعاني من متلاطفات (فقدت الكثير من سوائل الجسم)، قدحصل ذلك إذا كنت مريضاً مع سخونة، تقيّوات أو إسهال. يمكن حصول المتلاطفات أيضاً إذا كنت تتعرق كثيراً خلال فعالية بدنية أو كافية بدنيّة ولم تشرب سوائل كافية.

● 4.12 تضرع لعملية جراحية.

● 4.13 تعاني من نوبة قلبية، تلوث خطير أو سكتة.

● 4.14 تبلغ من العمر 65 سنة أو أكثر.

الطريق الأفضل لتجنب مشكلة حمض لبني من ميتقوّرمين هو إختار طبيك إذا كان لديك أي واحدة من المشاكل في القائمة أعلاه، من الجائز أن يقرّر طبيك بأن يوقف لك سيتار بلوس لفترة ما إذا كان لديك أي واحد من هذه الأمور.

**4.2. إلتهاب البنكرياس (pancreatitis)** الذي قد يكون خطيراً ويؤدي إلى الوفاة.

مشاكل طبية معينة تزيد من احتمال لديك للإصابة بمرض البنكرياس. توقف عن تناول سيتار بلوس وإنصل بطبيك على الفور إذا كان لديك ألم شديد لا يزول في منطقة البطن، من الممكن أن تشعر بالألم مع أو بدون تقيّة. قد تكون هذه أعراض بطنك حتى ظهرك، قد يظهر الألم مع أو بدون تقيّة.

● 4.3. قصور القلب، قصور القلب معناه أن قلبك لا يضخ دماً بشكل جيد بما فيه الكفاية.

قبل أن تبدأ بتناول سيتار بلوس، أخبر طبيك إذا كان لديك ذات مرة قصور قلب أو يوجد لديك مشاكل في الكلى. إنصل بطبيك بشكّل فوري إذا كان لديك أي أحد الأعراض التالية:

● 4.4. تقيّف تفاس متزايد أو مشكلة في التنفس، خاصة عندما تكون مستلقّاً.

● 4.5. إنتفاخ أو احتباس سوائل، خاصة في راحتي القدمين، الكاحلين أو الرجدين.

● 4.6. إرهاق غير اعتيادي.

قد تكون هذه أعراض لقصور القلب.

**4.4. مشاكل في الكلى (شيعون غير معروف)، التي تتطلب أحياناً الديليز.**

**4.5. فيتامين B12 نقص (نقص فيتامين B12)** قد يسبب إستعمال ميتقوّرمين لفترة زمنية طويلة إنخفاضاً في كمية فيتامين B12 في دمك، خاصة إذا كانت لديك في الماضي تسبب مشكلة من فيتامين B12.

**4.6. سكر متلاطف في الدم (hypoglycemia).** شائع (يمكن أن يظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص). إذا كنت تتناول سيتار بلوس مع دواء إضافي يمكنه أن يؤدي إلى إنخفاض السكر في الدم، السادس السلفونيل بورياؤ أو الإنسولين، إن الخطورة هنا تعلق حاجة لخفض جرعة الدواء من نوع السلفونيل بورياؤ أو الإنسولين أثناء تناول سيتار بلوس.

قد تشمل علامات وأعراض إنخفاض السكر في الدم: صداع، نعس، ضيق، دوار، إرتباك، سخاف، جوع، تقيّف، قلل سرعة، تعرق، الشعور بالعصبية.

**4.7. ردود فعل تحسّيسية شديدة (شوع غير معروف)** يمكنه أن تحدث مع سيتار بلوس أو سيلاتيلبيتين، أحد الأدوية الموجودة في سيتار بلوس.

أعراض رد فعل تحسّيس شديد - لسيتار بلوس قد تشمل: طفح، بقع بارزة على جلدك (شيء) أو انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان والمنجدة الذي قد يؤدي إلى احتقان في النفس أو في البلع، إذا كانت لديك أي أعراض رد فعل تحسّيس شديدة، توقيف عن تناول سيتار بلوس وخذث مع طبيك فوراً أو توجه للحصول على ساعدة طبية緊急。

**4.8. ألم مفاجئ (شيعون غير معروف)** أشخاص معينون الذين يتناولون DPP-4، أحد الأسماء مثبطات DPP-4، أحد الأدوية في سيتار بلوس، قد يتأثرون بهم ألم مفاجئ الذي قد يكون شديداً، إنصل بطبيك إذا كان لديك أي شديد في المفاصل.

**4.9. ردود فعل جلدية (شيعون غير معروف).** جزء من الأشخاص الذين يتناولون أدوية المسماة مثبطات DPP-4، أحد الأدوية في سيتار بلوس.

قد تطور لديهم رد فعل جلدي يسمى "bullous pemphigoid" حيث من الجائز أن يقوّي ذلك طبيك بورياؤ أو إصابة الطبقة الخارجية من جلدك (تاكل). من الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً يمكنها أن تظهر لدى أكثر من شخص واحد من بين (10) - سيتار بلوس تشمل: