

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אריפירזול סנדוז® 5

אריפירזול סנדוז® 10

אריפירזול סנדוז® 15

אריפירזול סנדוז® 30

טבליות

הרכב:

אריפירזול סנדוז 5: כל טבליה מכילה:
אריפירזול 5 מ"ג aripiprazole 5 mg

אריפירזול סנדוז 10: כל טבליה מכילה:
אריפירזול 10 מ"ג aripiprazole 10 mg

אריפירזול סנדוז 15: כל טבליה מכילה:
אריפירזול 15 מ"ג aripiprazole 15 mg

אריפירזול סנדוז 30: כל טבליה מכילה:
אריפירזול 30 מ"ג aripiprazole 30 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה בפרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

מטופלים קשישים עם פסיכوزה הקשורה בדמנציה המטופלים בתרופות אנטי-פסיכוטיות נמצאים בסיכון גבוה למוות. אריפירזול סנדוז אינה מיועדת לטיפול בדמנציה הקשורה לפסיכוזה. נוגדי דיכאון מעלים את הסיכון למחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים עד גיל 25. עם תחילת הטיפול בתרופה, על המטופלים בכל הגילאים וקרוביהם, לעקוב אחר שינויים התנהגותיים כגון: החמרת הדיכאון, מחשבות אובדניות, תוקפנות וכדומה (ראה בפרק 2 "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").

1. למה מיועדת התרופה?

אריפירזול סנדוז 5, 10, 15, 30 מיועדים לטיפול בסכיזופרניה.

לטיפול במצבי מניה בדרגת חומרה בינונית עד קשה, במסגרת מחלה בי-פולרית סוג 1 ולמניעה של התקפים מניים חדשים במטופלים שעיקר מחלתם התקפים מניים ועברו התקפי מניה קודמים שהגיבו בעבר לטיפול באריפירזול.

בנוסף, אריפירזול סנדוז 5, 10, 15 מיועדים:

לטיפול משולב בדיכאון קליני מג'ורי (major depressive disorder [MDD]) במטופלים בהם התגובה לטיפול בנוגדי דיכאון הייתה חלקית. לטיפול באי-שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים (בגילאים 6-17 שנים). **קבוצה תרפויטית:** אנטי-פסיכויטיים אטיפיים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6 "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באריפירזול סנדוז, ספר לרופא אם:

- הינך בהיריון או מתכננת להרות, מניקה או מתכננת להניק.
 - הינך סובל מרמת סוכר גבוהה בדם (המאופיינת בתסמינים כגון צימאון מוגבר, השתנה מרובה, עלייה בתיאבון, וחולשה) או היסטוריה משפחתית של סוכרת.
 - הינך סובל מהתקפי אפילפסיה (פרכוסים).
 - הינך סובל מתנועות שרירים בלתי נשלטות ובלתי סדירות.
 - הינך סובל ממחלות קרדיו-וסקולריות (לב וכלי דם), היסטוריה משפחתית של מחלות קרדיו-וסקולריות.
 - היה לך שבץ מוחי או "מיני" שבץ מוחי.
 - סבלת בעבר מהתמכרות להימורים.
 - חלו לאחרונה עלייה במשקל, קשיי בליעה או תופעות אלרגיות, תנועות בלתי רצונית, ישנוניות המפריעה לפעולות היום-יומיות.
 - הינך חולה קשיש הסובל מדמנציה (אובדן זיכרון ויכולות שכליות אחרות), עליך או על המטפל שלך לספר לרופא שלך אם היה לך שבץ מוחי או "מיני" שבץ מוחי.
 - הינך סובל או סבלת בעבר מדיכאון.
 - הינך סובל מהפרעה בי-פולרית.
 - יש לך רמת שומנים גבוהה בדם.
 - הינך סובל מלחץ דם נמוך או גבוה.
 - יש לך היסטוריה של נפילות או שאתה סובל ממחלות או נוטל תרופות שיכולות לגרום לנפילות.
 - סבלת מלויקופניה או נויטרופניה כתוצאה מנטילת תרופות. ייתכן שרופאך ירצה לערוך לך בדיקות דם מקיפות.
 - הינך עושה פעילות גופנית מאומצת, נחשף לחום גבוה, סובל מהתייבשות או שאתה נוטל באופן קבוע תרופות בעלות פעילות אנטיכולינרגית.
 - יש לספר לרופא באופן מיידי אם יש לך מחשבות אובדניות או מחשבות לפגיעה עצמית (ראה אזהרה בראש העלון ובהמשך סעיף זה ב"אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה").
- אין להשתמש בתכשיר במטרה שונה מזו שלשמה נרשם.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לשימוש בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 6. נוגדי דיכאון מעלים את הסיכון למחשבות אובדניות בילדים, במתבגרים ובמבוגרים צעירים. יש לעקוב מקרוב אחר שינויים התנהגותיים, החמרה או עלייה במחשבות ובהתנהגויות אובדניות.

בדיקות ומעקב

בתקופת הטיפול באריפירזול סנדוז תיתכן ירידה בלחץ הדם, ועל כן יש להיות תחת מעקב רפואי, ולבצע בדיקות לחץ דם סדירות. כמו כן, ייתכן ותופנה על ידי הרופא לבדיקות דם לשם מעקב.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על

כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:

- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם – אריפירזול סנדוז עלול להגביר את השפעתן של תרופות אלו. התרופות הבאות עלולות להפחית את ההשפעה של אריפירזול סנדוז:
- תרופות לטיפול בפטרת – איטראקונאזול (itraconazole).
- אנטיביוטיקה – קלריתרומיצין (clarithromycin).
- תרופה להפרעות בקצב הלב – כינידין (quinidine).
- תרופות נוגדות דיכאון (ממשפחת ה-SSRIs) – פלואוקסטין (fluoxetine), פארוקסטין (paroxetine).
- התרופות הבאות עלולות להגביר את ההשפעה של אריפירזול סנדוז:
- תרופה לאפילפסיה – קארבאמאזפין (carbamazepine).
- אנטיביוטיקה לטיפול בשחפת – ריפאמפיצין (rifampicin).
- תרופות להשראת שינה – בנזודיאזפינים לדוגמה: לוראזפאם (lorazepam).

שימוש בתרופה ומזון

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

אין לשנות יינות או משקאות אלכוהוליים בתקופת הטיפול עם התרופה.

היריון, הנקה ופוריות

היריון

אל תשתמשי בתרופה כאשר הינך מתכננת היריון או בהיריון, אלא אם כן התייעצת עם הרופא שלך ודנת עימו בסיכון לעומת התועלת בלקיחת תרופה זו. שימוש בתרופה זו עלול להשפיע על מצבו הכללי של תינוקך. עלייך לדווח מיידית לרופא אם הינך בהיריון, חושבת שנכנסת להיריון או אם הינך מתכננת להיכנס להיריון. אל תפסיקי את הטיפול על דעת עצמך אלא התייעצי עם הרופא. אם הינך בטרימסטר השלישי להריוןך ונטלת את התרופה עלייך לדעת כי התופעות הבאות עלולות להופיע בתינוק מיד עם היוולדו: רעד, קשיון/רפיון שרירים, ישנוניות, עצבנות, קשיי נשימה וקשיי האכלה. אם תינוקך סובל מאחת מתופעות אלו – פני לרופא מיד.

שימוש באריפירזול סנדוז בהנקה

יש להתייעץ עם רופאך לגבי התועלת מול תופעות הלוואי לילוד בנטילת אריפירזול בהנקה. התייעצי עם הרופא מהי הדרך הטובה ביותר להזין את תינוקך כאשר את נוטלת אריפירזול סנדוז.

נהיגה ושימוש במכונית

השימוש בתרופה זו עלול לפגום בערנות ועל כן אין לנהוג או להפעיל מכונית מסוכנות או לבצע פעילות המחייבת ערנות עד שהשפעת התרופה עליך ידועה לך. באשר לילדים, יש להזהירם מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש.

אזהרות נוספות

הימנע מהתחממות יתר או מהתייבשות. הימנע מפעילות גופנית מאומצת מדי. במזג אוויר חם, הישאר במקום קריר אם ניתן. הימנע מחשיפה לשמש. אל תתלבש יתר על המידה ובבגדים עבים. עליך להרבות בשתיית מים.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

טבליות אריפירזול סנדוז מכילות לקטוז. אם נאמר לך על ידי הרופא שלך כי יש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים, צור קשר עם הרופא שלך לפני נטילת תכשיר רפואי זה (ראה גם פרק 6 "מידע נוסף").

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים:

סכיזופרניה ומחלה בי-פולרית: המינון המקובל למבוגרים הינו 15 מ"ג פעם ביום. אולם, הרופא עשוי לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד למקסימום של 30 מ"ג פעם ביום.

למתבגרים מגיל 15 ומעלה, בתחילת הטיפול אריפירזול סנדוז עשוי להינתן במינונים נמוכים יותר, עם עלייה הדרגתית עד למינון המקובל של 10 מ"ג פעם ביום. אולם, הרופא עשוי לרשום לך מינון נמוך יותר או גבוה יותר, עד למקסימום של 30 מ"ג פעם ביום.

טיפול משלים בדיכאון קליני: המינון ההתחלתי המקובל הינו 2.5 (ניתן להשתמש בתכשיר אחר המכיל אריפירזול להשגת מינון זה) עד 5 מ"ג ליום.

במידת הצורך, הרופא עשוי להעלות את המינון בהדרגה.

טיפול באי-שקט הקשור להפרעה האוטיסטית בילדים: המינון ההתחלתי המקובל הינו 2.5 מ"ג ליום (ניתן להשתמש בתכשיר אחר המכיל אריפירזול להשגת מינון זה). הרופא יעלה את המינון בהדרגה ל-5 עד 15 מ"ג ליום, בהתאם לתגובה האישיית לתרופה.

אם הינך חש שהשפעת התרופה חזקה מדי או חלשה מדי היוועץ ברופא או ברוקח.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לבלוע את התרופה עם מים. אין לכתוש/לחצות/ללעוס את הטבליה.

השתדל ליטול את התרופה בזמנים קבועים כל יום.

אם נטלת בטעות מינון גבוה מדי של אריפירזול סנדוז

תופעות הלוואי שדווחו בעת נטילת מנת יתר של אריפירזול כוללות: הקאות, ישנוניות ורעד.

תופעות לוואי נוספות שדווחו כללו: ריכוז חומצה גבוה בדם (אצידיזיס); תוקפנות; עלייה בריכוז האנזים אספרטאט אמינו טרנספראז (AST) בדם המעידה על נזק לשריר הלב או לכבד; פרפור פרוזדורים; דופק איטי (ברדיקרדיה); קומה, בלבול; פרקוסים; עלייה בריכוז האנזים קראטין פוספוקינאז (CPK) המעידה על נזק לשריר כולל שריר הלב; ירידה בהכרה; לחץ דם גבוה או נמוך.

רמת אשלגן נמוכה בדם (היפוקלמיה), הארכת מקטע QT, הארכת קומפלקס QRS, דלקת ריאות עקב שאיפה לא רצונית של מזון לקנה הנשימה, דום נשימה, פרקוסים חוזרים ללא חזרה למצב של הכרה ביניהם (סטטוס אפילפטיקוס).

אם נטלת מנת יתר או אם הינך חווה את אחד מהתסמינים שתוארו, או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, אין ליטול מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באריפירזול סנדוז עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אם אתה חווה אחת או יותר מתופעות הלוואי הבאות, הפסק ליטול אריפירזול סנדוז וספר לרופא שלך מיד:

- דיכאון חדש או החמרה; מחשבות אובדניות; ניסיון התאבדות; חרדה חדשה או החמרה בחרדה; חוסר מנוחה או עצבנות; הרגשת פאניקה; קשיי שינה; רגזנות; כעס; תוקפנות; התנהגות אימפולסיבית מסוכנת; פעלתנות ודיבור יתר (מניה); שינויים בהתנהגות.
- אירועים מוחיים, כולל שבץ.
- תסמונת נירולפטית ממאירה (Neuroleptic Malignant Syndrome – NMS), שתסמיניה הם: חום גבוה מעל 41°C, קשיון שרירים, שינוי במצב המנטלי, אי יציבות פיזיולוגית (דופק לא רגיל, עלייה בלחץ דם, דופק מהיר או קצב לב לא סדיר). סימנים נוספים: עלייה בקראטין פוספוקינאז (creatine phosphokinase – CPK) אנזים שרמתו בדם עולה ביחס ישיר לנזק בשריר, כולל בשריר הלב, מיוגלובין בשתן (Myoglobinuria) העלול להעיד על הרס שרירים (רבדומיוליזיס), אי ספיקת כליות חריפה.

- עלייה בסוכר בדם (היפרגליקמיה), סוכרת. התסמינים הבאים מעידים על רמת סוכר גבוהה בדם: הרגשת צימאון, צורך להטיל שתן בתכיפות רבה יותר מהרגיל, תחושת רעב חזקה, הרגשה של חולשה ועייפות, כאב בטן, בלבול, ריח פירותי בנשימה.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- חולשה; תשישות; חוסר אנרגיה.
- ירידה במשקל; אובדן תיאבון.
- עוויתות או תנועות בלתי רצוניות; צורך להיות בתנועה כל הזמן.
- הקאות; בחילות; תחושת אי-נוחות בקיבה; עצירות.
- סחרחורות, כאבי ראש; קשיי שינה, חרדה ותחושת אי-שקט; טשטוש ראייה.
- מחלות בדרכי הנשימה העליונות.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- דופק איטי, דופק מהיר (פלפיטציות).
- בצקת בגפיים, התנפחות של הידיים, הקרסוליים או הרגליים.
- כאבים בחזה.
- נפילות.
- עלייה באנזימי כבד בבדיקות דם.
- עלייה ברמות הסוכר (גלוקוז) בדם.
- עלייה בריכוז ההורמון לקטאט דהידרוגנאז; עלייה ברמות ההורמון גמא-גלואטאמיל טראנספפטידאז (GGT).
- חולשת שרירים; התכווצות שרירים; פרקינסוניזם; איבוד זיכרון; קשיון שרירים; איטיות בתנועה; אובדן חלקי או מלא של תנועת השריר; נוקשות שרירים; רעד; ירידה בתנועתיות; משבר עיני-סיבובי (oculogyric crisis).
- תוקפנות; איבוד החשק המיני; הזיות; אין אונות.
- גודש באף; קוצר נשימה.
- פריחה בעור; הזעת יתר; גרד; נשירת שיער; רגישות לאור.
- ירידה חדה בלחץ דם במעבר פתאומי ממצב שכיבה או ישיבה לעמידה (Orthostatic Hypotension) שיכולה לגרום לסחרחורת ולהתעלפות.
- ירידה או עלייה בלחץ הדם.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- תרומבוציטופניה (ירידה ברמת הטסיות בדם).
- רפרוף עליות (atrial flutter); דום נשימתי; חסם עלייתי-חדרי; פרפור פרודודורים (atrial fibrillation); תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס); זרימת דם לא מספקת לשריר הלב (איסכמיה של שריר הלב); התקף לב; כשל לבבי.
- ראייה כפולה.
- ריפלוקס קיבתי ושטי.
- בצקת בפנים; סרפדת.
- דלקת כבד; צהבת.
- רגישות יתר של המערכת החיסונית.
- מכת חום (heat stroke).
- עלייה ברמות פרולקטין, אוריאה, בילירובין או קריאטינין בדם; הארכת מקטע QT; עלייה ברמת המוגלובין מסוכרר (A1C).
- רמת אשלגן נמוכה בדם (היפוקלמיה); רמת נתרן נמוכה בדם (היפונתרמיה).
- פירוק תאי שריר (רבדומיליזיס); ירידה בכושר התנועה (אקינזיה); ספאזם בשריר הנמשך שבריר שניה וגורם לתנועה בלתי רצונית חדה, קצרה ופתאומית מאוד (מיוקלונוס); פגיעה בקואורדינציה (תיאום עצב שריר); הפרעות דיבור; פרכוסים.

- עלייה בחשק המיני; אי-יכולת להגיע לאורגזמה.
- טיקים; מחשבות אובדניות; חוסר תגובה לסביבה (קטטוניה); הליכה מתוך שינה.
- אצירת שתן; השתנה לילית.
- הגדלת שדיים בגברים; אי-סדירות בווסת; היעדר או הפסקה של הווסת, כאבים בשדיים; זקפה ממושכת.
- **תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):**
- עלייה ברמת השומנים בדם (דיסליפידמיה); עלייה במשקל.
- חוסר שליטה בדחפים כאשר נוטלים אריפיפרזול, ביחוד הימור כפייתי.
- שינויים ברמה של תאי דם מסוימים (לויקופניה – מספר נמוך של תאי דם לבנים, נוטרופניה – מספר נמוך של נוטרופילים).
- פרכוסים.
- פגיעה בכושר השיפוט; ביכולת המנטלית או בכישורים המוטורים; תשישות וחוסר יכולת לתקשר.
- קושי בוויסות טמפרטורת הגוף או התחממות יתר.
- קושי בבליעה; שאיפה לא רצונית של מזון לדרכי הנשימה עם סיכון לדלקת ריאות.

במטופלים קשישים עם דמנציה דווחו יותר מקרי מוות בזמן הטיפול בתרופה. בנוסף דווח על מקרים של שבץ או "מיני" שבץ.

תופעות לוואי נוספות בילדים ובמתבגרים

רוב תופעות הלוואי שנצפו בילדים בגילאי 6-18, נצפו גם במבוגרים.

תופעות לוואי שכיחות – עלייה ברמת אינסולין בדם; הרטבה (בעיקר לילית); נמנום; כאבי ראש; הקאות; עייפות; עלייה או ירידה בתיאבון; ריור יתר ועלייה בהפרשת רוק; נדודי שינה; בחילה; גודש באף; הצטננות; עלייה במשקל; עוויתות ותנועות לא רצונית; אי-שקט; רעד; נוקשות שרירים.

תופעות לוואי לא שכיחות – יובש בפה, התכווצות בלתי רצונית של הלשון (ספאזם של הלשון); קיבעון עיני שיכול להתרחש במשך דקות או שעות, בו העיניים מקובעות לצדדים או כלפי מעלה; דיבור בשינה; שיעור יתר.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "[דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי](https://sideeffects.health.gov.il)" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון: אין לאחסן מעל ל- 30°C.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

אריפיפרזול סנדוז 5:

lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; indigo carmine (E132) aluminium lake.

כל טבליה של אריפירזול סנדוז 5 מכילה 71.02 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפירזול סנדוז 10:

lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).

כל טבליה של אריפירזול סנדוז 10 מכילה 65.97 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפירזול סנדוז 15:

lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide yellow (E172).

כל טבליה של אריפירזול סנדוז 15 מכילה 97.75 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

אריפירזול סנדוז 30:

lactose monohydrate; maize starch; microcrystalline cellulose; magnesium stearate; hydroxypropyl cellulose; iron oxide red (E172).

כל טבליה של אריפירזול סנדוז 30 מכילה 196.50 מ"ג לקטוז מונוהידראט.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

אריפירזול סנדוז ארוז בתוך מגשיות (בליסטרים) אשר מוכנסות לתוך אריזת קרטון. בכל אריזה יש 30 טבליות.

טבליות **אריפירזול סנדוז 5** הינן עגולות וצבען כחול, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "444".
טבליות **אריפירזול סנדוז 10** הינן עגולות וצבען ורוד, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "446".
טבליות **אריפירזול סנדוז 15** הינן עגולות וצבען צהוב, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "447".
טבליות **אריפירזול סנדוז 30** הינן עגולות וצבען ורוד, על צידן האחד מצוין "SZ" ועל צידן השני "449".

שם בעל הרישום והיבואן וכתובתו: נוברטיס ישראל בע"מ, ת.ד. 7126, תל אביב.

נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר הרישום של התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

אריפירזול סנדוז 5: 162-95-35898-00/01

אריפירזול סנדוז 10: 162-96-35899-00/01

אריפירזול סנדוז 15: 162-97-35911-00/01

אריפירזול סנדוז 30: 162-99-35971-00/01

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.