

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالة (مستحضرات) - 1986**  
يُسَوَّق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

پریجابالین تارو 75 ملغ  
پریجابالین تارو 100 ملغ  
پریجابالین تارو 150 ملغ  
پریجابالین تارو 200 ملغ  
پریجابالین تارو 225 ملغ  
پریجابالین تارو 300 ملغ  
کبسولات

**المادة الفعالة**

پریجابالین 75، 100، 150، 200، 225، 300 ملغ  
pregabalin 75, 100, 150, 200, 225, 300 mg

المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.  
هذا الدواء وصف لعلاجك. لا تعطه للآخرين؛ لأنه قد يضر بهم، حتى لو بدا لك تشابه بين حالتك وحالتهم الصحية.

هذا الدواء ليس معداً لعلاج الأطفال والمراهقين تحت سن 18 عاماً.

**1. لم أعد هذا الدواء؟**

لمعالجة ألم الاعتلال العصبي (عصبي) لدى الكبار، لمعالجة الألم العضلي الليفي (ألم عضلي ليفي – fibromyalgia) ولمعالجة اضطراب القلق المعمم لدى البالغين.

المجموعة العلاجية: نظير للحمض جاما أمينوبوتيريك (gamma-aminobutyric acid).

**2. قبل استعمال الدواء**

يُمنع استعمال المستحضر إذا:

- كنت حساساً (أرجي) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6).

**تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء**

توجه إلى الطبيب قبل تناول پریجابالین تارو

- لقد بلغ بعض المرضى الذين يتناولون پریجابالین تارو عن أعراض تحسسية. تشمل هذه الأعراض انتفاخ في الوجه، في الشفتين، في اللسان وفي البلعوم وكذلك طفح جلدي منتشر. إذا شعرت بواحد أو أكثر من هذه الأعراض، يجب عليك التوجه فوراً إلى الطبيب.
- لقد بلغ عن حالات لطفح جلدي خطير، مثل متلازمة ستيفنز جونسون وتقرُّش الأنسجة المُتموتة البشرويَّة التسممي، في سياق استعمال پریجابالین-تارو. يجب التوقف عن استعمال الدواء والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا عايشت واحداً أو أكثر من الأعراض المرتبطة بالأعراض الجلدية الخطيرة الموصوفة في الفصل 4.
- قد يُسبب الدواء دواراً ونعاساً، بحيث يكون المرضى الكبار الذين يتناولون المستحضر معرضين لخطورة أكبر للسقوط وللإصابات. يجب الاستعمال بحذر إلى أن تعتاد على تأثير الدواء عليك.

- قد يُسبب الدواء تشوش أو فقدان الرؤية أو تغييرات أخرى في الرؤية، التي يزول أغلبها – يجب إبلاغ الطبيب فوراً عن أي تغيير يطرأ على الرؤية.
- لدى بعض مرضى السكري، الذين يزداد وزنهم نتيجة العلاج بالمستحضر، من الجائز أن يحتاج الأمر إلى ملاءمة الجرعة الدوائية للأدوية الخافضة لمستوى السكر في الدم.
- أعراض جانبية معينة مثل النعاس، يمكن أن تكون أكثر شيوعاً، لأنّ المرضى الذين يعانون من إصابة بالعمود الفقري من الممكن أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ بريجابالين تارو ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوية.
- لقد بلغ لدى بعض المرضى الذين تناولوا الدواء عن حدوث قصور قلبي، خاصة لدى المسنين الذين يعانون من أمراض في القلب والأوعية الدموية. **قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كانت لديك سابقة لأمراض القلب.**
- هنالك عدّة تقارير عن حدوث قصور كلوي كنتيجة للعلاج بالدواء. إذا كنت تلاحظ أثناء العلاج بالدواء بقلّة التبول، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك، لأنّ من شأن التوقف عن العلاج بالدواء أن يؤدي إلى تحسّن.
- لقد بلغ لدى بعض المرضى، الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع، مثل بريجابالين تارو، عن أفكار لإيذاء النفس أو أفكار انتحارية أو أظهروا سلوكاً انتحارياً. في حال ظهور أفكار أو سلوك من هذا النوع في أي مرحلة، يجب التوجه حالاً إلى الطبيب.
- إن دمج بريجابالين تارو مع أدوية أخرى (مثل أنواع معينة لمسكنات الألم) التي من شأنها أن تُسبب الإمساك، قد يؤدي لمشاكل في الجهاز الهضمي (مثل إمساك، انسداد أو شلل الأمعاء). يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني من إمساك، خاصة إذا كان لديك ميل للإمساك.
- قبل بدء استعمال الدواء، يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من التعلق أو الإدمان على المشروبات الروحية، المخدرات أو لأية أدوية، في هذه الحالة من الجائز أن يكون لديك احتمال أكبر لتطوير تعلق بـ بريجابالين تارو.
- قد تظهر تشنجات خلال استعمال الدواء أو فوراً بعد إيقافه – يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا كنت تعاني من تشنجات.
- لقد بلغ لدى عدد من المرضى الذين لديهم أمراض إضافية أساسية عن انخفاض في الأداء الوظيفي الدماغي (encephalopathy). يجب إبلاغ الطبيب إذا كان معروف عن حالة طبية لها أبعاد ملحوظة، بما في ذلك أمراض الكبد أو الكلى.
- هناك تبليغات عن صعوبات في التنفس. إذا كانت لديك اضطرابات في جهاز الأعصاب، اضطرابات في التنفس، اعتلال في الكلى أو إذا كان عمرك أكثر من 65 عاماً، فقد يصف لك الطبيب نظام جرعات آخر. استشر الطبيب إذا كانت لديك صعوبة في التنفس أو إذا كان تنفسك سطحياً.

### التعلّق

- قد يطور بعض الأشخاص تعلقاً بـ بريجابالين تارو (حاجة إلى الاستمرار في تناول الدواء). قد تتطور لديهم أعراض الانسحاب عند التوقف عن استعمال بريجابالين تارو (انظر الفصل 3 "كيف تستعمل الدواء؟" والبند "إذا توقفت عن تناول الدواء"). إذا كان هناك خوف من أنك قد تطوّر تعلقاً بـ بريجابالين تارو، من المهم أن تستشير الطبيب.
- إذا لاحظت أيّاً من العلامات التالية أثناء تناولك بريجابالين تارو، فقد تكون هذه علامة على أنه تطوّر لديك تعلق:
- تحتاج إلى تناول الدواء لفترة أطول من الوقت الذي تم وصفه لك
  - تشعر أنك بحاجة إلى تناول أكثر من الجرعة الموصوفة لك
  - تستعمل الدواء لأسباب غير تلك التي وُصف لك من أجلها
  - قمت بمحاولات متكررة وغير ناجحة للتوقف عن استعمال الدواء أو التحكم في استعماله
  - عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بتوعك، وتشعر بتحسّن بعد تناول الدواء مرة أخرى
- إذا لاحظت أيّاً من هذه العلامات، توجه إلى الطبيب واستشره بخصوص العلاج الأفضل من أجلك، بما في ذلك متى تتوقف عن تناول الدواء وكيفية القيام بذلك بأمان.

### ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكملات الغذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص إذا كنت تتناول:

- قد يكون لبريجابالين تارو ولأدوية معينة أخرى تأثيرات متبادلة على الفعالية. في حال تمّ تناول بريجابالين تارو بالتزامن مع أدوية معينة ذات تأثيرات مهدئة (مثل الأفيونيات)، من الممكن أن يزيد من هذه التأثيرات وأن يؤدي إلى قشل تنفسي، إلى سبات (غيبوبة) ووفاة. شدة الدوار، النعاس، وانخفاض في التركيز يمكنها أن تتراد في حال تمّ تناول بريجابالين تارو بشكل متزامن مع:
- أوكسيكودون – دواء لتسكين الألم.
  - لورازپام – دواء لعلاج الاكتئاب.
  - كحول.

يمكن تناول بريجابالين تارو مع حبوب منع الحمل.

### استعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء بدون علاقة بوجبات الطعام.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

يُمنع استهلاك الكحول خلال فترة العلاج بالدواء.

### الحمل، الإرضاع والخصوبة

يُمنع استعمال بريجابالين تارو خلال الحمل أو في فترة الإرضاع، إلا بتعليمات من الطبيب وبعد استشارته. قد يسبب استعمال بريجابالين خلال أول 3 أشهر من الحمل تشوهات خلقية لدى الجنين، والتي تستدعي العلاج الطبي. في إطار بحث قام باستعراض معطيات أخذت من نساء من الدول الشمالية، ممن تناولن بريجابالين خلال أول 3 أشهر من الحمل، 6 أطفال من كل 100 عانوا من مثل هذه التشوهات الخلقية. هذا بالمقارنة مع 4 أطفال من بين كل 100 طفل ولدوا لنساء لم يتم علاجهن بواسطة بريجابالين في إطار البحث. تم الإبلاغ حالات استثنائية في الوجه (شقوق في الوجه والفم)، في العينين، في الجهاز العصبي (وبضمن ذلك الدماغ)، في الكلى وفي الأعضاء التناسلية.

يتوجب على النساء اللواتي من الممكن أن يحملن أثناء العلاج بالدواء، استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل. إذا كنت حاملاً أو مرضعة، إذا كان هناك شك بأنك حامل أو إذا كنت تخططين للحمل، يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال الدواء.

### السياقة واستعمال الماكينات

يُمنع السياقة أو تشغيل الماكينات الخطرة إلى أن تعرف كيفية تأثير الدواء عليك، لأن استعمال هذا الدواء قد يؤدي إلى دوار، نعاس، أو تناقص التركيز.

### معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي المستحضر على لاكتوز مونوهيدرات. إذا أخبرك الطبيب في الماضي أنك تعاني من عدم قدرة تحمّل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب فقط.

### يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب بلع الكبسولة كاملة. يُمنع فتح وتوزيع محتوى الكبسولة، نظرًا إلى أنّ طريقة إعطاء الدواء بهذه الصورة لم تُفحص. يجب بلع الدواء مع ماء.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك. من الممكن أن تشعر بالنعاس، بالارتباك، بالقلق أو انعدام الشعور بالراحة نتيجة تناول جرعة مفرطة من بريجابالين تارو. كذلك، تمّ التبليغ أيضًا عن حالات تشنجات (اختلاجات) وفقدان الوعي (سبات).

### إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب

من المهم تناول الدواء في كل يوم في ساعة محددة. إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، يُمنع تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

يجب الاستمرار في تناول الدواء حسب توصية الطبيب.

## إذا توقفت عن تناول الدواء

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب. إذا تم اتخاذ القرار بإيقاف العلاج، سيشرح لك الطبيب كيفية القيام بذلك. يجب أن يكون التوقف عن العلاج بالدواء تدريجياً، خلال فترة أسبوع على الأقل.

بعد إيقاف العلاج بالدواء (إن كان هذا علاجاً للمدى القصير أو للمدى الطويل)، من الجائز أن تعابش أعراضاً معينة تُسمى أعراض الانسحاب، التي تشمل: أرق، صداع، حالات غثيان، قلق، إسهال، أعراض تشبه الإنفلونزا، تشنجات، عصبية، اكتئاب، آلام، تعرق وحالات دوام. من شأن تلك الأعراض أن تكون أكثر شيوعاً وخطورة، كلما تم تناول الدواء خلال فترة أطول. إذا عايشت أعراض الانسحاب، يجب التوجه إلى الطبيب.

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من المصق على الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.**  
إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

## 4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال بيريجابالين تارو أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تندهب عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من المحتمل ألا تعاني من أيٍّ منها.

يجب مراجعة الطبيب حالاً إذا عانيت من انتفاخ في الوجه أو في اللسان أو من رد فعل جلدي خطير (الجلد يحمر ويكتسي بحويصلات أو يتقشر).

أعراض جانبية شائعة جداً: تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 أشخاص

- حالات دوام، الشعور بنعاس، صداع.

أعراض جانبية شائعة: تظهر لدى حتى 1 من بين 10 أشخاص

- شهية زائدة للطعام.
- الشعور بنشوة، ارتباك، توهان، انخفاض الرغبة الجنسية، عصبية.
- اضطراب في التركيز أو في الذاكرة، فقدان الذاكرة، ثقل في الحركة، رجفان، اضطرابات في النطق، شعور بالوخز، نقص/خدر في الإحساس، تخدير، سبات، أرق، إرهاق، شعور غريب.
- تشوش الرؤية، رؤية مزدوجة.
- دوام، اضطرابات في التوازن، سقوطات.
- جفاف الفم، إمساك، تقيؤات، غازات، إسهال، حالات غثيان، انتفاخ البطن.
- مشاكل في انتصاب القضيب الذكري.
- انتفاخ الجسم، يشمل الأطراف.
- شعور بالثمل، أسلوب مشي غير عادي.
- زيادة في الوزن.
- تقلصات عضلية، ألم في المفاصل، آلام في الظهر والأطراف.
- ألم في الحنجرة.

أعراض جانبية غير شائعة: تظهر لدى حتى 1 من بين 100 شخص

- فقدان الشهية للطعام، فقدان الوزن، انخفاض مستوى السكر في الدم، ارتفاع مستوى السكر في الدم.
- تغيير النظرة إلى الذات، عدم هدوء، اكتئاب، قلق، تقلبات في المزاج، صعوبة إيجاد الكلمات، هلوسات، أحلام غريبة، نوبات من الهلع، لا ميلالة، عدوانية، مزاج مرهف، اضطراب نفسي، صعوبة في التفكير، زيادة في الرغبة الجنسية، مشاكل في الأداء الوظيفي الجنسي، بما في ذلك عدم القدرة على بلوغ إشباع جنسي، تأخر القذف.
- تغييرات في الرؤية بما في ذلك فقدان الرؤية المحيطية، تخرج العينين، ومضات من الضوء، حركات متفجرة، تناقص بردود الفعل المنعكسة، نشاط، دوام عند الوقوف، حساسية جلدية، فقدان المذاق، الشعور بحرقة، رجفان أثناء الحركة، تدني مستوى الوعي، فقدان الوعي، إغماء، زيادة الحساسية للضحيج، الشعور بوعكة.
- جفاف العينين، انتفاخ أو ألم في العين، ضعف العينين، تدمع العينين، تهيج العين.
- اضطرابات في نظم القلب، زيادة نظم القلب، ضغط الدم منخفض أو مرتفع، تغيرات في النبض، قصور قلبي.

- تورّد، هبّات من الحر.
- صعوبة التنفس، جفاف الأنف، احتقان الأنف.
- زيادة إنتاج اللعاب، حرقان، خدر من حول الفم.
- تعرّق، طفح، قشعريرة، سخونة.
- تشنّجات عضليّة، انتفاخ المفاصل، تصلب العضلات، ألم يشمل ألم عضليّ، ألم في العنق.
- ألم في الثديين.
- صعوبة أو ألم أثناء التبوّل، سلس بوليّ.
- ضعف، عطش، ضغط في الصدر.
- تغيرات في فحوصات الدم ووظائف الكبد (ارتفاع في فسفوكيناز الكرياتين في الدم، ارتفاع إنزيمات الكبد، انخفاض الصفائح الدموية، قلة العدلات، ارتفاع في الكرياتينين في الدم، انخفاض البوتاسيوم في الدم).
- حساسية مفرطة، انتفاخ الوجه، حكة، شرى، زكام، رعاف، سعال، شخير.
- آلام الدورة الشهرية.
- برودة كفوف اليدين والرجلين.

#### أعراض جانبية نادرة: تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 شخص

- حاسة الشم غير عادية، تقلبات في الرؤية، تغير في إدراك العمق، وضوح بصريّ، فقدان الرؤية.
- توسّع الحدقتين، حول.
- تعرق بارد، تهيج في الحنجرة، انتفاخ اللسان.
- التهاب البنكرياس.
- صعوبة البلع.
- تباطؤ أو تناقص حركات الجسم.
- صعوبة في الكتابة.
- وذمات في منطقة البطن.
- سوائل في الرئتين.
- تشنّجات.
- تغييرات في التخطيط الكهربائيّ للقلب التي توافق اضطرابات نظم القلب.
- تضرر العضل.
- إفراز من الثديين، تضخم غير عادي للثديين، تضخم الثديين لدى الرجال.
- اضطرابات في الدورة الشهرية.
- قصور كلويّ، انخفاض حجم البول، احتباس البول.
- انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء في فحوصات الدم.
- سلوك غير عادي، سلوك انتحاري، أفكار انتحارية.
- ردود فعل تحسّية (يمكن أن تتجلى بصعوبات في التنفس، التهاب العينين [التهاب القرنية] ورد فعل جلديّ خطير الذي يتميز ببقع مدوّرة، محمّرة، غير بارزة في منطقة الجذع، والتي تترافق أحيانًا بظهور حويصلات في مركزها، تقشر للجلد، تقرحات في الفم، في الحنجرة، في الأنف، في الأعضاء التناسلية والعيّنين. يمكن أن يكون لهذه الأعراض الجلدية الخطيرة أعراض أولية، مثل سخونة وأعراض تشبه الإنفلونزا (متلازمة ستيفنز جونسون، تقشّر الأنسجة المُتموّتة البشريّة التسممي).
- يرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).
- الباركنسونية، أي أعراض تشبه مرض الباركنسون (الشلل الرعاش)، مثل الرعشة، بطء الحركة (تراجع القدرة على الحركة) والتصلّب (تصلّب العضلات).

#### أعراض جانبية نادرة جدًا: ممكن أن تظهر لدى حتى 1 من بين 10,000 شخص

- قصور كبدّي.
- التهاب كبد (Hepatitis).

#### أعراض جانبية شيعها غير معروف:

- تطوّر تعلق بـ بريجابالين تارو

بعد التوقف عن العلاج بـ بريجابالين تارو (سواء كان علاجًا للمدى القصير أو للمدى الطويل) قد تعایش أعراضًا معينة تسمى أعراض الانسحاب (انظر الفصل 3 "إذا توقفت عن تناول الدواء").

أعراض جانبية معينة، مثل النعاس، يمكن أن تكون أكثر شيوعًا، لأن المرضى الذين يعانون من إصابة في العمود الفقري من المحتمل أن يتناولوا أدوية إضافية لعلاج الألم والتشنجات، التي تتصف بأعراض جانبية مشابهة لتلك الخاصة بـ بريجابالين تارو ويمكن أن تزداد خطورتها عند تناولها سوية.

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية بعد تسويق الدواء: صعوبة في التنفس وتنفس سطحي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يحولك إلى استمارة خاصة معدة للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسّم. لا تسبّب التقبيل بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير في نفس الشهر.
- يجب الحفظ بدرجة حرارة تحت الـ 25°C.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا:

Capsule shell (gelatin, titanium dioxide), talc, lactose monohydrate, maize starch, imprinting ink (black iron oxide, shellac, propylene glycol, potassium hydroxide).

كبسولات بريجابالين تارو 75 ملغ، 100 ملغ، 200 ملغ، 225 ملغ و- 300 ملغ تحتوي أيضًا على:

Red iron oxide

كبسولات بريجابالين تارو 200 ملغ و- 225 ملغ تحتوي أيضًا على:

Yellow iron oxide

## كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

بريجابالين تارو 75 ملغ: كبسولة ذات جسم بلون أبيض وغطاء بلون بني - أحمر. الرقم "75" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

بريجابالين تارو 100 ملغ: كبسولة ذات جسم بلون بني - أحمر وغطاء بلون بني - أحمر. الرقم "100" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

بريجابالين تارو 150 ملغ: كبسولة ذات جسم أبيض وغطاء أبيض. الرقم "150" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

بريجابالين تارو 200 ملغ: كبسولة ذات جسم بلون زهري - برتقالي وغطاء بلون زهري - برتقالي. الرقم "200" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

بريجابالين تارو 225 ملغ: كبسولة ذات جسم أبيض وغطاء بلون زهري - برتقالي. الرقم "225" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

بريجابالين تارو 300 ملغ: كبسولة ذات جسم أبيض وغطاء بلون بني - أحمر. الرقم "300" مطبوع باللون الأسود على جسم الكبسولة.

يتوفر الدواء في عبوات ذات 14، 28، 56 كبسولة.

قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم المنتج وعنوانه: Sofarimex – Industria Quimica e Farmaceutica, S.A, Cacem, Portugal

صاحب التسجيل وعنوانه: تارو إنترناشيونال م.ض., شارع هكيتور 14، خليج حيفا 2624761.

تم تحريرها في تشرين الثاني 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجلّ الأدوية الرسميّ في وزارة الصحة:

پريچابالين تارو 75 ملغ: 158-25-34763-00

پريچابالين تارو 100 ملغ: 158-26-34762-00

پريچابالين تارو 150 ملغ: 158-27-34761-00

پريچابالين تارو 200 ملغ: 158-28-34760-00

پريچابالين تارو 225 ملغ: 158-29-34759-00

پريچابالين تارو 300 ملغ: 158-30-34740-00

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النصّ بصيغة المذكّر. مع هذا فالدواء معدّ لكلا الجنسين.