

## فير أپريس SR 240،

حسبولات ذات إطلاق مستديم  
كل حبيسة تحتوي على:  
فير اياهيل هيدروكلوريد  
(Verapamil hydrochloride) 240 ملغ.

المواد غير الفعالة والمستنجات في  
الدواء - انظر للبلند 6 "معلومات إضافية"  
وللبلند 2 "معلومات مهمة عن جزء من

أقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن  
تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على  
معلومات مخصصة عن الدواء. إذا كانت  
لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو  
إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لك. لا تعطله إلى آخرين.  
فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بد لك  
أن وضعهم مفيض مماثل.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج فرط ضغط الدم المعتدل حتى  
المتوسط. لعلاج ومنع النذبة الصدرية  
(angina pectoris).  
الفصيلة العلاجية: حاصر قنوات الكالسيوم.  
حاصرات قنوات الكالسيوم تغير كمية  
الكالسيوم التي تدخل لخلايا العضل  
بالقلب والأوعية الدموية. هذا من شأنه أن  
يغير القوة والسرعة التي يبق بها القلب.  
كذلك يوسع الأوعية الدموية مما يمكن الدم  
من التدفق بالجسم بسهولة أكبر. هذا يساعد  
في وصول كمية أكبر من الأوكسجين  
لعضل القلب ويستطيع خفض ضغط الدم.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجحي) للمادة الفعالة  
(فير اياهيل هيدروكلوريد) أو لأي  
واحد من المركبات الإضافية التي  
يحتوي عليها الدواء (انظر للبلند 6).
- كنت تعاني من صدمة قلبية  
(cardiogenic shock) - انخفاض  
خاطر يتدفق الدم)
- عانيت مؤخراً من نوبة قلبية مع  
حدوث مضاعفة من نبض بطيء
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض جداً  
أو من قصور في الطين الأيسر

- كنت لا تحمل ناظمة قلبية فعلة وكنت  
تعاني من إحصار في نظام التوصيل  
الكهربائي للقلب من الدرجة الثانية أو  
الثالثة أو من متلازمة العُقدة الجيبية  
المرضية (sick sinus syndrome)
- كنت تعاني من إحصار جيبية أدنيي  
(sino-atrial block)
- كنت تعاني من قصور القلب
- كنت تعاني من نبض بطيء (دون  
ال 50- دقة في الدقيقة)
- كنت تعاني من ضغط دم منخفض
- (القيمة العليا الانقباضي) أقل من  
90 ملم زربيق
- كنت تعاني من فرقة أو رجفان أدنيي  
المتراقف بمرر إضافي للتوصيل  
الكهربائي (على سبيل المثال:  
متلازمة وولف-باركسون-وايت)
- كنت تتناول إيفاردين (لمشاكل القلب)

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

### قبل العلاج بفير أپريس SR 240، أخبر

الطبيب إذا:

- كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.
- كان لديك نبض بطيء بشكل شاذ أو  
نبض غير منتظم.
- عانيت مؤخراً من نوبة قلبية.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في  
الكلى.
- كنت تعاني من عانيت في السابق من  
مشاكل قلب.
- كنت تعاني من مرض يكون به ضرر  
بالتوصيل الكهربائي من العصب إلى  
العصل مثل الوهن العصليّ الأوبيل،  
متلازمة لامبرت-إيتون، حثل عضلي  
منعدم من نمط دوشين.

### تفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تأخذُ أو إذا أخذت في الأونة  
الأخيرة، نوبة أخرى بما في ذلك أدوية  
بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية،  
أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. على وجه  
الخصوص إذا كنت تأخذ:
- حاصرات بيتا لعلاج ضغط الدم  
المرتفع وأمراض القلب (مثل أتينولول،  
پروپرانولول، ميتوبرولول)
- حاصرات ألفا لعلاج ضغط الدم  
المرتفع وأمراض القلب (مثل  
پرازوسين، تيرازوسين)

- مدرات البول
- أدوية المعروفة بالسيتاينات مثل  
أتورفاستاتين، فلوفاستاتين، سيمفاستاتين،  
المستعملة لخفض مستويات الكوليسترول
- أي دواء آخر لعلاج ضغط الدم المرتفع
- والنبيض الغير منتظم (اضطراب النظم)  
مثل كورينديين، فيلكاينيد، ديسوباميريد،  
ديجوكسين، ديجيتوكسين
- دايلاجاتران (دواء لمنع تكون جلطات  
دموية)
- أدوية تحتوي على إيفاردين لعلاج  
أمراض قلب معينة (انظر أيضاً للبلند 2  
"لا يجوز استعمال الدواء إذا")
- أدوية لعلاج الاكتئاب (تشمّل المستحضر  
النبتاني St. John's wort). القلق  
أو الدهان، هذه من الممكن أن تشمّل  
إمبيبرامين، بوسپيرون، ليفيثوم،  
أدوية المعروفة بمشيطات جهاز المناعة  
مثل سيكلوسبورين، سيروليموس،  
أيفروليموس، تاكلوليموس. تستعمل  
لمنع رفض الأعضاء المزروعة
- جلينيكلاميد وميتوفايمين، يستعملان  
لعلاج أنواع معينة من السكري
- أسبيرين، مسكن للآلام الذي هو مضاد  
للاتهاب غير ستيرويدي (NSAID)  
الذي يستعمل لتسكين الآلام وخفض  
الحرارة
- الموتيبريتان، يستعمل لعلاج الشقيقة
- ميدازولام، يستعمل كمادة مهدئة أو  
منومة
- ثيوفيلين، يستعمل لعلاج الربو
- دوكوسوروبيسين، دواء لعلاج السرطان
- هيسميديين، يستعمل لعلاج صعوبات  
الهضم أو القرحات في المعدة
- ريفامپيسين، يستعمل لعلاج السل
- وأنواع أخرى من العدوى
- كاربامازيبين، فينيتوين أو فينوباربيتال  
(فينوباربيتال). هذه الأدوية تستعمل  
كمضادات للاختلاجات

• ريتونايفير، يستعمل لعلاج فيروس  
العوز المناعي البشري (HIV)- ابريتروميسين، كلاريثروميسين،  
تيليثروميسين، تستعمل لعلاج أنواع  
معينة من العدوى
- كوليستيبول أو سولفينيازولون، يستعملان  
لعلاج القرص

أخبر طبيب الجراحة أو طبيب الأسنان  
إنك تتناول فير أپريس SR 240 إذا كان  
مُخصص لأطفال.

### طريقة تناول:

يجب بلع الدواء مع كأس من الماء، مع الوجبة.  
بالإمكان شطر الحبيسة. في حال شطر  
الحبيسة، يجب نصف الحبيسة الغير  
مخصص للاستعمال الفوري.  
ممنوع مضغ/ سحق الحبيسة لأن هذا الدواء  
هو ذو إطلاق مستديم.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أكبر  
إذا أفرطت في تناول الجرعة أو إذا بلع طفل  
من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى  
الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى  
وأخضر عبوة الدواء معك.

### استعمال الدواء واستهلاك الكحول

فير أپريس SR 240 يطيل الوقت الذي  
يتطلبه جسمك لتفكيك الكحول. معنى ذلك  
أن كمية قليلة من الكحول تزيد من مستوى  
الكحول في الدم فوق المستوى المسموح به  
للسيافة. بالإضافة لذلك، يستغرق وقتاً أكثر  
حتى تفيق من سكرك.

### الحمل، الإرضاع والخصوية

إذا كنت حاملاً، تخططين للذول في الحمل  
أو مرضعة، استشيري طبيبك.

### السيافة واستعمال الآلات

لا يجوز للسيافة، تشغيل الآلات أو القيام  
بأي نشاط الذي يستوجب اليقظة حتى تعلم  
كيف يؤثر الدواء عليك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من  
المصق والجرعة على كل مرة تتناول فيها  
دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة  
لها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال  
الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال  
فير أپريس SR 240 أعراضاً جانبية لدى جزء  
من المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة  
الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من  
أي واحد منها.

### 3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب دائماً استعمال الدواء وفقاً لتعليمات  
الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو  
الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص  
الجرعة وطريقة العلاج بالدواء. الجرعة  
وطريقة العلاج تحددان من قبل الطبيب فقط  
ولا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

فحقان (إدراك لدقات القلب)، ألم في الصدر  
الذي يظهر لأول مرة أو ألم في الصدر

- الذي يظهر في أحيان أكثر تواتراً، انتفاخ  
بالكاحلين، شعور بالسخونة وآلم في الديدن  
أو في القدمين.
- انتفاخ بالأطراف
- صغير في التنفس، صعوبات تنفس، انتفاخ  
في الفم، الشفتين أو اللسان أو وخيم في حال  
الجدد التي تظهر بشكل غير متوقع

العرض الجانبية الأكثر شيوعاً هو الإسك.  
أعراض جانبية إضافية تشمّل: نبض غير  
منتظم، احمرار الوجه أو الرقبة، آلام رأس،  
غثبان أو تقيؤ، ألم أو الشعور بعدم الراحة  
في البطن، دوخة، دوام (vertigo)، رنين في  
الأذنين (طنين)، تعب، ارتجاف، اضطرابات  
في الحركة، ضعف عضلات، آلام في المفاصل  
وألم في العضلات، طفح أو حكة في الجلد،  
شعور بالسهج في الجلد، خدر، تساقط شعر. من  
الممكن أن تحدث عتاة (ضعف جنسي) لدى  
الرجال بشكل نادر.

أعراض جانبية إضافية من الممكن أن تظهر  
عند تناول فير أپريس SR 240 لفترة زمنية  
طويلة. أعلم الطبيب عند ظهور انتفاخ في اللثة  
الذي يبدأ بالانتشار على سطح الأسنان، انتفاخ  
في اللثتين (لدى الرجال)، إنتاج حليب (رجالاً  
ونساءً)، هذه الأعراض نادرة وتنتفي عن  
إيقاف العلاج.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى  
الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض  
جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة  
الطبيب.

إذا قمت بالتوقف عن تناول الدواء قد يحدث  
تدهور في وظائفك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من  
المصق والجرعة على كل مرة تتناول فيها  
دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة  
لها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال  
الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما في أي دواء، قد يسبب استعمال  
فير أپريس SR 240 أعراضاً جانبية لدى جزء  
من المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة  
الأعراض الجانبية. من الممكن أن لا تعاني من  
أي واحد منها.

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسلم! يجب حفظ هذا الدواء وكل  
دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول  
أيدي الأطفال وأول الرضع ومجال نظرم  
وبذلك تمنع التسلم. لا تسبب التقيؤ دون أمر  
صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء  
الصلاحيه (تاريخ انتهاء) الذي يظهر

على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحيه يرجع  
إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

- شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25  
درجة مئوية. يجب تخزين الحبسولات في  
عبوة شريط الحبسولات (blister) الأصلية  
لأن المستحضر حساس للرطوبة. في حال  
شطر الحبيسة، يجب رمي نصف الحبيسة  
الغير مخصص للاستعمال الفوري.
- لا يجوز رمي الأدوية في مياه الصرف  
الصحي أو في سلة القمامة البيئية. أسأل  
الصيدلي عن كيفية رمي الأدوية التي ليست  
قيد الاستعمال. هذه الوسائل تساعد في حماية  
البيئة.

### 6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً  
على:  
Sodium alginate, microcrystalline  
cellulose, povidone, hypromellose,  
titanium dioxide (E171), silica colloidal  
anhydrous, magnesium stearate,  
macrogol, quinolone yellow aluminum  
lake (E104), indigo carmine aluminum  
lake (E132), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:  
حبيسة بلون أخضر فاتح مع خط شطر بكتنا  
الجيتين.

أحجام العبوة المصاحبة عليها: 10, 30 حبسولات.  
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مسوقة.  
تم التفتيح في أيلول 2022 بموجب تعليمات  
ورقة الصحة

رغم تسجيل الدواء في سجل الأدوية  
الحكومي في وزارة الصحة:  
068-63-26427-00

التنسيب وتسهيل القراءة. تمت صياغة هذه  
النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء  
مخصص لكلا الجنسين.

### المنتج وصاحب التسجيل

### دكسل م. ص.

شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000،  
إسرائيل