

The format of this leaflet was set by the Ministry of Health who checked and approved its content.

**PATIENT PACKAGE INSERT IN ACCORDANCE  
WITH THE PHARMACISTS' REGULATIONS  
(PREPARATIONS), 1986**

Read this package insert carefully in its entirety before using this medicine.

## V-TABUR, SOLUTION

**Composition:** Active Ingredients:  
Chlorhexidine Gluconate 0.5% W/V  
Alcohol 70% V/V

**Inactive Ingredients:**

Sunset Yellow, Purified Water

**Therapeutic group:** Disinfectant.

**Indications:** For the disinfection of the skin, and for the cleaning of babies umbilical cord until detached.

**When should the preparation not be used?**

Do not use this medicine if you are sensitive to any of its ingredients.

Do not use this medicine on brain tissue, brain membrane or in the middle ear.

**Warnings:**

Do not use this medicine frequently, or for a long period, without consulting a doctor.

If you are sensitive to any type of food or medicine, inform your doctor before commencing treatment with this medicine. In case of swelling developing at the wound or if the wound is accompanied by fever, consult your physician.

**Do not light a cigarette and avoid exposure to fire until the solution is completely dry.**

**Side Effects:**

In addition to the desired effect of the medicine, adverse reactions may occur during the course of taking this medicine.

**Effects that require special attention:**

Local itching, rash or inflammation (which were not present before using this medicine) (rare): stop treatment and refer to your doctor. In the event that you experience side effects not mentioned in this leaflet, or if there is a change in your general health, consult your doctor immediately.

**Adverse reactions in children and infants:** Parents must inform the attending doctor about any side effect, as well as any additional medicine being taken by the child. See above for details of special side effects.

**Dosage:**

Recommended dosage, unless otherwise prescribed by your doctor: refer to "Directions for use". Do not exceed the recommended

Формат и содержание данной инструкции установлены, проверены и утверждены Министерством здравоохранения.

**Инструкция для потребителя в соответствии с Фармацевтическими Правилами (препаратами) - 1986**

Перед применением лекарства внимательно прочитайте эту инструкцию.

صودقت هذه النشرة وفحص محتواها من قبل وزارة الصحة.

**نشرة للمستوك حسب اخملة الصيادلة  
(مستحضرات) ١٩٨٦**

اقرأ النشرة بامان حتى النهاية قبل البدء باستعمال الدواء.

פורטט עלון זה נקבע ע"י משרד הבריאות  
ותוכו נבדק ואורע על ידי.

**עלון לצריכת תקנות הרוחן  
(תקנירם) התשמ"א- 1986**

קרא בוין את העלוּן עד סוף ברוטם  
השתמש בתרופתך.

## וַיְתָבֹר, תְּמִיסָה

**التركيب:** المواد الفعالة وتركيزها:

Chlorhexidine Gluconate 0.5% W/V

Alcohol 70% V/V

**المواد الغير فعالة:**

Sunset Yellow, Purified Water

**المجموعة العلاجية:** مطهر.

**الفعلية الطبية:** لتطهير الجلد وتتنظيف سرة الرضيع حتى زواله.

**متى يُمنع استعمال الدواء؟**

يُمنع استعمال الدواء إذا كانت هناك حساسية لأحد مركباته.  
كما ويُمنع استعماله على أنسجة المخ، غشاء المخ أو على الأذن الوسطى.

**تحذيرات:**

يُمنع استعمال الدواء لفترات متقاربة أو لمدة طويلة بدون استشارة الطبيب.

إذا كانت لديك حساسية لنوع من الغذاء أو الدواء فعليك استشارة الطبيب قبل تناول الدواء. يجب استشارة الطبيب في الحالات التي تظهر فيها انخفاضات في الجرح أو إذا رافق الجرح حرارة مرتفعة.

يُمنع إشعال سيجارة أو التعرض للنار إلى أن يجف المتنقح بالكامل.

**أعراض جانبية:** بالاضافة للفعالية المرغوبة للدواء، قد تظهر اثناء استعماله اعراض جانبية.

**أعراض تلزيم الانتباه الخاص:** اثاره، طفح او حكة موضعيات (التي لم تكن موجودة قبل استعمال المستحضر) (نادر: توقف/ي عن العلاج وتوجه/ي للطبيب).

في كل حال شعر/ين بأعراض جانبية لم تذكر في هذه النشرة، او اذا طرأ تغير في شعورك العام، فعليك استشارة الطبيب فوراً.

**أعراض جانبية لدى الأطفال والرضع:**

على الوالدين بإبلاغ الطبيب العالج عن كل عرض جانبي يظهر لدى الطفل/ة وعن كل دواء آخر يتناوله/تناوله.

**הרכב:** החומרים הפעילים ורכיביהם:

Chlorhexidine Gluconate 0.5% W/V

Alcohol 70% V/V

**המרכיבים הבלתי פעילים:**

Sunset Yellow, Purified Water

**קבוצה רפואיות:** חומר חיטוי.

**פניות ופואית:** לחיטוי העור ולኒקי

חבל הטבר של התינוק עד נשירתה.

**מתי אין להשתמש בתכשיר?**

אין להשתמש אם ידועה ריגשות לאחד

מרכיבים רפואיים.

אין להשתמש על רקמות המוח, קром המוח או באזון התיכון.

**اذנות:**

אין להשתמש בתרופת זו לעתים קרובות או תקופה ממושכת ביליהויעץ ברופא.

אם הינך רגש/ה למשך כלשהו או לתרופה כלשהי, עלייך להודיע על כך לרופא לפני נטילת התרופתך. במקרים

שבהם מתקפתת נסיבות בעצם או הפטוץ מלאו בחום, יש להיויעץ ברופא. אין לדליק סיגריה או להחיש לאש עד ליבש מוחלט של התכשיר.

**תופעות לוואי:**

בנוסך לפניות הר Zweig של התרופת, בזמן השימוש עלולות להופיע תופעות לוואי.

**תופעות המחייבות התיחסות מיוחדות:** גוררי, פיראה או דלקת מקומותיים (שללא היו קיימים לפני השימוש בתכשיר

(נדירים): הפסיק הטיפול וכנה לתופעה בכל מקרה שבו הינך מרגש/ה תופעת לוואי שלא ציינו בעלוּן זה, או אם חל שינוי בהרגשות הכלליות, עלייך להתעדע עם הרופא מיד.

**תופעות לוואי בילדים ותינוקות:** על ההורים לדודו לזרוף לזרוף המטפל על כל תופעת לוואי כן על כל תרופת נוספת נספת הניתנת לילד/ה!

ראיה: עליל תופעות לוואי מיוחדות שפורהן.

**מינון:** מינון מקובל בהעדר הוראה אחרת

наряду с прямым действием препарата, во время его применения могут возникать побочные явления.

**Побочные явления:**

Наряду с прямым действием препарата, во время его применения могут возникать побочные явления.

**Явления, требующие особого отношения:**

При появлении (редко) раздражения, сыпи или местного воспаления (не отмечавшихся до начала применения данного препарата) следует прекратить его использование и обратиться к врачу.

В случае возникновения любых побочных явлений, не указанных в данной инструкции, а также при любом изменении общего самочувствия немедленно обратитесь за консультацией к врачу.

**Побочные явления у детей, включая**

dosage.

**Attention:** Do not swallow! This medicine is intended for external use only. Avoid contact between this medicine and the eyes. In case of contact with the eyes, flush the eyes thoroughly with water.

**Directions for use:**

Wet clean cotton wool with the product and clean the treated area. On the umbilical cord, continue treatment until the cord detaches/ the wound cicatrizes.

**Avoid poisoning!** This medicine, and all other medicines, must be stored in a safe place out of the reach of children and/or infants, to avoid poisoning.

If you have taken an overdose, or if a child has accidentally swallowed the medicine, proceed immediately to a hospital emergency room and bring the package of the medicine with you.

**Do not induce vomiting unless explicitly instructed to do so by a doctor! Do not take medicines in the dark!** Check the label and the dose each time you take your medicine. Wear glasses if you need them.

**Storage:**

Store below 25°C. Close firmly to prevent penetration of air or humidity. May be used up to 6 months from first opening. Flammable liquid. Keep away from fire!

Even if kept in their original container and stored as recommended, medicines may be kept for a limited period only. Please note the expiry date of the medicine! In case of doubt, consult the pharmacist who dispensed the medicine to you. Do not store different medications in the same package.

**Licence number:** 1079029156

**младенцев:** Родители должны сообщить лечащему врачу обо всех побочных явлениях, а также о любом другом лекарстве, которое получает ребенок!  
См. выше – «Побочные явления».

**Дозировка:**

обычная дозировка при отсутствии иных предписаний врача: см. «Способ применения». Не превышайте рекомендованную дозировку.

**Обратите внимание!** Не глотать! Лекарство предназначено только для наружного применения. Не допускайте контакта препарата с глазами. В случае попадания раствора в глаза, тщательно промойте их водой.

**Способ применения:**

Смочите ватный тампон препаратом и приложите к нужному участку кожи. Обработка пуповины: следует повторять обработку до отпадения пупочного остатка/ заживления ранки.

**Остерегайтесь отравления!** Во избежание отравления, это лекарство, как и все другие, следует хранить в закрытом, недоступном для детей месте. В случае превышения рекомендованной дозы или приема лекарства ребенком по ошибке, немедленно обратитесь в приемный по-кою больницы, захватив с собой упаковку от лекарства. Не пытайтесь вызывать врача, если вы не получили четких указаний от врача! **Не принимайте препарат в темноте!** При каждом приеме препарата проверяйте его название и дозировку. Если нужно, надевайте очки.

**Условия хранения:**

Ниже 25°C. Тщательно закупоривайте флакон из избежания проникновения воздуха и влаги. Нельзя пользоваться препаратом более 6 месяцев после первого открытия. Осторожно! Вещество легко воспламеняется. Хранить вдали от огня! Даже при соблюдении рекомендованных правил упаковки и хранения препарат имеет ограниченный срок годности. Обратите внимание на указанный срок годности препарата! При малейшем сомнении необходимо проконсультироваться с фармацевтом, у которого вы приобрели это лекарство. Не храните разные лекарства в одной упаковке.

**Регистрационный номер:** 1079029156

**Manufacturer:**

Vitamed Pharmaceutical Industries Ltd.,  
P.O.B. 114, Binyamina 3055002, Israel.

**Производитель:**

Витамед Фармацевтическое производство Лтд.,  
а/я 114, Биньямина 3055002, Израиль.

**انظر / ي الأعراض الجانبية التي ذكرت أعلاه.**  
**الجرعة:** الجرعة الموصى بها في حال عدم وجود تعليمات أخرى من الطبيب:  
انظر في "طريقة الاستعمال".

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.  
**انتبه / ي:** ليس للابلاغ! هذا الدواء معد للاستعمال الخارجي فقط. يجب منع تماس المستحضر مع العين. في حالة حدوث تماس مع العين، يجب غسل العين جيداً بالماء.

**طريقة الاستعمال:**  
بلا / ي قطن بملادة ونظف / ي المنطقة المعالجة. بالحلق السري، يجب الاستمرار بالعلاج حتى زوال الجرح، أو سقوط الجبل السري.

**تجنب / ي التسمم:** يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال / و/ أو رضيع وذلك لتفادي التسمم. إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا ابتلع ولد سهواً من الدواء، فعليك التوجّه فوراً لغرفة طوارئ المستشفى وعطيه عينة الدواء. **يُمنع تسبّب التقيّد** بدون تعليمات واضحة من الطبيب! **يُمنع تناول أدوية في الظلام**: افحص / ي طابع الدواء والجرعة في كل مرة تتناول / بين الدواء.

**استعمل / ي النظارات الطبية** إذا لزم الأمر.

**الخزين:**  
في درجة حرارة تحت 25 درجة مئوية. اغلق جيداً وامنع دخول هواء أو رطوبة.  
يُمنع تخزينه في مكان ممطر.

يُمنع استعمال المستحضر بعد انقضاء 6 أشهر من فتحه للمرة الأولى. الدذر، مادة مشتعلة، أبعدها عن النار!

حتى عند مراعاة تعليمات التعبئة / التخزين الموصى بها، فالأدوية تبقى صالحة لفترة محدودة. الرجاء الانتهاء للتاريخ انتصاء صلاحية الدواء؛ في حالة الشك، عليك استشارة الصيدلي الذي صرف لك الدواء. **يُمنع خزن أدوية مختلفة في نفس العبوة.**

**رقم تسجيل الدواء:** ١٠٧٩٠٢٩١٥٦

מהרופא: ראה ב"אופן השימוש".  
אין לעבר על המנה המומלצת.  
שים לב! לא לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.  
יש למנוע מגע עם העיניים, יש לשתוף במקרה של מקרה של מגע עם העיניים, יש לטסוף אתון היטב במים.

**אופן השימוש:**  
הרוטבי / צמר גפן נקי בחומר נקיה / האזרוח המטופל. בחבל הטבור, יש להמשיך בטיפול עד נשירת/הגלחת הפעצע.

**מנع הרעללה:** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להשג' ידם של ילדים / ואו תינוקות ועדי-

ידי כך מנע הרעללה.  
אם נטלת מנת יתר, או אם בטעות בעליך מדן התהrowing, פנה מיד לחדר מיון של בית-חולים, והבא אריזת התרופה איתה.  
**אל תגוזם להקה** ללא הוואה מופרשת מרווחן אין ליטול תרופה בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע** שהניר נטל תרופה. הרכבי / משקפיים אם הירך / הדקקה להם.

**אחסנה:**  
שמור מתחת ל-25°C. סגור היטב  
בדידת אויר ורטיבות. אין להשתמש בתכשיש בתום 6 חודשים מפתיחה הראשונה.

זהירות! חומר דליק, שמור בפני איש!  
גם לפוי תנאי האזיה/אחסנה המומלץ,  
תרופות נשמרות לתקופה מוגבלת בלבד. אך יש לב להאריך התופה של התכשיש! בכל מקרה של ספק, עליי להודיעיך ברוקח שיפיק לך את התרופה.  
איןalachן תרופות שונות באותה אריזה.

**מספר רישום התרופה:** 1079029156

ויטאמט  
ת"ד 114 בנימינה 3055002, ישראל.  
טלפון: 04-600158  
מ"ק: 04-600158



المنتاج: فيتاميد لصناعة الأدوية م.ض.  
العنوان: ص.ب. ١١٤، بنيamina ٣٠٥٥٠٠٢، إسرائيل.