

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

يُسوق الدواء وفق وصفة طبيب فقط

كسيلجانز™ 5 ملغ، أقراص
كسيلجانز™ 10 ملغ، أقراص
كسيلجانز™ إكس أر 11 ملغ، أقراص بإطلاق ممتد

المادة الفعالة

كسيلجانز 5 ملغ: يحتوي كل قرص على تو法سيتيتنيب 5 ملغ
كسيلجانز 10 ملغ: يحتوي كل قرص على توفاسيتيتنيب 10 ملغ
كسيلجانز إكس أر 11 ملغ: يحتوي كل قرص على توفاسيتيتنيب (كملح السترات) 11 ملغ
tofacitinib (as citrate) 11 mg

المواد غير الفعالة ومساهمات الحساسية: انظر البند 2 تحت "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية فتووجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. لأنه قد يضرهم، حتى لو بدا لك أن حالتهم الصحية شبيهة.
هذا الدواء مخصص للبالغين فوق سن 18 عاماً.

بالإضافة إلى النشرة، هناك مستحضر كسيلجانز 5 ملغ بطاقة معلومات أمان لمنتقى العلاج لالتهاب القولون التقرحي. تتضمن هذه البطاقة معلومات أمان مهمة عليك معرفتها قبل بدء العلاج بكسيلجانز 5 ملغ وخالله والعمل بموجبها. راجع بطاقة معلومات الأمان لمنتقى العلاج ونشرة المستهلك لمنتقى العلاج قبل بدء استعمال المستحضر. يجب حفظ البطاقة لمراجعتها ثانية عند الحاجة.

**1. لم أعد هذا الدواء؟
كسيلجانز مخصص له:**

- التهاب المفاصل الروماتويدي
- التهاب المفاصل الصدفي
- التهاب الفقار القسطي
- التهاب القولون التقرحي

المجموعة العلاجية: دواء من عائلة مثبطات إنزيم جانوس كيناز (JAK).

التهاب المفاصل الروماتويدي

يُستخدم كسيلجانز لعلاج البالغين المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي (Rheumatoid arthritis) النشط المتوسط حتى الشديد، وهو مرض يستمر لفترة زمنية طويلة ويسبب بالأساس ألمًا وانفاخًا في المفاصل.

يتم العلاج بواسطة كسيلجانز بالدمج مع ميثوتريكسات حين لا يكون العلاج السابق لالتهاب المفاصل الروماتويدي ناجحاً بما يكفي، أو في حالات عدم تحمله. بالإمكان استعمال كسيلجانز أيضًا كعلاج وحيد في الحالات التي لا يكون العلاج بميثوتريكسات فيها محتملاً، أو غير موصى به.

أظهر العلاج بواسطة كسيلجانز انخفاضاً في الألم والانتفاخ في المفاصل، وتحسين القدرة على أداء النشاطات اليومية عندما تم إعطاؤه كعلاج وحيد أو بالدمج مع ميثوتريكسات.

التهاب المفاصل الصدفي

يُستخدم كسيلجانز لعلاج البالغين المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي. إنه مرض التهابي يصيب المفاصل، يكون مصحوباً بالصدفية في بعض الأحيان (Psoriasis). إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الصدفي النشط، فيُنصح علاجك في البداية بدواء آخر. إذا لم تتجاوب بصورة كافية أو إذا لم تكن لديك قدرة على تحمل الدواء، فمن الممكن أن تنتهي كسيلجانز للحد من علامات وأعراض التهاب المفاصل الصدفي وتحسين القدرة على أداء النشاطات اليومية.

يتم استعمال كسيلجانز لعلاج التهاب المفاصل الصدفي النشط لدى البالغين بالدمج مع ميثوتريكسات.

التهاب الفقار القسطي

يُستعمل كسيلجانز لعلاج الحالة المسمى التهاب الفقار القسطي. هذا مرض التهابي في العمود الفقري.

إذا كنت تعاني من التهاب الفقار القسطي، فقد تتعالج بداية بأدوية أخرى. إذا لم تتجاوب بصورة جيدة بما يكفي مع هذه الأدوية، ستتلقى كسيلجانز. قد يساعد كسيلجانز في تقليل ألم الظهر وتحسين الأداء الجسدي، ومن خلال ذلك تسهيل أدائك لنشاطاتك اليومية وتحسين جودة حياتك.

التهاب القولون التقرحي

التهاب القولون التقرحي هو مرض التهابي يصيب الأمعاء الغليظة. يتم العلاج بواسطة كسيلجانز للبالغين من أجل الحد من علامات وأعراض التهاب القولون التقرحي عندما لا يكون التجاوب مع العلاج السابق حيداً بما يكفي أو عندما لا يكون هنالك تحمل للعلاج.

2. قبل استعمال الدواء يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجبة) للمادة الفعالة أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر البند 6)
- كنت تعاني من عدوى خطيرة مثل ثلوث في الدم أو مرض سل نشط
- قبل لك إنك تعاني من مشاكل خطيرة في الكبد، وبضمن ذلك تشمع الكبد (cirrhosis، تندب الكبد)
- كنت حاملاً أو مرضعة

إذا لم تكن متأكداً بالنسبة لأي من المعلومات الواردة أعلاه، الرجاء التوجه للطبيب.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء قبل بدء العلاج بксيلجانز، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تظن أنك تعاني من عدوى أو كنت تشعر بأعراض عدوى مثل حمى، تعرق، قشعريرة، آلام في العضلات، سعال، ضيق في التنفس، بلغم جديد أو تغيير في البلغم، فقدان الوزن، جلد ساخن أو أحمر أو ألم أو جروح في الجلد، صعوبة أو ألم عند البلع، إسهال أو آلام في البطن، حرقة أثناء التبول أو تكرار التبول، إرهاق.
- كنت تعاني من حالة تزيد خطر إصابتك بالعدوى (السكري، HIV/إيدز أو إذا كان جهاز المناعي ضعيفاً).
- كنت تعاني من عدوى أيا كانت، تتأقى العلاج لأي عدوى، أو تعاني من حالات عدوى متكررة. يجب إبلاغ الطبيب فوراً في حال شعرت بسوء. قد يقلل كسيلجانز قدرة الجسم على التعامل مع حالات العدوى والتسبب بتفاقم العدوى الموجودة أو زيادة خطر الإصابة بعدوى جديد.
- كنت مصاباً بالسل أو أصبت بالماضي بالسل أو كنت على مقربة من شخص مصاب بالسل. سيووجهك الطبيب لإجراء تشخيص لمرض السل قبل العلاج بكسيلجانز، ومن الممكن أيضاً خلل العلاج.
- كنت تعاني من مرض مزمن أيا كان في الرئتين.
- كنت تعاني من مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من التهاب الكبد (hepatitis) أو C (فيروسات تؤثر على الكبد). قد يصبح الفيروس نشطاً خلال فترة العلاج بكسيلجانز. قد يوجهك الطبيب لإجراء فحوصات الدم للتهاب الكبد قبل وخلال استعمال الدواء.
- كنت فوق سن 65 عاماً، أصبت بأي نوع من السرطان وكذلك إذا كنت مدخناً أو دخنت في الماضي. قد يزيد كسيلجانز من خطورة إصابتك بأنواع معينة من السرطان. تم الإبلاغ عن سرطان خلايا الدم البيضاء، سرطان الرئتين وغيرها (مثل الثدي، الجلد، البروستاتا والبنكرياس) لدى المرضى الذين تلقوا العلاج بكسيلجانز. إذا أصبت بالسرطان خلال العلاج بكسيلجانز، سيقوم الطبيب بتقييم إمكانية وقف العلاج بكسيلجانز.
- كنت في دائرة الخطر للإصابة بالكسور، مثلاً إذا كنت فوق سن 65 عاماً، أنت امرأة أو تتناول كورتيكosteroidات (مثلاً بريدينزون).
- إذا كنت في دائرة الخطر الشديد للإصابة بسرطان الجلد، قد يوصيك الطبيب بالخصوص لفحوصات جلد بصورة دائمة خلال العلاج بكسيلجانز.
- عانيت من التهاب الردب (التهاب في الأمعاء الغليظة، Diverticulitis)، أو من قرحة في المعدة أو في الأمعاء (انظر البند 4).
- كنت تعاني من مشاكل في الكلى.
- كنت تتعربي تلقى لفاح. يجب إبلاغ الطبيب. هناك أنواع معينة من اللقاحات يُمنع تلقّيها خلال العلاج بكسيلجانز. قبل بدء العلاج بكسيلجانز، عليك تلقى كل اللقاحات الموصى بها. سيقرر الطبيب إذا كان عليك تلقى لفاح ضد الهرس النطاطي (Herpes zoster).
- كنت تعاني من مشاكل في القلب، ضغط الدم المرتفع وكذلك، إذا كنت تدخن أو دخنت في الماضي.

ذلك، قبل بدء العلاج بكسيلجانز إكس أر 11 ملغ أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني من تضيق أنبوب الهضم لأنه حصلت حالات نادرة من انسداد أنبوب الهضم لدى مثلك العلاج الذين تناولوا أدوية أخرى على شكل أقراص إطلاق متعدد.
- عندما تتناول كسيلجانز إكس أر 11 ملغ، قد ترى أحيانا شيئا يشبه القرص في البراز. هذه قشرة قرص الإطلاق الممتد الفارغة، والتي تبقي بعد امتصاص الجسم للدواء. هذا أمر متوقع، ولا داعي للقلق.

كانت هناك بلاغات عن مرضي تم علاجهم بكسيلجانز، نشأت لديهم خثرات دموية في الرئتين أو في الأوردة. سيجري الطبيب تقييمًا لمخاطر الإصابة بالخثرات الدموية في الرئتين أو الأوردة، وسيحدد إن كان كسيلجانز ملائما لك. إذا سبق وكانت لديك خثرات دموية في الرئتين والأوردة أو كانت لديك خطورة شديدة للإصابة بذلك (مثلاً إذا كنت تعاني من الوزن الزائد الشديد، إذا كنت مصاباً بالسرطان، مشاكل في القلب، سكري، مررت بنوبة قلبية (خلال آخر 3 أشهر)، خضعت لجراحة كبيرة مؤخرًا، إذا كنت تستعملين وسائل منع حمل هرمونية / علاجا هرمونيا بديلاً، إذا تم تشخيص خلل في التختز لديك أو لدى أحد أفراد العائلة القربيين)، إذا كنت مسنًا، أو إذا كنت تدخن أو دخنت في الماضي، قد يقرر الطبيب أن كسيلجانز غير ملائم لك.

توجه فوراً إلى الطبيب إذا أصبت خلال تناول كسيلجانز بضيق تنفس مفاجئ أو صعوبات في التنفس، آلام في الصدر أو أعلى الظهر، انفاس في الرجل أو الذراع، ألم أو حساسية في الرجل، أو احمرار أو تغير في لون الرجل أو الذراع، نظراً لأن هذه قد تكون علامات على وجود تخثر في الرئتين أو الأوردة.

توجه للطبيب فوراً إذا لاحظت تغييرات مفاجئة في الرؤية (رؤية مشوشة، فقدان رؤية جزئي أو كامل)، لأن ذلك قد يكون مؤشراً على وجود تخثرات دموية في العينين.

كانت هناك بلاغات عن مرضي تم علاجهم بكسيلجانز، حصلت لديهم مشاكل في القلب، وبضمن ذلك نوبة قلبية. سيقيم الطبيب مستوى الخطورة لإصابتك بمشاكل في القلب، وسيحدد إذا كان كسيلجانز ملائما لك. توجه فوراً إلى الطبيب إذا حصلت لديك علامات وأعراض نوبة قلبية، وبضمن ذلك آلام حادة أو ضغط في الصدر (والتي قد تمتد نحو الذراعين، الفك، العنق، الظهر)، ضيق تنفس، تعرق بارد، دوار أو دوار مفاجئ.

الفحوصات والمتابعة

على الطبيب توجيهك لإجراء فحوصات الدم قبل العلاج بكسيلجانز وبعد 4 حتى 8 أسابيع من العلاج، وبعد ذلك كل 3 أشهر، من أجل تحديد ما إذا كان تعداد خلايا الدم البيضاء (العدلات أو الخلايا المفاوية) منخفضاً أو إن كان تعداد خلايا الدم الحمراء منخفضاً (فقر دم).

يُمنع تناول كسيلجانز إذا كان تعداد خلايا الدم البيضاء (العدلات أو الخلايا المفاوية) أو تعداد خلايا الدم الحمراء أقل مما يجب. عند الحاجة، قد يوقف الطبيب العلاج بكسيلجانز من أجل تقليل خطر الإصابة بالعدوى (تعداد خلايا الدم البيضاء) أو فقر الدم (تعداد خلايا الدم الحمراء).

قد يجري الطبيب فحوصاً أخرى، مثل لأجل فحص مستوى الكوليستروول في الدم أو مراقبة صحة الكبد. يجب على الطبيب فحص مستوى الكوليستروول بعد بدء تناول كسيلجانز بـ 8 أسابيع. على الطبيب توجيهك لإجراء فحوصات الكبد من حين لآخر.

المسنون

هناك نسبة مرتفعة من الإصابة بحالات العدوى لدى المرضى البالغين 65 عاماً وما فوق. توجه للطبيب فور ملاحظتك لأي علامات أو أعراض للإصابة بالعدوى. قد يكون المرضى البالغون 65 عاماً وما فوق ضمن دائرة الخطر الشديد للإصابة بالعدوى، النوبة القلبية وبعض أنواع السرطان. قد يقرر الطبيب أن كسيلجانز غير ملائم لك.

المرضى الآسيويون

هناك نسبة أعلى من الهربس النطيلي لدى المرضى اليابانيين والكوريين. راجع الطبيب إذا لاحظت ثبوراً مؤلمة على الجلد. كذلك، من الممكن أن تكون ضمن دائرة الخطر الأكبر للإصابة بمشاكل معينة في الرئتين. راجع الطبيب إذا لاحظت صعوبات في التنفس.

ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية بدون وصفة طبية والمكمّلات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. لا سيما إذا كنت تتناول:

أخبر الطبيب إذا كنت تعاني من السكري أو كنت تتناول أدوية لعلاج السكري. سيقرر الطبيب بخصوص تقليل أدوية علاج السكري خلال فترة تناول كسيلجانز.

هناك أدوية يُمنع تناولها مع كسيلجانز. إذا تمأخذ هذه الأدوية مع كسيلجانز، فإنها قد تغير مستوى كسيلجانز في الجسم، وقد تكون هناك حاجة لملاءمة جرعة كسيلجانز. عليك إبلاغ الطبيب إذا كنت تستعمل أدوية تحتوي على إحدى المواد الفعالة التالية:

- مضادات حيوية مثل ريفامبيسين، الذي يستعمل لعلاج حالات العدوى البكتيرية
- فلوركونازول، كيتوكونازول اللذين يستعملان لعلاج حالات العدوى الفطرية

لا يوصى بتناول كسيلجانز مع الأدوية المثبتة لجهاز المناعة، وبضمن ذلك المسمّاة علاجات بيلوجية مرکزة (مضادات)، مثل مثبطات TNF، إنترلوكين-17، إنترلوكين-12/ إنترلوكين-23، مضادات الإنترجين، ومثبطات الجهاز المناعي الكيميائية القوية، وبضمن ذلك آزاثيوفرين، مركبتوپورين، سيكلوسپورين وتاكروليموس. قد يؤدي تناول كسيلجانز بالدمج مع هذه الأدوية إلى زيادة مخاطر الأعراض الجانبية، وبضمن ذلك الثلث.

قد تحصل حالات عدوى وخيمة وكسور في أحيان أكثر تقارباً لدى الأشخاص الذين يتناولون كورتيكosteroidات أيضاً (مثلاً، بريدينزون).

استعمال الدواء والغذاء
يمكن التناول مع أو بدون طعام.

الحمل والإرضاع

إذا كنت امرأة في سن الخصوبة، عليك استعمال وسائل ناجعة لمنع الحمل خلال العلاج بكسيلجانز، ولمدة 4 أسابيع على الأقل بعد آخر جرعة.

إذا كنت حاملاً أو مريضة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل تناول الدواء. يُمنع استعمال كسيلجانز خلال الحمل. أخبري الطبيب فوراً إذا حملت خلال فترة العلاج بكسيلجانز.

إذا كنت تتناولين كسيلجانز وترضعين، عليك التوقف عن الإرضاع إلى أن تستشيري الطبيب بشأن وقف العلاج بكسيلجانز.

السيارة واستعمال الماكينات

ليس هناك تأثير أو أن هناك تأثير محدود لكسيلجانز على القدرة على السيارة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء
كسيلجانز 5 ملغ وكسيلجانز 10 ملغ:

يحتوي المستحضر على مونوهيدرات اللاكتوز. إذا أخبرك الطبيب في الماضي بأنك تعاني من عدم تحمل بعض السكريات، عليك استشارته قبل بدء العلاج بهذا الدواء.

يحتوي الدواء على الصوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول من الصوديوم (23 ملغ) في كل قرص، لهذا يعتبر "خالي من الصوديوم".

كسيلجانز إكس أر 11 ملغ:

يحتوي المستحضر على نحو 152 ملغ من سوربيتول في كل قرص إطلاق متعدد.

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.
الجرعة وطريقة العلاج سيحددهما الطبيب، فقط.

التهاب المفاصل الروماتويدي

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد 5 ملغ يتم أخذها مرتين في اليوم أو قرص واحد 11 ملغ بإطلاق متعدد يتم أخذها مرة واحدة في اليوم.

إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي، قد يبدل لك الطبيب العلاج من كسيلجانز 5 ملغ مرتين في اليوم إلى كسيلجانز إكس أر 11 ملغ مرة واحدة في اليوم وبالعكس. بالإمكان التبديل بين العلاجات بعد يوم واحد من الجرعة الأخيرة من كل قرص. يمنع التبديل بين كسيلجانز 5 ملغ وكسيلجانز إكس أر 11 ملغ إلا بتوجيهات من الطبيب.

التهاب المفاصل الصدفي

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد 5 ملغ يتم أخذها مرتين في اليوم.

التهاب الفقار القسطي

- الجرعة الموصى بها هي قرص واحد 5 ملغ، يتم أخذها مرتين في اليوم.
- قد يقرر الطبيب وقف العلاج بكسيلجانز، إذا لم يساعدك خلال 16 أسبوعاً.

التهاب القولون التقرحي

- الجرعة الموصى بها هي 10 ملغ مرتين في اليوم لمدة 8 أسابيع، وبعد ذلك 5 ملغ مرتين في اليوم.

- قد يقرر الطبيب تمديد العلاج الأولى بـ 10 ملغ مرتين في اليوم بـ 8 أسابيع إضافية (16 أسبوعاً بالمجمل)، وبعد ذلك 5 ملغ، مرتين في اليوم.
- قد يقرر الطبيب وقف العلاج بكسيلجانز إذا لم يكن كسيلجانز ناجعاً بالنسبة لك خلال 16 أسبوعاً من العلاج.
- بالنسبة للمرضى الذين تناولوا في السابق أدوية ببولوجية لعلاج فرحة المعدة (مثل تلك التي ترتبط عمل الـ TNF في الجسم) ولم تعمل هذه الأدوية، قد يقرر الطبيب زيادة كسيلجانز إلى 10 ملغ مرتين في اليوم إذا لم تتجاوز بصورة جيدة بما يكفي مع 5 ملغ مرتين في اليوم. سيقيم الطبيب المخاطر المحتملة، وبضمن ذلك نشوء خثرات دموية في الرئتين أو الأوردة، والحسنات المحتملة بالنسبة لك. سيقول لك الطبيب إن كان ذلك يسري عليك.
- إذا كان هنالك توقف في العلاج، قد يقرر الطبيب بدء العلاج مجدداً.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

- طريقة التناول:
- كسيلجانز 5 و10 ملغ: يجب ابتلاع قرص واحد في الصباح وقرص واحد في المساء. حاول تناول الأقراص في نفس الساعة كل يوم.
 - بالإمكان سحق القرص وتناوله مع الماء.
 - كسيلجانز إكس أر 11 ملغ: يجب ابتلاع قرص واحد في اليوم. حاول تناول القرص في نفس الساعة كل يوم، مثلاً في الصباح أو في المساء.
 - يجب بلع القرص تماماً من أجل ضمان أخذ كل الجرعة. يُمنع السحق، الشطر أو المضغ.

يمكن أن يخفض الطبيب الجرعة الدوائية إذا كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى أو إذا كنت تتناول أدوية معينة أخرى. قد يوقف الطبيب العلاج أيضاً بصورة مؤقتة أو دائمة إذا أظهرت فحوصات الدم أن تعداد خلايا الدم البيضاء أو خلايا الدم الحمراء منخفض.

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز لك تناول جرعة مضاعفة. تناول الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي، واستشر الطبيب.

يجب المداومة على العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب أو الصيدلي.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشير الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال كسيلجانز أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تفزع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحمّل الآلا تعاني من أي منها.

قد تكون بعض الأعراض الجانبية جدية، وقد تكون هناك حاجة لعلاج طبي.

الأعراض الجانبية الشديدة المحتملة

في بعض الحالات النادرة، قد يكون هناك تلوث يشكل خطراً على الحياة.

كذلك، تم الإبلاغ عن سرطان الرئتين، سرطان خلايا الدم البيضاء والنوبة القلبية.

إذا لاحظت أحد الأعراض الجانبية الخطيرة التالية يجب عليك إبلاغ الطبيب فوراً.

علامات حالات عدوى خطيرة (شائعة) تشمل:

- حمى وقشعريرة
- سعال
- بثور في الجلد
- آلام في البطن
- آلام رأس متواصلة

علامات تقرّحات أو ثقوب في المعدة (غير شائعة) تشمل:

- حمى
- آلام في البطن أو المعدة
- دم في البراز
- تغييرات غير مبررة في عادات التبرز

غالباً ما تحصل الثقوب في المعدة أو الأمعاء لدى الأشخاص الذين يتناولون أيضاً أدوية مضادة للالتهاب غير ستريروئيدية أو كورتيكosteroidات (مثلاً بريدينزون).

علامات ردود فعل تحسسية (نسبة شيو عها غير معروفة) تشمل:

- ضغط في الصدر
- حالات صفير
- دوار شديد أو خفيف
- انتفاخ الشفتين، اللسان أو الحلق
- شرى (حكّة أو طفح في الجلد)

علامات على خرّة دموية في الرئتين أو الأوردة أو العينين (غير شائعة: انصمام وريدي) تشمل:

- ضيق التنفس المفاجئ أو صعوبات التنفس
- آلام في الصدر أو آلام أعلى الظهر
- انتفاخ في الرجل أو الذراع
- آلام أو حساسية في الرجلين
- احمرار أو تغيير في لون الرجل أو الذراع
- تغييرات مفاجئة في الرؤية

علامات النوبة القلبية (غير شائعة) تشمل:

- ألم شديد أو ضغط في الصدر (قد تمتد إلى الذراعين، الفك، العنق، الظهر)
- ضيق التنفس
- تعرّق بارد
- دوار خفيف أو دوار مفاجئ

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من 10 أشخاص): تلوّث (عدوى) في الرئتين (التهاب الرئتين والتهاب القصبات/الشعب الهوائية)، الهرس النطقي، حالات عدوى في الأنف، الحلق أو القصبة الهوائية (*nasopharyngitis*)، إنفلونزا، التهاب الحبيبات الأنفية، التهاب في المثانة (*cystitis*)، ألم الحلق (التهاب البلعوم)، ارتفاع مستويات إنزيمات العضل في الدم (دليل على مشاكل في العضلات)، آلام في البطن (والتي قد تنتج عن التهاب بطانة المعدة)، تقيؤ، إسهال، غثيان، تلذّك معدى، تعداد خلايا دم بيضاء منخفض، تعداد خلايا دم حمراء منخفض (أنيميا)، انتفاخ في القدمين واليدين، آلام في الرأس (صداع)، ضغط دم مرتفع (فرط ضغط الدم)، سعال، طفح جلدي.

أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من كل 100 شخص): سرطان الرئتين، سل، عدوى في الكلى، عدوى في الجلد، الهرس البسيط أو تقرّحات البرد (هرس الشفتين)، ارتفاع مستوى الكرياتينين في الدم (علامة ممكّنة لمشاكل في الكلى)، ارتفاع مستوى الكوليستيرول (يُشمل ارتفاع *LDL*)، حمى، تعب، ازدياد الوزن، جفاف، توّتر في العضلات، التهاب في الأربطة، انتفاخ في المفاصل، التواء المفصل، مشاعر غير عادية، نوم سيء، احتقان الحبيبات الأنفية، ضيق التنفس أو صعوبة في التنفس، احمرار في الجلد، حكة، كبد دهنى، التهاب مؤلم في حبيبات صغيرة موجودة في بطانة الأمعاء (التهاب الردب، *Diverticulitis*)، حالات عدوى فيروسية، حالات عدوى فيروسية تؤثر على الأمعاء، أنواع معينة من سرطان الجلد (ليست ميلانوما).

أعراض جانبية نادرة (قد تؤثر على حتى 1 من 1,000 شخص): ثلث في الدم (إنتان الدم، خمج الدم)، ليغفوما (سرطان خلايا الدم البيضاء)، سل منتشر يشمل العظام وأعضاء أخرى، حالات عدوى أخرى غير عادية، حالات عدوى في المفاصل، ارتفاع مستوى إنزيمات الكبد في الدم (دليل لمشاكل في الكبد)، آلام في العضلات والمفاصل.

أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على حتى 1 من 10,000 شخص): سل يشمل الدماغ والحلب الشوكي، التهاب السحايا (غشاء الدماغ)، التهاب الأنسجة الرخوة واللفافة (fascia).

بصورة عامة، تمت مشاهدة قدر أقل من الأعراض الجانبية عندما تم استعمال كسيلجانز بمفرده مقارنة بدمجه مع ميثوتريكسات لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحولك إلى استماراة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأولاد و/أو الأطفال، وهذا تجنب التسمم. لا تسبّب التقى بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين كسيلجانز 5 ملغ: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25°C. مدة الصلاحية بعد الفتح للمرة الأولى: 30 يوماً للعبوات ذات 28 و 60 قرصاً، 135 يوماً للعبوات ذات 180 قرصاً.
- كسيلجانز 10 ملغ: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30°C. مدة الصلاحية بعد الفتح للمرة الأولى: 60 يوماً.
- كسيلجانز إكس أر 11 ملغ: يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30°C. مدة الصلاحية بعد الفتح للمرة الأولى: 30 يوماً.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضاً على:
كسيلجانز 5 و 10 ملغ:

microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, magnesium stearate, HPMC 2910 / Hypromellose 6cP, titanium dioxide, macrogol/PEG3350 and triacetin.

يحتوي كسيلجانز 10 ملغ أيضاً على:

FD&C Blue #2/Indigo Carmine Aluminum Lake (E132)
FD&C Blue #1/Brilliant Blue FCF Aluminum Lake (E133)

كسيلجانز إكس أر 11 ملغ:

sorbitol, hydroxyethyl cellulose, copovidone, cellulose acetate, opadry pink 03k140024 (hpmc 2910/hypromellose, titanium dioxide, triacetin, red iron oxide, purified water), hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, opacode black (shellac glaze in ethanol, isopropyl alcohol, ammonium hydroxide 2, n-butyl alcohol, propylene glycol, ferrosoferric oxide/ black iron oxide), acetone, methanol, purifiedwater, isopropyl alcohol, opadry pink

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

كسيلجانز 5 ملغ:

قرص أبيض مستدير، مغطى بفيلم، ومدموج عليه كلمة "Pfizer" في جانب واحد، و "5" في الجانب الآخر.
تحتوي كل قبينة على 28، 60 أو 180 قرصاً.

كسيلجانز 10 ملغ:

قرص أزرق مستدير، مغطى بفيلم، ومدموج عليه كلمة "Pfizer" في جانب واحد، و "10" في الجانب الآخر.
تحتوي كل قبينة على 60 قرصاً.

كسيلجانز إكس أر 11 ملغ:

قرص وردي بيضاوي الشكل مع ثقب مقووح في الجانب العرضي و 11 JKI مطبوع على طول القرص.
تحتوي كل قبينة على 30 قرصاً.

قد لا تُسوق كل أحجام العبوات.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر لصناعة الأدوية إسرائيل م.ض، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتوح 46725.

أرقام تسجيل الأدوية في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

كسيلجانز 5 ملغ: 152-35-33973

كسيلجانز 10 ملغ: 170-18-35747

كسيلجانز إكس أر 11 ملغ: 170-19-34983

لتبسيط قراءة هذه النشرة وتسهيلها ورد النص بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، الدواء معد لأبناء كلا الجنسين.

تم التحديث في 10/2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.