

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משוקת ללא מרשם רופא

ונורוטון קפסולות 300 מ"ג

חומר פעיל

כל קפסולה מכילה:
300 מ"ג אוקסרוטינס
oxerutines 300 mg

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך ליטול את התכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים.

1. למה מיועדת התרופה?

מסייעת בטיפול בדליות (ורידים נפוחים)

קבוצה תרפויטית: ביופלבונואידים

תרופה זו משמשת להקלה בתסמינים הנובעים מהפרעות בוורידי הרגליים (אי ספיקה כרונית של ורידים). יש לה השפעה נוגדת בצקות אשר מפחיתה את הצטברות הנוזלים ברקמות בגליים (נפוחות או בצקת) וכך מקלה תסמינים כמו רגליים כבדות, עייפות, מתח ועקצוץ ברגליים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- את בשליש הראשון של ההיריון.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

שוחח עם הרופא או הרוקח טרם נטילת ונורוטון קפסולות 300 מ"ג. אין אזהרות מיוחדות.

ילדים ומתבגרים

אין נתונים לגבי שימוש בילדים ומתבגרים לפיכך השימוש אינו מומלץ בקבוצת גיל זו.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את התרופה עם מים, עם או אחרי ארוחה.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שאת בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא טרם נטילת תרופה זו.

היריון

אם את בהיריון או מעוניינת להרות, עלייך ליטול ונורוטון קפסולות 300 מ"ג רק לאחר התייעצות עם רופא, רק במקרים שבהם ישנה נחיצות ודאית ורק החל מהחודש הרביעי להיריון, מאחר שאין מספיק ניסיון עם תרופה זו בחודשי ההיריון הראשונים.

הנקה

אין מחקרים בבני אדם לגבי המעבר של החומר הפעיל לחלב אם. עקבות של החומר הפעיל שזוהו בחלב אם בניסויים בבעלי חיים נמצאו כחסרי משמעות קלינית, לפיכך סביר להניח שלא צפוי נזק לתינוק אנושי.

נהיגה ושימוש במכונות

במקרים נדירים מאוד דווח על עייפות וסחרחורות. אם אתה עייף או מסוחרר אין לנהוג או להפעיל מכונות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא: 2-3 כמוסות ליום. אין ללעוס! יש לבלוע את התרופה עם מעט מים.

אין לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

מומלץ להמשיך בטיפול עד להיעלמות כל הסימפטומים.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן המיועד

אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על מנה שנשכחה.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

אם אתה עושה הפסקות בטיפול או מפסיק לקחת את התרופה מוקדם מדי, ההשפעה הרצויה לא תתקבל או שתהיה שוב החמרה בתסמינים. לכן היוועץ ברופא אם אתה רוצה להפסיק או לעשות הפסקות בטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך לוקח תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוונורוטון קפסולות 300 מ"ג עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות לוואי נדירות - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000

- הפרעות במערכת העיכול
- תגובות אלרגיות בעור, גרד, סרפדת

תופעות לוואי נדירות מאוד - תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000

- תגובות רגישות יתר לרבות תגובות אנפילקטואידיות
- סחרחורת, כאבי ראש
- הסמקה (אודם בפנים)
- תשישות

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אין לגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/מגשית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לשמור מתחת ל-25°C, יש להגן מפני לחות.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
ליבת הקפסולה:

Macrogol 6000

ציפוי הקפסולה:

Gelatin; water; titanium dioxide; yellow iron oxide; sodium laurilsulfate; black ink (shellac glaze in ethanol, isopropyl alcohol, iron oxide black, N-butyl alcohol, propylene glycol, ammonium hydroxide 28%).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קפסולת ג'לטין קשה בצבע צהוב-בז' שעליה מודפס "Venoruton 300".
כל אריזה מכילה 20 קפסולות במגשית.

בעל הרישום וכתובתו: דיפריס ושות' בע"מ, רחוב הברזל 32, תל-אביב

שם היצרן וכתובתו:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 115-96-22946

נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.