

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

إيموران أقراص 25 ملغ، 50 ملغ

كل قرص يحتوى على: 25 ملغ أو 50 ملغ آزاتيopyrine (Azathioprine) المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر - أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 في النشرة "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاجك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأى غرض مخصص الدواء؟

تأثيرات الدواء الطبية: تثبيط جهاز المناعة. هذا التأثير هو هام بعد زرع الأعضاء، حتى لا يرفض جهاز المناعة العضو المزروع. يستعمل إيموران أيضاً لمعالجة التهاب المفاصل الروماتيزمي الذي لا يستجيب لعلاجات أخرى - وذلك فقط من قبل طبيب مختص بأمراض الرئبة في المستشفى أو في العيادة.

الفصيلة العلاجية:

مثبطات جهاز المناعة (Immunosuppressants).

2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أيلرجي) لل المادة الفعالة آزاتيopyrin أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6).
- كنت حساساً (أيلرجي) لـ ميركابتوپورين (دواء مشابه لآزاتيopyrin، المادة الفعالة في إيموران).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

● قبل العلاج بـ إيموران، إحك للطبيب إذا

○ تلقيت مؤخر القاحاً أو إذا كنت مقبلاً على تلقي لقاح. لا يجوز تلقي لقاحات حية ضعفة (مثل الإنفلونزا، الحصبة، BCG وغيرها) خلال العلاج بـ إيموران حتى يؤكد الطبيب بأن هذا الأمر آمن بالنسبة لك، لأن بعض اللقاحات قد تؤدي إلى تلوثات خلال العلاج بـ إيموران.

○ كنت تعاني من متلازمة تسمى Lesch-Nyhan. إنها حالة وراثية نادرة لنقص في مادة تسمى HPRT (hypoxanthine-guanine-phosphoribosyltransferase).

○ كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلية.

○ كنت تعاني من متلازمة تسمى TPMT. هذه حالة ينتج فيها جسمك أقل مما ينبغي من الإنزيم المسمى Thiopurine methyltransferase.

○ عانيت ذات مرة من جدرى الماء أو من عقبولة المنطقة.

○ عانيت في الماضي من اليرقان B (التهاب الكبد B - التهاب الكبد الناجم عن فيروس).

○ كنت مقبلاً على إجتياز عملية جراحية، لأن بعض الأدوية، بما في ذلك توبوكورارين أو سوكسينيل كولي، التي تعطى في العمليات الجراحية لإرخاء العضلات، يمكن أن تؤثر على عمل إيموران. يجب إطلاع الطبيب المخدر إذا كنت تتناول إيموران قبل العملية الجراحية.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك، إستشر طبيبك، الممرضة أو الصيدلي قبل تناول إيموران.

خلال فترة العلاج بـ إيموران، يصدر لك الطبيب تعليمات بإجتياز فحوص دم روتينية من أجل متابعة حالتك (بالإضافة لذلك أنظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء؟"). عادة تقل وتيرة الفحوص كلما طالت فترة العلاج.

إذا كنت تلتقي علاج لتثبيط جهاز المناعة، فإن إيموران قد يزيد الخطورة لديك لـ :

● أورام، بما في ذلك سرطان الجلد. إذا، خلال العلاج بـ إيموران تجنب التعرض المطول لضوء الشمس، ارتدي ملابس واقية وإستعمل كريم واقي ذو عامل وقاية مرتفع.

● إضطرابات تكاثر خلايا الدم البيضاء (lymphoproliferative disorders):

○ يزيد العلاج بـ إيموران خطورة حدوث سرطان من نوع معين (lymphoproliferative disorder). عندما يشمل العلاج عدة أدوية التي تثبّط جهاز المناعة (بما في ذلك ثيوپوريّنات)، فإن هذه الحالة قد تؤدي إلى الوفاة.

○ مشاركة لعدة أدوية لتثبيط جهاز المناعة التي تعطى سوية، يزيد الخطورة لإضطرابات في الجهاز الليمفاوي جراء تلوث فيروسي [إضطرابات تكاثر اللمفافيّات ذات صلة بفيروس إيبشتاين - بار (EBV)].

● تطور حالة خطيرة تسمى متلازمة تنشيط البلاعم (Macrophage Activation Syndrome) (فترط تفعيل خلايا الدم البيضاء ذات الصلة بعمليات التهاب)، عادة تحدث لدى أشخاص يعانون من أنواع معينة من التهاب المفاصل، تلوث خطير بجدرى الماء أو الهرپيس النطيلي. لذلك، خلال العلاج بـ إيموران يجب الإمتناع عن ملامسة أي شخص يعاني من جدرى الماء أو الهرپيس النطيلي.

● إذا مرضت في الماضي باليرقان B، فإن المرض قد يصبح نشطاً ثانية.

إذا كنت تتناول أو كنت تنوّي تناول:Ribavirin (Ribavirin) لعلاج الأمراض الفيروسية.

● ميتوترىكسات (Methotrexate) يستعمل بشكل أساسى لعلاج السرطان.

● ألويپوريّنول (Allopurinol)، أوكسىپوريّنول (Oxipurinol)، تيوبوريّنول (Thiopurinol) أو مثبطات كسانتين أوكسيداز أخرى مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس.

● بيسييلامين (Penicillamine) يستعمل بشكل أساسى لعلاج التهاب المفاصل الروماتزمى.

● مثبطات ACE التي تستعمل بشكل أساسى لمعالجة إرتفاع ضغط الدم.

● مضادات التخثر مثل وارفارين (Warfarin) أو أسينوكومارول (Acenocoumarol) لمنع تشكيل الخثرات الدموية.

● سيميتيدين (Cimetidine) لعلاج القرحات المعدية والمشاكل الهضمية.

● إيندوميتاسين (Indomethacin) يستعمل لتسكين الآلام ومضاد للالتهاب.

● أدوية الركود الخلوي، لمعالجة أنواع معينة من السرطان.

● أمينوساليسيلات مثل أولسالازين (Olsalazine)، ميسالازين (Mesalazine) أو سولفاسالازين (Sulfasalazine) المستعملة بشكل أساسى لعلاج الأمراض المعاوية المسممة التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

● إنفليكسيماب (Infliximab) يستعمل بشكل رئيسي لعلاج الأمعاء التي تسمى التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

● قبل العملية الجراحية يجب إطلاع الطبيب المخدر، بذلك تخضع للعلاج بـ آزاتيopyrin، لأن المرحبيات العضلية التي تعطى خلال التخدير قد تتفاعل مع آزاتيopyrin.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول إيموران.

اللقالحات خلال العلاج بـ إيموران

إستشر الطبيب أو الممرضة قبل تلقي لقاح. لا يجوز تلقي لقالحات حية ضعفة خلال العلاج بـ إيموران (مثل الإنفلونزا، الحصبة، BCG وغيرها) حتى يؤكد الطبيب بأن هذا الأمر آمن بالنسبة لك، لأن بعض اللقالحات قد تؤدي إلى تلوثات خلال العلاج بـ إيموران.

إستعمال الدواء والطعام

لا يجوز تناول إيموران أقل من ساعة قبل أو أقل من ثلاثة ساعات بعد طعام أو شرب الحليب.

الحمل، الإرضاخ والخصوبة

إذا كنت حامل أو مرضعة، تعتقدين بأنك يمكن أن تصبحي حامل أو تخططين للحمل، يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بـ إيموران.

الحمل

يجب إستعمال وسائل منع حمل موثوقة لمنع حدوث حمل خلال تناولك أنت أو زوجك إيموران.

إذا كنت في فترة الحمل يدرس طبيبك بالإعتماد على مخاطر وفوائد العلاج فيما إذا يتوجب عليك تناول هذا الدواء.

الإرضاخ

قد تنتقل كميات قليلة من إيموران إلى حليب الأم. توصى النساء اللواتي يتناولن إيموران بالإمتناع عن الإرضاخ إلا إذا كانت الفوائد تفوق المخاطر المحتملة على الطفل. إستشيري الطبيب قبل الإرضاخ.

الخصوبة وإستعمال الماكولات

لا يوجد تأثير معروف لتناول أقراص إيموران على القدرة على السيادة أو تشغيل الماكولات.

إذا كنت تقاسي من أي عرض جانبي نتيجة هذا الدواء، عليك الحذر وإذا دعت الحاجة الإمتناع عن السيادة وعن إستعمال الماكولات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

تحتوي الأقراص على لكتوز. إذا قيل لك بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، عليك إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج بـ إيموران.

● تلوثات أخرى مثل إلتهاب السحايا الفيروسي (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy, PML). إلتهاب السحايا الفيروسي قد يظهر في حالات يكون فيها جهاز الليمفاوي جراء تلوث فيروسي [إضطرابات تكاثر اللمفافيّات ذات صلة بفيروس إيبشتاين - بار (EBV)].

● تطور حالة خطيرة تسمى متلازمة تنشيط البلاعم (Macrophage Activation Syndrome) (فترط تفعيل خلايا الدم البيضاء ذات الصلة بعمليات التهاب)، عادة تحدث لدى أشخاص يعانون من أنواع معينة من التهاب المفاصل، تلوث خطير بجدرى الماء أو الهرپيس النطيلي.

● إذا كنت تتناول أو كنت تنوّي تناول:Ribavirin (Ribavirin) لعلاج الأمراض الفيروسية.

● ميتوترىكسات (Methotrexate) يستعمل بشكل أساسى لعلاج السرطان.

● ألويپوريّنول (Allopurinol)، أوكسىپوريّنول (Oxipurinol)، تيوبوريّنول (Thiopurinol) أو مثبطات كسانتين أوكسيداز أخرى مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس.

● بيسييلامين (Penicillamine) يستعمل بشكل أساسى لعلاج التهاب المفاصل الروماتزمى.

● مثبطات ACE التي تستعمل بشكل أساسى لمعالجة إرتفاع ضغط الدم.

● مضادات التخثر مثل وارفارين (Warfarin) أو أسينوكومارول (Acenocoumarol) لمنع تشكيل الخثرات الدموية.

● سيميتيدين (Cimetidine) لعلاج القرحات المعدية والمشاكل الهضمية.

● إيندوميتاسين (Indomethacin) يستعمل لتسكين الآلام ومضاد للالتهاب.

● أدوية الركود الخلوي، لمعالجة أنواع معينة من السرطان.

● أمينوساليسيلات مثل أولسالازين (Olsalazine)، ميسالازين (Mesalazine) أو سولفاسالازين (Sulfasalazine) المستعملة بشكل أساسى لعلاج الأمراض المعاوية المسممة التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

● إنفليكسيماب (Infliximab) يستعمل بشكل رئيسي لعلاج الأمعاء التي تسمى التهاب القولون التقرحي أو داء كرون.

● قبل العملية الجراحية يجب إطلاع الطبيب المخدر، بذلك تخضع للعلاج بـ آزاتيopyrin، لأن المرحبيات العضلية التي تعطى خلال التخدير قد تتفاعل مع آزاتيopyrin.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ما ذكر أعلاه ينطبق عليك، إستشر طبيبك أو الصيدلي قبل تناول إيموران.

التدخّلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

إذا كنت تتناول أو إذا كنت تتناول مثبطات كسانتين أوكسيداز (مثل فيبوكسوستات (Febuxostat)، المستعملة لمعالجة مرض النقرس) مع إيموران، يجب إبلاغ الطبيب عن ذلك قبل بدء العلاج.

الفحوص والمتابعة

أثناء فترة العلاج بهذا الدواء وبعد ذلك يجب الحرص على إجراء فحوص الدم - يجب إجراء فحوص دم بوتيرة أسبوعية في الأسبوع الثمانية الأولى لتناول الدواء.

في حال إستعمال جرعة دوائية عالية أو في حال وجود قصور كبد أو كلوي، فيجب إجراء فحوص دم بوتيرة أكبر. بعد ذلك يجب إجراء فحوص دم مرة في الشهر أو على الأقل مرة كل ثلاثة أشهر. يجب إجراء فحص وظائف الكبد لمرضى لديهم خلل في وظائف الكبد. لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال إيموران قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تندesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا كنت تلاحظ الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، من الجائز أن تحتاج لعلاج طبي طارئ :

• ردود فعل تحسسية (أعراض جانبية غير شائعة من شأنها أن تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100)، العلامات يمكن أن تشمل:

- إرهاق عام، دوار، غثيان، تقيؤات، إسهال أو ألم في البطن
 - إنفاس حاد في الشفتين
 - إحمرار الجلد، آفات جلدية أو طفح جلدي (يشمل حويصلات، حكة وتقشر الجلد)
 - آلام عضلية أو مفصلية
- ظهور مفاجئ لصفير أثناء التنفس، سعال أو صعوبات في التنفس

في حالات صعبة يمكن أن يشكل رد الفعل خطراً على الحياة (نادر، من شأنه أن يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000).

• إحمرار أو طفح جلدي، قد يتطور إلى رد فعل جلدي يشكل خطراً على الحياة حيث يشمل طفح منتشر مع حويصلات وتقشر للجلد، خاصة في منطقة الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس - جونسون) تقشر واسع للجلد (إنحلال البشرة النخري السمي) (هذه أعراض جانبية نادرة جداً التي من شأنها أن تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000).

• إضطرابات في الدم ونخاع العظم، العلامات تشمل: ضعف، إرهاق، شحوب، ظهور كدمات بسهولة، نزف غير اعتيادي أو تلوثات (أعراض جانبية شائعة جداً - من شأنها أن تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10).

• عندما يستعمل إيموران للعلاج بمشاركة مثبتات إضافية لجهاز المناعة فأنت معرض لخطورة الإصابة بمرض فيروس يلحق الضرر بالدماغ. العلامات يمكن أن تكون: صداع، تغيرات في السلوك، خلل في النطق، تدني القدرات الإدراكية مثل الذاكرة، التركيز وإتخاذ القرارات (تراجع إدراكي). هذه الحالة (تسمى JC virus associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy) من شأنها أن تؤدي إلى الوفاة (عرض جانبي نادر جداً الذي من شأنه أن يظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10,000).

يجب التوجه حالاً إلى الطبيب المعالج أو إلى الطبيب المختص إذا لاحظت الأعراض الجانبية الخطيرة التالية، من الجائز أن تحتاج إلى علاج طبي طارئ :

• لديك سخونة أو أي علامة أخرى لتلوث مثل ألم في الحنجرة، ألم في الفم، مشاكل في الجهاز البولي، أو تلوثات في الجهاز التنفسي التي تؤدي إلى ضيق في التنفس وسعال (أعراض جانبية شائعة جداً - من شأنها أن تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10).

• مشاكل في الكبد لديك، العلامات تشمل إصفرار الجلد والجزء الأبيض من العين (يرقان) (عرض جانبي غير شائع - من شأنه أن يظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100).

• سرطان من أنواع مختلفة يشمل الدم، الليمفا وسرطان الجلد (أنظر أيضاً الفقرة 2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء") (أعراض جانبية نادرة التي من شأنها أن تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000).

• متلازمة سويت (Sweet's syndrome)، تسمى أيضاً febrile neutrophilic dermatosis. من شأنه أن يتتطور لديك طفح (بارز وأحمر، مع كتل وردية أو بنفسجية ومؤلمة للمس)، خاصة في منطقة الذراعين، اليدين، الأصابع، الرقبة والوجه، الذي من شأنه أن يترافق بسخونة [عرض جانبي شائع غير معروف (لم يحدد بعد)].

• ورم لمفي من نوع معين (lymphoma). من شأنه أن يتتطور لديك رعا، إرهاق، تعرق ليلى ملحوظ، إنخفاض في الوزن، وسخونة مرتفعة بدون سبب واضح [عرض جانبي شائع غير معروف (لم يحدد بعد)].

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا لاحظت الأعراض الجانبية التالية

أعراض جانبية إضافية

• أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين 10.

• نسبة منخفضة لكمية خلايا الدم البيضاء في فحوص الدم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تلوث.

أعراض جانبية شائعة (common) - تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10

• غثيان.

أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 100

• فقر الدم، إنخفاض نسبة كريات الدم الحمراء.

• إلتهاب البنكرياس (pancreatitis) الذي قد يؤدي إلى ألم حاد في أعلى البطن.

أعراض جانبية نادرة (rare) - تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 1,000

• قد تلاحظ تساقط الشعر أثناء تناول إيموران. في أحياناً متقاربة ينمو الشعر ثانية بالرغم من مواصلة إستعمال الدواء. إذا كنت قلقاً إستشر الطبيب.

أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - تظهر لدى حتى مستعمل واحد من بين 10,000

• تضرر الأمعاء الذي قد يؤدي إلى إسهال، ألم في البطن، إمساك، غثيان وتقيؤات (يمكن أن يدل على ثقب في الأمعاء).

أعراض جانبية شيوخها غير معروفة (لم يحدد بعد).

• حساسية لضوء الشمس وكل ضوء آخر.

• من شأنك أن تتطور طفح (بارز وأحمر، مع كتل وردية أو بنفسجية ومؤلمة للمس)، خاصة في منطقة الذراعين، اليدين، الأصابع، الرقبة والوجه، الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ الشركة بواسطة العنوان التالي:

Padagis.co.il

5) كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية وتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة والبليستر. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية. يجب الحماية من الضوء.

• لا يجوز رمي الأدوية في القمامات أو في منظومة الأنابيب البيئية. إسأل الصيدلي حول كيفية التخلص من الدواء. تساعد هذه الوسائل في الحفاظ على البيئة.

• طلاء قرص إيموران 25 ملغ يحتوي على: Opadry orange 06B230003 (hypromellose, titanium dioxide, macrogol 400, iron oxide yellow, iron oxide red).

• طلاء قرص إيموران 50 ملغ يحتوي على: Hypromellose, macrogol 400.

• كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

قرص إيموران 25 ملغ هو قرص برتقالي، مستدير، محدب، بدون خط للشطر معلم بـ 2 IM.

قرص إيموران 50 ملغ هو قرص أصفر، مستدير، محدب، مع خط للشطر معلم بـ 5 IM.

توفر الأقراص ضمن عبوات لوحة - بليستر. كل عبوة تحتوي 100 قرص.

• صاحب الإمتياز: وكالات باداچيس إسرائيل م.ض.، شارع راكيفيت 1، شوهم.

• إسم المنتج: أسيپ فارما تريدينچ م.ض.، دبلن، إيرلندا.

• تم إعدادها في آب 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: إيموران أقراص 25 ملغ: 3479.25384

إيموران أقراص 50 ملغ: 4265.22964

• من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.