

• און להשתמש בתרופה אחרי תאריך התגובה
(exp. date) המופיע על גבי האזינה.
תאריך התגובה מתייחס ליום האחרון של
אותו חודש.

- אחסן בקבוק קריר, מתחת ל- 25°C.
- סגור היטב.
- זיהורית! חומר דליק, הרחק משא.
- אחסן באזינה המקורית.
- ניתן להשתמש במוצר לאחר הפתיחה,
עד שפג תוקפו.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומרים הפעילים בתרופה מכילה
גם:
Glycerin, Propylene Glycol, Brilliant blue, Purified water.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזינה:
תמונה ב痼ע כחול
תכלואה: 500 מ"ל, 1000 מ"ל.

היצן ובעל הרישום:
ב-شمונע פלורוש בע"מ, פארק תעשייה משגב,
ד.ג. משבガ 2017400.

עלון זה נערך ב- 11.22 בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות
המלכתי במשרד הבריאות: 1085829253

לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נסוח
בלשון צ'כית. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני
שנים מינימום.

• אם אתה לוקת, או אם לך כתף לאחרונה,
תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם
ותוסיפו תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח

• מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של
התרופה: מיל איכרול, זומר דליק.

3. כיצד תשימוש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח
אם איןך ברוחה,

אופן השימוש:
זוקן 3 מ"ל מתחכשיר על ידיים נקיות,
פזר התהמיסה על כל משטחי היד וחック הידיים
עד התדרופת מוחלטת של החומר.
אין לעובר על המנה הממלצת.
אין לבלאו.

התרופה מיועדת לשימוש חיוני בלבד.
אם נולתנת יורה או אם בטשעת בעל ילד מין
התרופה, פורה ייד לרופא או לרדר מין של בית
חולים והבא תרופות בחושך! בדקתו הותיק והמנה
בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים

אינו ליטול תרופות בחושך! בדקתו הותיק והמנה
התרופה, פורה ייד לרופא או לרדר מין של בית
חולים והבא תרופות נסוכות בוגנע לשימוש
בתרופה, היועץ עליון לרופא או לרוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו כל רפואי, השימוש בספטדין עלול לגרום
לתופעות לאו-ברחיק מהמשמעותיים. אם תtblה
לקראת רשותת תופעות הללו, יתכן ולא סבוי
מאך אחרות מונן.

של שופט דין את השימוש ולפנות לרופא:

• במרקחה של רישיון בערו (MRI)

תופעות לוואי ונסוכות:

אדמדומיות וגירוי מוקומי.
אם אתה מטופעת לאו-ברחיק מהמשמעותיים, או כאשר
אתה סובל מטופעת לאו-ברחיק הוכרה בעלוון,

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוחות על תופעות לוואי למשרד הבריאות
באבעזרת הוויפס. המוקון לדוחות על תופעות
לוואו שמנציא בדף הבית של אתר משרד

הבריאות או www.health.gov.il:

או ע"י כניסה לkishoro:

/https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

• מניע הרעלין!
תרופה זו או תרופה אחרת יש לשמור במקום
סגור מחוץ ליזיג ידים של ילדים ו/או תינוקות
ועל ידיך תמנע הרעלין. אל תגוזם להתקאה
ללא הוראה מפורשת מרופא

עלון לצריך לבי תקנות הרוקחים
(תיכשורים התשמ"י - 1986)

התרופה משווקת ללא מרשם רפואי

СПДДИ

תמציה

הרכוב:

החוורמים הפעילים ורכיביהם:

כלורhexידין דילוקונאט v/w 0.5%

(Chlorhexidine Digluconate 0.5 w/v (v/v)

אלכוהול 70% v/v (v/v)

לרשימת החומרים הבaltı פעילים:
ראה סעיף 6 "מיינע נסוף".

קיים בעיון את העיון עד סוף בטראם

תשימוש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתו על התרופה. אם יש

לה שאלות נסוכות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך לשימוש ברכישר בצרור ונכונה. הייעוץ

ברוקחך אם רצוק דקוק לעידן נסוף.

1. מהו מיעד התרופה?

התרופה מיועדת להציגו של הידים,
גם לפני פעולות רפואיות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
קובוצה תרפיטית - תכשירים אנטיספטים.

2. לפניה שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה:

• אם אתה רגש (אלרגיה) לחומר הפעיל או
לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילוה
התרופה. לשימוש החומרים הבaltı פעילים
עליך שחקק עין עם הרופא.

- ראה סעיף 6 "מיינע נסוף".

• על קרטמות ה双手, קרום המיטה
וה恍ון התינוק.

• בתינוקות מתחת לגיל חודשים.

3. אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש

בתרופה:

• יש להמנע מגע עם העיניים.
במרקחה של מגע, יש לשוטוף עם הרובה מים.

• אם גבר או גברת מלחין להרפה כלשהן,
עליך להודיע על כך לרופא לפני שימוש התרופה.

• אין להדליק סיגריה או להיחשף לאש עד יבש

מוחלט של התכשיר.

