

Инструкция по применению в соответствии с Положением о фармацевтах (препараты) 1986 г.

Препарат распространяется без рецепта врача

Септадин

Раствор

Состав:

Активные ингредиенты и их концентрация:

Хлоргексидина биглюконат 0,5%
(Chlorhexidine Digluconate w/v 0.5%)
Спирт 70% (Alcohol 70%).

См. список неактивных ингредиентов в п. 6: "Дополнительная информация"

Перед использованием препарата внимательно прочтите инструкцию до конца.

Данный вкладыш содержит краткую информацию о препарате.

Если у вас имеются дополнительные вопросы, обращайтесь к врачу или к фармацевту. Вы должны использовать данный препарат правильным образом. Если вам необходима дополнительная информация, проконсультируйтесь с фармацевтом.

1. Для чего предназначен данный препарат?

Препарат предназначен для быстрой дезинфекции рук, включая предоперационную обработку

Терапевтическая группа

2. Перед использованием препарата

Не используйте препарат:

- если у вас имеется чувствительность (аллергия) к активному ингредиенту или к любому из дополнительных ингредиентов, содержащихся в препарате.

Для информации о неактивных ингредиентах см. пункт 6: "

"Дополнительная информация"

- на мозговой ткани, мозговой оболочке и в среднем ухе.

- Младенцам в возрасте до двух месяцев.

Особые предостережения относительно применения данного препарата

Избегайте контакта с глазами. В случае контакта с глазами тщательно промойте глаза большим количеством воды.

- Если у вас имеется чувствительность к какому - либо пищевому продукту или лекарству, сообщите об этом врачу перед применением препарата.

- Не зажигайте сигарету и не подвергать воздействию огня до полного высыхания продукта.

Если вы принимаете или недавно принимали другие препараты, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Важная информация о некоторых ингредиентах лекарства

Содержит спирт - горючий материал.

3. Использование лекарственного препарата

Если вы не уверены в том, как надо использовать препарат, обращайтесь к врачу или фармацевту.

Инструкция по применению:

Налейте 3 мл препарата на чистые руки, распределите его по всей поверхности рук и растирайте до полного испарения.

Не превышайте рекомендуемую дозу.
Не глотать. Препарат предназначен только для наружного применения.

В случае передозировки или если препарат случайно проглатил ребенок, немедленно обратитесь к врачу или в приемный покой больницы и принесите с собой упаковку препарата.

Не принимайте лекарства в темноте!
Проверяйте этикетку и дозу при каждом приеме препарата. Наденьте очки, если вы в них нуждаетесь.

Если у вас имеются дополнительные вопросы в отношении использования препарата, обращайтесь к врачу или к фармацевту.

4. Побочные явления:

Как и любое другое лекарство, "Септадин" может вызывать у некоторых людей побочные явления.
Не пугайтесь, читая список побочных явлений. Возможно, ни одно из них у вас не проявится.

Прекратите использование и обратитесь к врачу:

- в случае чувствительности на коже (редко).

Дополнительные побочные явления:
покраснение и местное раздражение.

Если одно из побочных явлений усиливается или если вы страдаете от побочных явлений, не упомянутых в инструкции, просьба проконсультироваться с врачом. О побочных явлениях можно сообщить посредством специализированной он-лайн формы, которая находится на домашней странице сайта Министерства здравоохранения www.health.gov.il или перейти по ссылке:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

• Избегайте отравления! Данный препарат и любые другие лекарства необходимо хранить в закрытом и недоступном для детей и/или младенцев месте во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без четкого указания врача.

• Не используйте лекарство после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

• Храните препарат в прохладном месте при температуре ниже 25°C.

• Плотно закрывайте, чтобы избежать проникновения и влажности.

• Осторожно! Горючее вещество.
Хранить вдали от огня.

• Хранить в оригинальной упаковке.

• После вскрытия упаковки можно использовать препарат до истечения срока годности.

6. Дополнительная информация

Помимо активных веществ, препарат содержит также:

Глицерин, пропиленгликоль,
бривилантовый синий,
дистиллированная вода.

Внешний вид раствора и содержание упаковки
Раствор синего цвета
Упаковка по 500 мл, 1000 мл

Производитель и владелец лицензии:

"Бен - Шимон Флориш" Ltd.,
промышленный парк Мисгав,
ПОС: Misgav 2017400.

Данная инструкция отредактирована
министерства здравоохранения в
соответствии с указаниями: 11.2022

Номер регистрации фармацевтического
препарата в государственном
реестре лекарственных препаратов
Министерства здравоохранения
Израиля: 1085829253

