



עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (חכיריים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

בוסטריקס

תרחיף להזרקה

כל מנה (0.5 מ"ל) מכילה:

IU 2 diphtheria toxoid – NLT 2 IU (טוקסואיד דיפתיריה)

IU 20 tetanus toxoid – NLT 20 IU (טוקסואיד טטנוס)

8 mcg pertussis toxoid (PT) – 8 mcg (טוקסואיד שעלת)

8 mcg filamentous hemagglutinin (FHA) – 8 mcg (טוקסואיד FHA)

2.5 mcg pertactin (PRN, or 69kDa OMP) – 2.5 mcg (טוקסואיד PRN)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – " מידע נוספת".
קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או הרוקח.
תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

לחיסון דחף כנגד דיפתיריה (קרמת), טטנוס (פלצת) ושעלת של יחידים הנitinן החל מגיל ארבע שנים.

המתן צריך להתבסס על המלצות הרשומות.

קבוצתית (bacterial vaccines, pertussis החיסוני שעלת vaccines) – חיסונים חידקיים, חיסוני

כיצד החיסון עובד?

הчисון עובד על ידי כך שהוא גורם לגוף ליצור הגנה משלו (נוגדים) כנגד מחלות אלה (דיפתיריה, טטנוס ושעלת).

אף אחד ממרכיבי החיסון אינו יכול לגרום למחלות אלה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בבוסטריקס אם:

- אתה או יילדך חוויתם בעבר תגובה אלרגית כלשהי לבוסטריקס, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכיל החיסון (מפורט בסעיף 6), או לפורמאלדהיד.
- סימנים לתגובה אלרגית יכולים לכלול: פריחה עורית מגדרת, קוצר נשימה ונפיחות של הפנים או הלשון.

- אתה או ילך חוותם בעבר תגובה אלרגית לחיסון כלשהו כנגד המחלות דיפתירה, טטנוס או שעלה.
- אתה או ילך חוותם בעיות של מערכת העצבים (אנצפלופתיה) בתוך 7 ימים לאחר התחסנות קודמת עם חיסון כנגד מחלת השעלת.
- אתה או ילך סובלים מזיהום חמור עם חום גבוה (מעל 38 מעלות צלזיוס). זיהום קל לא אמרת להוות בעיה, אולם יש לדבר עם הרופא תחילה.
- אתה או ילך חוותם ירידה זמנית בטסיות הדם (אשר מעלה את הסיכון לדימומיים או חבורות) או בעיות במוח או העצבים לאחר התחסנות קודמת עם חיסון כנגד דיפתירה ו/או טטנוס.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני שאתה או ילך מתחנסים בבוסטריקס, ספר לרופא או לרוקח אם:

- לאחר חיסון קודם עם בוסטריקס או חיסון אחר כנגד מחלת השעלת, אתה או ילך סבלתם מביעות כלשהן, במיוחד:
 - חום גבוה (מעל 40 מעלות צלזיוס) בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - התמוטטות או מצב דמוי הלם בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - בכיכי מתensus הנמשך 3 שעות או יותר בתוך 48 שעות מההתחסנות.
 - פרוכסימים/תקפתיים עם או ללא חום גבוה, בתוך 3 ימים מההתחסנות.
- ילך סובל ממחלה לא מאובחנת או מתקדמת של המוח או מאפילפסיה שאינה בשליטה. לאחר שהמחלה תהייה בשליטה, ניתן החיסון.
- לך או לילך יש בעיה של דימום או שנוצרות לכם תבורות בклות.
- לך או לילך יש נטייה לפרוכסימים/תקפתיים כתוצאה מחום או אם קיימת היסטוריה משפחתית לכך.
- לך או לילך יש בעיות ממושכות של מערכת החיסון מסיבה כלשהי (כולל זיהום בגין ה-HIV [כשל החיסוני האנושי]). אתה או ילך עדין יכולים לקבל בוסטריקס, אולם ההגנה כנגד זיהומים לאחר התחסנות עשויה להיות לא מספיק טובה כמו בילד או במבוגר עם מערכת חיסונית טובה כנגד זיהומים.

התעלפות עלולה להתרכש (בעיקר במתבגרים) לאחר, ואפילו לפני, כל זריקה עם מחלת. לכן דוחה לרופא או לאחות אם אתה או ילך התעלפתם בזמןן זריקה קודמת. בדומה לחיסונים אחרים, יתכן שbosstrix לא יגן באופן מלא על כל האנשים שמתחנסים.

אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה או ילך לוקחים או אם לקחתם לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. בוסטריקס יכול להינטן באותו הזמן עם חיסונים אחרים. אתר הזרקה אחר ישמש לכל סוג חיסון.

בostonicus עשוי לא לפעול מספיק טוב, אם אתה או ילך גוטלים תרופות אשר מפחיתות את הייעילות של מערכת החיסון שלך/שליהם להילחם בזיהום.

היריון והנקה

הרופא ישוחח עימך לגבי הסיכונים והיתרונות האפשריים בקבלת Bostonicus בזמן ההיריון. אם את בהיריון או מניקה, חושבת שיתכן שאתה בהיריון או אם אתה מתכוון להרות, התייעצֵי עם הרופא או הרוקח לפני התיחסנות בתרופה זו. לא ידוע אם Bostonicus עבר לחלב האם. הרופא ישוחח עימך לגבי הסיכונים והיתרונות האפשריים בקבלת Bostonicus במהלך הנקה.

נהיגה ושימוש במכונות

לא סביר שתרופה זו תשפי על יכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, שכן ניתן לומר כי הוא למעשה נטול נתרן.

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל עבורך או עבור ילך הוא בדרך כלל זריקה בודדת של Bostonicus.

- Bostonicus יינתן בזירה לתוך השדרה.

- אסור להזריק את החיסון לכלי הדם.

- הרופא יודיע אם אתה או ילך קיבלתם בעבר חיסון נגד דיפתיריה, טטנוס או שעלה.

- ייתכן ששישתמו בוostonicus במקרה של חשד לziehום עם טטנוס, אולם ישמשו גם באמצעות נוספים כגון חבישה מורכבת של הפצע ו/או שימוש באנטי טוקסין לטטנוס, על מנת להקטין את הסיכון להתקפות המחלת.

- הרופא ייעץ לך לגבי חזרה על התיחסנות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

יש לנער לפני שימוש.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווות והמנה בכל פעם שהן גוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, הייעוץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בוostonicus עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. ייתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

כמו בכל החיסונים להזרקה, תגבות אלרגיות חמורות (תגובה אנפיפילקטית ואנפיפילקוטואידית) עשויות להתרחש בתדירות מאד נדירה (עד 1 מתוך 10,000 מנות של החיסון). ניתן להזות זאת על ידי:

- פריחה שלולוה להיות מגדרת או עם שלפוחיות
- נפיחות של העיניים והפנים
- כאב רأس או בליעה
- ירידת פתאומית בלחץ הדם ואובדן ההכרה.

תסמינים אלה עשויים להתרחש עד במרפאה. אולם יש לפנות מיד לרופא אם הם מתרחשים אצלך או אצל ילך.

תופעות לוואי שהתרחשו בניסויים קליניים בילדים מגיל 4 עד 8 שנים.

תופעות לוואי שכיחות מאד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מכל 10 מנות של החיסון:

- כאב, אדמומיות ונפיחות באזור ההזרקה
- רגונות
- ישונניות
- עיריפות

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 מנות של החיסון:

- אובדן תיאבון
- כאב ראש
- חום השווה או הגובה מ- 37.5 מעלות צלזיוס (כולל גם חום הגובה מ-39 מעלות צלזיוס)
- נפיחות גדולה של הגוף שבה ניתן החיסון
- הקאה ושלשול

תופעות לוואי לא שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 מנות של החיסון:

- זיהום של דרכי הנשימה העליונות
- הפרעה בקצב
- הפרשה עם גרד של העיניים וקרום על העפעפיים (דלקת של הלחמית)
- פריחה עורית
- גוש קsha באזור ההזרקה
- כאב

תופעות לוואי שהתרחשו בניסויים קליניים מבוגרים, בני נוער וילדים מגיל 10 שנים ומעלה

תופעות לוואי שכיחות מאד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ 1 מכל 10 מנות של החיסון:

- כאב, אדמומיות ונפיחות באזור ההזרקה
- כאב ראש
- עיריפות

- הרגשה כללית לא טובה

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 מנות של החיסון:

- חום השווה או הגבוה מ-37.5 מעלות צלזיוס
- סחרחוורת
- בחילה
- גוש קשה ומורסה (אבץ) באזור ההזרקה

תופעות לוואי לא שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 מנות של החיסון:

- חום הגבוה מ-39 מעלות צלזיוס
- כאב
- נוקשות מפרקים ושרירים
- הקאה
- שלשול
- נוקשות מפרקים, כאב מפרקים, כאב שרירים
- גרד
- הזעת יתר (היפרהיידרוזיס)
- פריחה עורית
- נפיחות של בלוטות בצוואר, בבית שחי או במפשעה (לימפדנופתיה)
- כאב גרון וחוסר נוחות בעת בילעה (פריגנטיס)
- זיהום בדרכי הנשימה העליונות
- שיעול
- התעלפות (סינוקופה)
- תסמינים דמיי שפעת, כגון חום, כאב גרון, נזלת, שיעול וצמרמוורות

תופעות הלוואי הבאות התרחשו במהלך שימוש שגרתי של בוסטריקס ואיין ספציפיות
לקבוצת גיל כלשהי:

- נפיחות של הפנים, שפטים, פה, לשון או גרון, אשר עלולה להוביל לקושי בבליעה או בנשימה (אנגיואדמה)
- התמוטטות או תקופות של חוסר הכרה או חוסר מודעות
- פרכוסים או התקפים (עט או ללא חום)
- גבשושיות מגדרות – אורטיקרייה (חרלה)
- חולשה לא רגילה (אסתנניה)

לאחר מתן של חיסון נגד טטנוס, דלקת זמנית של העצבים, הגורמת לכאב, חולשה ושיתוך של הגפיים שלעיתים קרובה מתקדמת לחזה והפנים, דווחה בתדיורות מאוד נדירה (עד 1 מתוך 10,000 מנות של החיסון) (תסמנות גיליאן-בארה).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחייבת או כאשר אתה סובל מהתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המくん לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוחהראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן במקדר (בין 2°C ל-8°C). אין להקפיא.
- יש לאחסן באריזה המקורית על מנת להגן מאור.
- יש לנער לפני השימוש.
- אין להשיליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוספת

- נוסף על המרכיבים הפעילים, התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, aluminium (as aluminium salts), water for injection

ראה גם סעיף 2 בעلون – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
בוסטריקס לאחר נייר הינו נוזל��ור עם משקעים לבנים ששווקים לאט. לאחר משקע הנוזל העליון חסר צבע.
bosstrikss magen b'mazrik mogen le'shimush (0.5 ml) au bekkavon.

סוגי אריזה:
10 מזרקים. ניתן שהאריזה תכיל גם מחט/מחטים.

10 בקבוקונים.

ניתכן שלא כל סוג האריזות משוווקים.

- בעל הרישום: גלקסומיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יוצר: גלקסומיתקלין ביולוג'יקס S.A., ריקנסרט, בלגיה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 121-34-30059
- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני המסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK.
© 2022 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלו.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Boostrix is for deep intramuscular injection preferably in the deltoid region. Prior to use, the vaccine should be at room temperature, and well shaken in order to obtain a homogeneous turbid white suspension. Prior to administration, the vaccine should be visually inspected for any foreign particulate matter and/or variation of physical aspect. In the event of either being observed, do not administer the vaccine.

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Boostrix PT V2A