

ليفيتيريم 250
ليفيتيريم 500
ليفيتيريم 1000

أعراض مطلية
المادة الفعالة وكيفيتها:

يحتوي كل قرص من ليفيتيريم 250 على levetiracetam 250 ملغم (levetiracetam 250 mg).

يحتوي كل قرص من ليفيتيريم 500 على levetiracetam 500 ملغم (levetiracetam 500 mg).

يحتوي كل قرص من ليفيتيريم 1000 على levetiracetam 1000 ملغم (levetiracetam 1000 mg).

المواد غير الفعالة وسبل التحضير: انظر الفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة الدوائية بامان حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تجنب هذه النشرة على معلومات خاصة عن الدواء. إذا توفر لديك أسلطة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وَصْفِ هذا الدواء للعلاج مرضك. لا تطعه للأخرين. لأنه قد يضر بهم.

الدواء غير مخصص للاستعمال لدى الرضع والأطفال الذين سُنُهم دون 4 سنوات.

1. لأي غرض مخصص هذا الدواء؟

1. كعلاج أحادي لأنواع مختلفة من المرض عند البالغين الذين سُنُهم فوق الـ 16 سنة.

2. كعلاج يضاف إلى أدوية أخرى مضادة للصرع لدى:

• المرضي البالغين والاطفال من سن 4 سنوات، المصابين بانواع معينة من مرض الصداع.

• المرضي البالغين والراهقين من سن 12 سنة، المصابين بالصرع من نوع Juvenile Myoclonic Epilepsy او Generalised Epilepsy .

• المرضي البالغين والراهقين من سن 12 سنة، المصابين بـ Idiopathic Generalised Epilepsy .

2. قبل استعمال الدواء أذن:

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت مساستاً (ارجي) لـ ليفيتيريم (levetiracetam) أو لـ پيروليلودين (pyrrolidone) أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر الفصل 6).

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

• كنت تعاني من حساسية مفرطة للصرع.

• كنت تعاني من خلل في وظيفة الكلى.

• شعرت بأعراض اكتئاب وأفكار انتحارية. عانى عدد صغير من الأشخاص الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل ليفيتيريم.

• أفكاك متيرورة أو انتحارية تجاه أنفسهم.

• تناولك أو أفراد عائلتك للشتنجات قد يؤدي إلى اردياد خطير حدوث افعال أو أفكاك انتحارية.

• طبلوك وعليك أفراد عائلتك الانتهاء إلى التشتنجات في المزاج وفي أنشطة

• يجب تناول الأدواء مع كمية كافية من الماء (كاس ماء).

• يجب تقسيم الجرعة الدوائية اليومية لجرعتين متلاقيتين وتناول جرعة في الصباح وجرعة في المساء. يجب المواظبة على تناول الدواء في أوقات محددة.

• ليفيتيريم أفراد اثنين غير ملائم لاستعمال لدى الأطفال دون عمر 6 سنوات، بسبب صعوبات البالغ.

• وجَدَ لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك، سابقة من عدم انتظام نظم القلب

(احبس فحص مخطط كهربائي القلب) أو إذا زُدَّ لديك مرض أو كنت تتناول دوارة قد تسبب عدم انتظام نظم القلب أو اضطرابات في توزن الملح.

- تفاقم أحد الأعراض الجانبية التالية أو اسْتَمَرَّ لكثير منها: افتقار غير عادي، شعور بسخاف أو رعد أو احتقان عالي، حدوث تغيرات حادة في مزاجك أو في ملوك.

• تفاقم المرض: في أي حالٍ، قد يتطلب تناوله في النوبات أو ارتفاع في وقته، تحديدًا خلال الشهر الأول بعد بدء العلاج أو بعد رفع الجرعة الدوائية. إذا طرأ ارتفاع في وقته النوبات خلال فترة العلاج مثل ارتفاع في درجة حرارتها أو في حالتها، يجب مراعاة

الطبيب المعالج في سرعة وقت ممكن في حالة ظهور علامة واحدة أو أكثر، من هذه العلامات، أو أي نمط تصرف في حالة ظهور علامة واحدة أو أكثر، من هذه العلامات، أو أي نمط تصرف

مقتضى آخر - يجب مراجعة الطبيب!

• **الأطفال والمرأة الحامل:** ليفيتيريم غير مخصص للعلاج الأحادي لدى الأطفال والمرأة الحامل دون 16 سنة.

• **نفايات الدواء:** قتل بين الأدوية

إذا كنت تستعمل الأن، أو قد استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، فالطبيب أو الصيدلي بذلك. خاصة إذا كنت تستعمل:

• ماكروجول (دواء يستحب الإسماه)، لا يجوز تناول ماكريوجول خلال ساعة

• تيموزولوميد. يجب إجراء تقييم دقيق قبل بدء العلاج المدمج، فليب إجراء فحوص روتينية لوظائف الكبد خلال فترة العلاج المدمج، والتفكير في إيقاف العلاج المدمج إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

• استعمال الدواء والطعام

• يجب تناول الأدواء مع كمية كافية من الماء (كاس ماء). يمكن تناول الدواء مع أو بدون الطعام.

• استعمال الدواء واستهلاكه الكحولي

• لا تناول معلومات عن تناول الدواء مع الكحول.

• **الحمل والإرضاع:** إذا كنت حاملاً، باربعية، تظنين أنك قد تكونين حاملاً أو تخططنين

الحمل، عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. يمكن استعمال ليفيتيريم خلال فترة الحمل، إذا اعتقد الطبيب بأن العلاج وأسبابه بعد تقييم دقق.

• لا يجوز إيقاف العلاج دون استشارة الطبيب، لا يمكن استبعاد امكانية التسبب في الاعادات الخلقية للجنين بشكل ثابت.

• لا يوصى بارتساع أثناء العلاج بـ ليفيتيريم.

• **المソ比ة واستعمال الماكينات:** قد يدخل ليفيتيريم ديكوكت على السياقة أو تتغلب الماكينات الخطيرة، لأنك قد تشعر بتعانقين. هذا العرض يظهر بالأساس في بداية العلاج وبعد زيادة الجرعة الدوائية لا يجوز لك السياقة أو تتغلب الماكينات الخطيرة حتى تشعر بذلك لتجنب هذه النشاطات.

• بالنسبة للأطفال، فيجب تجنبهم من ركوب الدراجة الهوائية أو اللعب بالقرب من الشارع وما شابه ذلك.

• **كيف تستعمل الدواء؟** يجب استعمال المستحضر دائياً وفق تعليمات الطبيب. يجب عليك

• شعرت بأعراض اكتئاب وأفكار انتحارية. عانى عدد صغير من الأشخاص الذين عولجوا بأدوية مضادة للصرع مثل ليفيتيريم.

• البرعاة الدوائية وكيفية العلاج سيحدثهما الطبيب فقط.

• **مِنْعَمْ تجاوز الجرعة الموصى بها:** كثرة التناول

• يجب تناول الأدواء مع كمية كافية من الماء (كاس ماء).

• يجب تقسيم الجرعة الدوائية اليومية لجرعتين متلاقيتين وتناول جرعة في الصباح وجرعة في المساء. يجب المواظبة على توقيتات في المزاج وفي أنشطة

• يُجَدَّدُ على نسبة الماء بحسب الماء.

• اكتتب أو تفاصيل الكتاب القائم، اشغال في موضوع الموت، التخيّل عن أملاك ممتنة أو تسلّمها.

• وجَدَ لديك أو لدى أحد أفراد عائلتك، سابقة من عدم انتظام نظم القلب

(الإعطاء المضطلة للأطفال دون عمر 6 سنوات، للأطفال والمرأة الحامل (بأعمار 6-17 سنة) الذين يقل وزنهم عن 50 كجم وعندما تكون هناك صعوبة في إعطاء جرعة دوائية دون احتقان بواسطة الأفراد).

• **مقدمة العلاج:** الرغبة في إعطاء جرعة دوائية يمكن شطر القرص. لا توجه معلومات حول سحق هرس القرص. قد تترك القرص المسحوق طعمًا مزًّا.

• **يُستَعْلَمُ بـ ليفيتيريم للعلاج المزمن.** يجب المواظبة على العلاج بـ ليفيتيريم ما دام الطبيب يرشدك إلى مواصلة العلاج.

• **لا تتناول العلاج دون إرشاد من الطبيب لأن إيقاف العلاج بهذا الشكل قد يزيد من النوبات.**

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو قاماً طفل بطلع الدواء بالخطأ، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأصطحب معك عبوة الدواء. الأعراض الجانبية المحدثة في حالة تناول جرعة دوائية مفرطة هي عسُل، عصبية، عدوانية، تقيّد في القطة، تقيّد في التنفس وغيبوبة.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، فلا تتناول جرعة مضاعفة. توجه إلى الطبيب كي يرشدك لما عليك فعله.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

• عند إيقاف العلاج، يجب التوقف عن تناول ليفيتيريم بشكل تدريجي لمنع ارتفاع النوبات.

إذا تقرر إيقاف العلاج، يجب إيقاف العلاج بـ ليفيتيريم، سيرشدك إلى كافية تقليل الاستعمال بشكل تدريجي.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! تحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة كنت بحاجة إليها.

إذا توفر لديك أسلطة إضافية حول استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل كل دواء، قد يؤدي استعمال ليفيتيريم إلى حدوث أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تتفاقم هذه الأعراض الجانبية. قد لا تعياني من أي منها.

يجب التوجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المorgue إذا عانيت من:

• ضعف، شعور بالدوار أو صعوبة في التنفس. قد تكون هذه علامات لردة فعل تحسّنی (انفاس) خطيرة.

• انتفاخ شفيف بالأنفونزا وطفح حاد على الوجه مصحوب بطفح واسع سخونه مترافق، مسميات متعددة لازمات الكبد وارتفاع من خلايا الدم البيضاء (الحمضات) في فحوص الدم وارتفاع الغدد الليمفاوية (متانزفات).

• انتفاخ في جسم البول، تعب، غثيان، تقيّد، ارتباك وانتفاخ الرجلين، الكاحلين والقدمين. قد تكون هذه علامات لانخفاض مخاطي في الوظيفة الكلوية.

• طفح حادى واسع مع حويصلات تبدو كأهداف صغيرة (قطاف غامقة erythema) محيطة بمنطقة فاتحة أكثر، تحيط بها حلقة غامقة (multiforme).

• طفح حادى واسع مع حويصلات وتقرّر الجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متانزفات، جونسون).

• طفح حادى أكثر خطورة يسبّب تقرّر الجلد في أكثر من 30% من مساحة الجسم.

• علامات تغيرات نفسية خطيرة أو إذا لاحظ شخص ما من المحيطين بك اعراض انتقامية، اتعاب، فضول، ذراقة، تقيّد في ذلك، حركات إرادية غير حساسة للسيطرة. قد تكون هذه أعراض الاعلال الدماغي.

• الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا هي التهاب في الأنف والبلعوم، نعس، تعب ودوران.

• قد تكون الأعراض الجانبية مثل النعاس، التعب والدوار أكثر شيوعًا في

بداءة العلاج أو عند رفع الجرعة الدوائية. تقل هذه الأعراض عادةً مع مرور الوقت.

اعراض جانبية شائعة جداً (very common) - اعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة:

• التهاب في الأنف والبلغم.

• نعاس، صداع.

اعراض جانبية شائعة (common) - اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100:

• فقدان الشهية (الشهق).

• اكتئاب، عدائية أو عدوانية، قلق، أرق، عصبية أو عدم الهدوء.

• تشتتات، اضطرابات في التوازن، دوار، خمول (lethargy) - حالة من انعدام الطاقة وانعدام الرغبة، ارتتجاف.

• فيرجو (شعور بالدوار).

• سعال.

• ألم في البطن، إسهال، اضطرابات في الهضم، تقيؤ، غثيان.

• طفح جلدي.

• ضعف وتعب.

اعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000:

• اضطرابات في عدد الصفائح في الدم، اانخفاض في عدد كريات الدم البيضاء.

• انخفاض أو ازدياد الوزن.

• محاولة انتحار واقتدار انتحارية، اضطراب نفسى، تصرف شاذ، هلوسات، غضب، ارتياخ، نوبة هلع، انعدام الاستقرار النفسي أو تغيرات في المزاج، انعدام الهدوء النفسي (هياج).

• فقدان الذاكرة (amnesia)، تضليل التناسق الحركي/عدم السيطرة على العضلات (الرنح)، شعور بالتنميل، عدم الترکيز.

• ازدواجية الرؤية، تشوش الرؤية.

• نتاج غير سليم/ارتفاع في فحص وظائف الكبد.

• تساقط الشعر، اكتيماء، حكة في الجلد.

• ألام في العضلات، ضعف العضلات.

• ميل للإصابات.

اعراض جانبية نادرة (rare) - اعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000:

• تلوّث.

• انخفاض في عدد كريات الدم من جميع الأنواع، RRD (Reticulocyte count), DRESS (DRESS syndrome)، رد فعل تأقى [رد فعل تحسسي خطير]، وذمة Quincke's oedema [انتفاخ الوجه، التشققات، اللسان والحنجرة]].

• انخفاض في تركيز الصوديوم في الدم.

• انتحار، اضطرابات في الشخصية، اضطرابات في التفكير (تفكير بطيء، عدم القدرة على الترکيز).

• هناب.

• اعتلال دماغي (انظر البند "يجب التوجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا عانيت من" لمعانينة الوصف المفصل للأعراض).

• تفاقم البواس او الارتفاع في وترتها.

• تقلصات في العضلات خارجة عن السيطرة تؤثر على الرأس، الجسم (الذبح) والأطراف، صعوبة في السيطرة على الحركة، فرط الحركة (فرط الحرaka).

• تغير في نظم القلب (مخلط كهربائية القلب).

• التهاب البنكرياس.

فشل كبدي، التهاب في الكبد (hepatitis).

انخفاض مفاجئ في الوظيفة الكلوية.

طفح جلدي (خامنوي متعدنة الأنكما) قد يتجلى على هيئة حويصلات

تبيّن لها طبقة غامقة، طفح جلدي واسع مصحوب بحويصلات وتقشر الجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس جونسون)، أو شكل أكثر خطورة يسبّب تقرّش أكثر من 30% من ساحة الجلد (متلازمة المبشرة التشنومية).

انحدار الربيادات (احتلال النسيج العضلي) وارتفاع الكرياتينوفوسوكيناز في الدم، هذه الظاهرة أكثر شيوعاً لدى مثلي العلاج اليابانيين بالمقارنة مع مثلي العلاج غير اليابانيين.

عرج أو صعوبة في المشي.

إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت

من عرض جانبى لم يذكر في هذه النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي

يوجه إلى الاستمارة المقترنة للتبليغ عن أعراض جانبية، وعن طريق الدخول إلى الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

يمكن التبليغ أيضاً عبر البريد الإلكتروني: safety@trima.co.il

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- تحتاج التسمى هذا الدواء، وكل دواء آخر، يجب حفظه في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأولاد / أو الأطفال و/ أو الأطفل و/ أو الأشخاص الذين لا يفهمون تعليمات صريحية من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- خزن في مكان جاف، في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. خزن في العلبة الأصلية.

6. معلومات إضافية:

يحتوى الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Maize starch, povidone, hypromellose, titanium dioxide, colloidal silicone dioxide, magnesium stearate, polyethylene glycol.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

ليفيتريم 250: قرص مطلي، مستدير، محظى من كلا الجانبين، أبيض مع خط للنثر من جهة واحدة.

ليفيتريم 500: قرص مطلي، مطاول، محظى من كلا الجانبين، أبيض مع خط للنثر من جهة واحدة.

ليفيتريم 1000: قرص مطلي، بيضوي، محظى من كلا الجانبين، أبيض مع خط للنثر من جهة واحدة.

الأقراص معبأة في شريط (بليستر) الومينيوم. تحتوي كل علبة على 60 قرصاً.

المنتج وصاحب الأمتياز وعنوانه: تريما منتجات طبية إسرائيلية معبروت. م.ض، معبروت 4023000، إسرائيل.

تم تحرير هذه النشرة في آب 2022 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة.

أرقام تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

ليفيتريم 250: 143.75.31935.00

ليفيتريم 500: 143.76.31936.00

ليفيتريم 1000: 143.77.31941.00

من أجل التبسيط وتيسير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.