

يسوق الدواء بدون وصفة طبيب أومبيراكس-Z، حبسولات، 20 ملغ

كل حبسولة تحتوي على: أومبيرازول (Omeprazole) بجرعة 20 ملغ.

- المواد غير الفعالة ومسببات الحساسية في الدواء
- انظر للبدن 6 "معلومات إضافية" وبدن 2 "معلومات مهمة حول جزء من مركبات الدواء".
- اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.
- كنت تتناول الطعام أو لديك تغير دموي.
- لديك براز دموي (إبراز دموي).
- كنت تعاني من إسهال وحمى أو متواصل، لأن استعمال أومبيراكس-Z يمكن أن يزيد قليلاً من الخطر (احتمال الخطر للإسهال نتيجة العدوى).
- كنت تعاني من مشاكل وخيمة في وظيفة الكبد.
- تأخر لديك في أي وقت مضى رد فعل جلدي بعد استعمال دواء أومبيراكس-Z الذي يقلل من إفراز الحمض في المعدة.
- كنت على وشك إجراء فحص دم معين (كروموجرافين A).
- كنت تعاني من الحرقنة لمدة تزيد عن 3 أشهر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاليف الجلدية.
- كنت تعاني من صغير في التنفس في أحيان متكررة، خصوصاً إذا كانت مصحوبة بحرقنة.
- كنت تعاني من غثيان أو تقيؤ.
- كنت تتناول أومبيراكس-Z لفترة طويلة جداً (أكثر من سنة) قد يظلم منك الطبيب أن تتواجد تحت رقبة طبية ثابتة. يجب التبليغ عن كل عرض جديد وشد في كل مرة ترى فيها طبيبك.

1. أضرار عرضي محتمل

الدواء يبطئ إفراز الحمض في الجوز البطني، أومبيراكس-Z محتمل تخفيف أعراض الارتجاع (مثل الحرقنة) والتي تظهر بوتيرة يومية في الإسهال أو الكلى المعدلين وغيره.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (رَجَباً) للمادة الفعالة (أومبيرازول) أو لأي من المواد في المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء (انظر للبدن 6 "معلومات إضافية").
- كنت حساساً (رَجَباً) للأدوية التي تحتوي على مشتقات مصنعة البروتونات (PPI) أخرى (مثل: فينتوبرازول، لاسوبرازول، رابيزيدازول، إيسوبميدازول).
- كنت تتناول دواء يحتوي على نيليفانتر (دواء لعلاج حالات عدوى الـ HIV).
- كنت تعاني من صعوبة أو ألم أثناء بلع الطعام، من تغير دموي أو من براز دموي أو أسود.
- لديك حرقنة مصحوبة بتشنج، تعرق أو دوخة.
- لديك ألم في الصدر أو في الأكتاف، المصحوب بضيق تنفس، تعرق، و ألم الذي ينتشر للذراعين، الرقبة أو الأكتاف، أو بدوخة.
- كنت تتناول دواء يحتوي على نيليفانتر، متكررة.
- كنت تحت علاج لمدة 18 سنة.

تطبيقات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
تم التبليغ عن ردود فعل جلدية وخيمة تشمل متلازمة ستيفن-جونسون، التحلل البشرة السمي، متلازمة رد الفعل الدراني المصحوب بكثرة

- كيتونازول، إيتراكونازول، يسوكونازول أو فوريكونازول (علاج حالات العدوى الفطرية).
- ديجوكسين (علاج مشاكل القلب).
- ديازيبام (علاج القلق، إرخاء العضلات أو المرع).
- فينيتوين (علاج المرع). إذا كنت تتناول فينتوين، سيوف الميثيلجبارا متلازمة طرية عندما تبدأ العلاج بأومبيراكس-Z أو تتوقف عنه.
- الأدوية التي تدمر مثل وارفارين أو مضادات فيتامين K أخرى. قد يقوم الطبيب بإجراء متابعة طرية عندما تبدأ العلاج بأومبيراكس-Z أو تتوقف عنه.
- ريغابيسين (علاج اللس).
- أتازانيفر، ساكونتايفر (أدوية لعلاج عدوى الـ HIV).
- تاركلورامين أو ميكوفينولات (في حالات زرع الأعضاء).
- نبته St. John's Wort (هيريكوم بيروفراتوم) لعلاج الاكتئاب.
- سيولاستازول (علاج القرع المتفعل).
- كلويدوبيرول (مضاد لتخثر الدم).
- إيرلوتينيب (علاج السرطان).
- ميثوتريكسات (دواء كيميائي الذي يستعمل بجرعات عالية لعلاج السرطان) - إذا كنت تتناول جرعات عالية من ميثوتريكسات، يمكن أن يقرم طبيبك بإيقاف العلاج بأومبيراكس-Z بشكل مؤقت.
- أموكسيسيلين و كلاريثروميسين (مضادات حيوية) - إذا وصف لك طبيبك هذه المضادات الحيوية مع أومبيراكس-Z لعلاج الحرقنة الناتجة عن عدوى المئوية الثانية (helicobacter pylori)، من المهم جداً أن تبلغ طبيبك عن كل دواء آخر تتناوله.

3. كيف تستعمل الدواء؟

أنت تأخذ جرعة واحدة مرة في اليوم قبل الوجبة لمدة 14 يوماً.- يمكن تكرار العلاج ذي الـ 14 يوم كل 4 شهور.
- لا يجوز تناول الدواء لأكثر من 14 يوم أو أكثر من علاج واحد (14 يوماً) كل 4 شهور إلا وفقاً لتعليمات الطبيب.
- إذا لم يطرأ تحسن بوضوح بعد 14 يوماً و/أو إذا تكررت الأعراض بقرات قريبة أو تفاقمت، يجب التوجه إلى الطبيب.
- لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول الدواء قبل الوجبة. مفضل تناول الدواء في الصباح.- يجب بلع الحبسولة بكاملها مع كأس ماء.
- لا يجوز شطط سحق أو مضغ الحبسولة للحفاظ على طلاء الحبسولة (الطلاء يمنع صدمات الحرقنة في المعدة من تفكيك الحبسولة التي تتحرر المادة الفعالة فقط في الأمعاء، في المكان الذي تتصم به المادة الفعالة للحمض).

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت جرعة زائدة أو إذا بلغ طفلك من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً للطبيب ولإدارة الطوارئ في المستشفى مصحوباً عبوة الدواء معه.

إذا نسيتم تناول الدواء

إذا نسيتم تناول هذا الدواء في الوقت المطلوب، يجب تناول جرعة رابعة، لكن إذا كان موعد تناول الجرعة التالية قريباً، يجب تخطي الجرعة المتبقية. لا يجوز تناول جرعتين معاً لتعويض عن الجرعة المتبقية.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام تحقق من المصالح والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

أومبيراكس-Z ليس من المفروض أن يؤثر على القدرة على القيادة أو تشغيل الآلات. من الممكن أن تحدث أعراض جانبية مثل الدوخة واضطرابات في الرؤية (انظر للبدن 4 "الأعراض والآثار") إذا تعرضت لهذه الأعراض لا يجوز أن تسوق أو تشغيل الآلات.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

أومبيراكس-Z يحتوي على إلكتروليت. إذا كنت في الماعضي من قبل طبيب أو لديك عدم تحمل

لسكريات معينة، استشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.

هذا الدواء يحتوي على أقل من- 1 ميلي مول صوديوم (23 ملغ) الحبسولة، هذا يعني أنها فعالة "خالية من الصوديوم".

أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000 كنتها وخيمة:

صغير سفاحي في التنفس، انتفاخ في الشفتين، السعال، والحمجرة أو الجسم، تساقط شعر (سعل).

طفح أرجاعي أو صدمات في البول (رد فعل إدمي وخيم). (اندر)

احمرار الجلد المصحوب بصدمات أو تقرح. حبسولات خيمة وزيف في يديك أيضاً في الشفتين، في العينين، في القدم وفي الأظفار المتتالية.

هذا الموضوع قد يكون متلازمة ستيفن-جونسون أو تقرح الأنسجة المتوتمة الشريوية التسمي. (اندر جذا)

طفح جلدي منتشر، ارتقاع درجة حرارة الجسم وتضخم بالغدد الليمفاوية (متلازمة DRESS - متلازمة رد الفعل الدراني المصحوب بطفح الجلدي واليورينيات وعوارض جهازية أو حساسية مفردة للدواء). (اندر)

طفح جلدي منتشر الذي يتميز بجلد احمر مع قشرة وجذو لولبي مع حبسولات مصحوب بحرقنة. تظهر العوارض بشكل عام في بداية العلاج (Acute Generalized Exanthematous Pustulosis). (اندر)

اصفرار الجلد، بول داكن وتعب وتقيؤ قد تكون أعراض لمشاكل كبد. (اندر)

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 100):

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 100):

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 1000):

انتفاخ بالمساقين والكاحلين، اضطرابات في النوم (رق).

دوخة، شعور بالوخز والتعبيل، شعور بالغثاس.

شعور بالدوار (vertigo)، تغيرات في فحوصات الدم لفحص وظائف الكبد.

طفح جلدي، طفح مع كحل (شرى) وحكة في الجلد.

شعور عام غير جيد ونقص في الطاقة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

مشاكل جهاز اللم مثل انخفاض بعد خلايا الدم البيضاء، أو الصفائح التي من الممكن أن يصفى بضع ظهور كدمات أو تطوّر حالات عدوى بسهولة أكثر.

مشاكل في حاسة الذوق.

مشاكل في الرؤية على سبيل المثال رؤية مشوشة.

ظهور عوارض جانبية، إذا تلقف أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التهاب داخل تجويف الفم.

عدوى فطرية في الفم التي من الممكن أن تؤثر على الأمام.

تساقط شعر (سعل).

طفح في الجلد عند التعرض لضوء الشمس.

ألم مفاصل (arthralgia) أو ألم عضلات (myalgia).

مشاكل وخيمة في الكلى (Interstitial Nephritis).

تعرق مقروط.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

تغيرات في تعداد الدم بما في ذلك ندرّة الشُحَبَات (agranulocytosis).

عدائية.

هلوسات، رؤية، شعور أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع.

مشاكل وخيمة في الكبد التي تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ.

حماسي متحمّات الأشكال.

ضعف عضلات.

تضخم الشفتين لدى الرجال.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1000):

انتفاخ بالمساقين والكاحلين، اضطرابات في النوم (رق).

دوخة، شعور بالوخز والتعبيل، شعور بالغثاس.

شعور بالدوار (vertigo)، تغيرات في فحوصات الدم لفحص وظائف الكبد.

طفح جلدي، طفح مع كحل (شرى) وحكة في الجلد.

شعور عام غير جيد ونقص في الطاقة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

مشاكل جهاز اللم مثل انخفاض بعد خلايا الدم البيضاء، أو الصفائح التي من الممكن أن يصفى بضع ظهور كدمات أو تطوّر حالات عدوى بسهولة أكثر.

مشاكل في حاسة الذوق.

مشاكل في الرؤية على سبيل المثال رؤية مشوشة.

ظهور عوارض جانبية، إذا تلقف أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التهاب داخل تجويف الفم.

عدوى فطرية في الفم التي من الممكن أن تؤثر على الأمام.

تساقط شعر (سعل).

طفح في الجلد عند التعرض لضوء الشمس.

ألم مفاصل (arthralgia) أو ألم عضلات (myalgia).

مشاكل وخيمة في الكلى (Interstitial Nephritis).

تعرق مقروط.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

تغيرات في تعداد الدم بما في ذلك ندرّة الشُحَبَات (agranulocytosis).

عدائية.

هلوسات، رؤية، شعور أو سماع أشياء غير موجودة في الواقع.

مشاكل وخيمة في الكبد التي تسبب قصور الكبد والتهاب الدماغ.

حماسي متحمّات الأشكال.

ضعف عضلات.

تضخم الشفتين لدى الرجال.

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 100):

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1000):

انتفاخ بالمساقين والكاحلين، اضطرابات في النوم (رق).

دوخة، شعور بالوخز والتعبيل، شعور بالغثاس.

شعور بالدوار (vertigo)، تغيرات في فحوصات الدم لفحص وظائف الكبد.

طفح جلدي، طفح مع كحل (شرى) وحكة في الجلد.

شعور عام غير جيد ونقص في الطاقة.

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

مشاكل جهاز اللم مثل انخفاض بعد خلايا الدم البيضاء، أو الصفائح التي من الممكن أن يصفى بضع ظهور كدمات أو تطوّر حالات عدوى بسهولة أكثر.

مشاكل في حاسة الذوق.

مشاكل في الرؤية على سبيل المثال رؤية مشوشة.

ظهور عوارض جانبية، إذا تلقف أحد الأعراض الجانبية أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "دعونا نسمع صوتك" أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة www.health.gov.gov.au الموجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق الدخول على الرابط: <https://sideeffects.health.gov.au>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومحال رؤيتهم. وبذلك تمنع التسمم. لا تسميها بغير اسمها. يجب تخزينها بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (الذي يظهر على العبوة). تاريخ انتهاء الصلاحية شروط التخزين: يمنع التخزين فوق 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركبات الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

Lactose monohydrate, hypromellose acetate succinate, magnesium carbonate heavy, sodium starch glycolate, talc, sodium stearyl fumarate, triethyl citrate, propylene glycol, purified water, titanium dioxide (E171), sodium hydroxide, sodium laurilsulfate, red iron oxide (E172), hypromellose 2910, yellow iron oxide (E172), carnauba wax.

كيف يبدو الدواء وما هو محتواه

حبسولة بيضاء بيضاء، حجمها 28، 14، 7

حبسولة بيضاء بيضاء، حجمها 28، 14، 7