

معلومات للمتعالجين حول أولوميانت™ (باريسيتينب)

يحتوي هذا المستند على معلومات مهمة، التي
يجب عليك أن تعرفها قبل الاستعمال وخلال
استعمال أولوميانت.

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب
مفاصل روماتويدي معتدل حتى شديد، الذين العلاج السابق لهم
بدواء واحد مضاد الروماتيزم أو أكثر من مجموعة DMARD لم
يكن فعالاً بما يكفي أو كان غير محتمل.

يمكن استعمال أولوميانت كمستحضر وحيد أو بالدمج مع
ميثوتريكسات (methotrexate).

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من التهاب الجلد
التأتبي المعتدل حتى الحاد، المعروف أيضاً بالإكزيما التأتبية.
يمكن استعمال أولوميانت بالدمج مع أدوية لعلاج الإكزيما التي
تدهنها على الجلد أو استعماله كمستحضر وحيد.

يُستعمل أولوميانت لعلاج البالغين الذين يعانون من داء الثعلبة
البقعية (Alopecia (areata الحاد.

للحصول على معلومات كاملة عن الدواء، يجب قراءة نشرة
الدواء المرفقة في عبوة المستحضر. كذلك، نشرة الدواء
المنشورة على موقع وزارة الصحة:

<https://data.health.gov.il/drugs/index.html#/byDrug>

احتفظ بهذه المعلومات معك ومررها لأفراد آخرين
من الطاقم الطبي الذين يشاركون في علاجك.

اسمك:

اسم الطبيب (الذي وصف أولوميانت):

رقم هاتف الطبيب:

تمت المصادقة على هذه الكراسة/البطاقة ومحتواها من قبل وزارة الصحة
في تاريخ: تشرين الثاني 2022

Lilly

عدوى

قد يؤدي أولوميانت إلى تفاقم حالة عدوى موجودة أو أن يزيد خطر أن تتطور لديك عدوى جديدة أو أن يزيد خطر التنشيط الفيروسي. بلغ الطبيب إذا تطورت لديك أعراض عدوى، مثل:

- سخونة، جروح، شعور بالتعب المتزايد مقارنة بالحالة الاعتيادية أو مشاكل أسنان.
- سُعال لا يختفي، تعرّق ليليّ وانخفاض في الوزن. هذه قد تكون أعراض مرض السل (مرض رئوي معدّ).
- طفح جلدي مصحوب بألم وبثور. هذا العارض قد يكون علامة لعدوى الهربس النطاقي.

دهون في الدم

قد يؤدي استعمال أولوميانت إلى ارتفاع مستوى الدهون في الدم. سيفحص الطبيب مستويات الدهون في الدم، مثل الكوليسترول، خلال علاجك بأولوميانت.

تخثرات دموية في الأوردة

أخبر الطبيب، قبل وخلال العلاج بأولوميانت، إذا كنت قد عانيت في الماضي من تخثرات دم في أوردة القدمين (خثار في الأوردة العميقة) أو في الرئتين (انسداد رئوي).

- أخبر طبيبك إذا كنت تعاني من ساق متورمة ومؤلمة، احمرار أو شعور بالحرارة في الساق، ألم في الصدر أو ضيق تنفس، لأنّ هذه ممكن أن تكون علامات تخثر دم في الأوردة.

الحمل

- يُمنع تناول أولوميانت إذا كنت حاملاً أو تشكين بأنك قد تكونين حاملاً.
- استعملي وسيلة منع حمل ناجعة خلال العلاج بأولوميانت (ولمدة أسبوع واحد بعد ذلك، إذا توقفت عن العلاج).
- أبلغِي الطبيب فوراً إذا حملت (أو إذا كنت ترغيبين أن تحملي).