

Это важно

- Не пытайтесь самостоятельно диагностировать или лечить побочные эффекты.
- **Всегда носите эту карту с собой**, особенно в поездках, а также при обращении в приемное отделение или к другому врачу
- Обязательно сообщите медицинскому персоналу о том, что Вы проходите лечение препаратом Кейтруда, и покажите им эту карту

Легкие

- Одышка
- Боль в груди
- Кашель

Почки

- Изменение количества или цвета мочи

Кишечник

- Диарея или активность кишечника выше обычной
- Стул черный, дегтеобразный, липкий или содержит кровь или слизь
- Сильная боль или чувствительность в области живота

Печень

- Тошнота или рвота
- Чувство голода меньше, чем обычно
- Боль в правой части живота
- Пожелтение кожи или белков глаз
- Темная моча
- Кровотечение или синяки появляются легче, чем обычно

Железы внутренней секреции

- Частое сердцебиение
- Потеря или увеличение веса
- Повышенное потоотделение
- Выпадение волос
- Ощущение холода
- Запор
- Снижение тембра голоса
- Мышечные боли
- Головокружение или обморок
- Непреходящие головные боли или необычная головная боль
- Повышенное чувство голода или жажды
- Мочеиспускание чаще, чем обычно

Важная информация для медицинского персонала

Носитель этой карточки получает лечение препаратом Кейтруда (пембролизумаб), который может вызвать побочные реакции со стороны иммунной системы. Такие реакции могут появиться в любое время в ходе лечения или даже после его завершения.

Необходимо оценить состояние пациента для выявления признаков и симптомов побочных иммунологических реакций. Ранняя диагностика и соответствующая коррекция необходимы, чтобы свести к минимуму последствия побочных реакций, связанных с иммунной системой.

При подозрении на побочные реакции со стороны иммунной системы необходима адекватная оценка для подтверждения этиологического фактора или исключения других возможных причин. В зависимости от тяжести побочных реакций рекомендуется приостановить введение препарата Кейтруда и начать лечение кортикостероидами. Особые указания относительно коррекции побочных иммунных реакций можно найти в Буклете для врача о препарате Кейтруда.

Консультация онколога или другого медицинского специалиста может помочь при лечении органоспецифических иммунных реакций.
Для получения дополнительной информации воспользуйтесь Буклетом для врача о препарате Кейтруда на веб-сайте Министерства здравоохранения Израиля:

www.gov.il/he/service/israeli-drug-index

О побочных эффектах, вызванных лекарствами, отпускаемыми по рецепту, можно сообщить в Министерство здравоохранения по адресу:

<https://sideeffects.health.gov.il>

Для получения медицинской информации обращайтесь в DPOC.israel@merck.com или позвоните по номеру 0995333333.

Для простоты и удобства чтения в данной карточке использована грамматическая форма мужского рода.

Тем не менее, препарат предназначен для представителей обоих полов.

КЕЙТРУДА

(пембролизумаб)

Информационная карта безопасности для пациента

KEYTRUDA

(pembrolizumab)

[Logo]

Эта карта и ее содержание были одобрены Министерством здравоохранения в июле 2021 г.

Кейтруда может вызывать серьезные побочные эффекты, которые иногда могут быть опасными для жизни и даже привести к смерти.

Эти побочные эффекты могут возникнуть в любое время в ходе лечения или даже после его завершения. Вы можете испытывать более одного побочного эффекта одновременно.

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вас возникнут какие-либо признаки или симптомы, включая те, которые не перечислены в этой карте.

Ваш врач может дать Вам другие лекарства, чтобы уменьшить симптомы и предотвратить более тяжелые осложнения.

Возможно Ваш врач отменит очередную дозу препарата Кейтруда или полностью прекратит это лечение.

Для дополнительной информации воспользуйтесь Инструкцией по применению препарата Кейтруда, размещенной на сайте Министерства здравоохранения:

www.gov.il/he/service/israeli-drug-index

Важные контактные данные

Имя пациента

Имя врача

Номер телефона пациента

Номер телефона клиники

Контактные данные в срочных случаях (имя и номер телефона)

Номер телефона в срочных случаях