

باكتروبان للجلد، مرهم

كل 1 غرام يحتوي 20 ملغ موبيروسين (2% w/w)

Mupirocin (2% w/w)

لقائمة المواد غير الفعّالة والمثيرة للحساسية في المستحضر، انظر البند 2 - "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".
اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل استعمالك الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

باكتروبان للجلد يحتوي على المادة الفعّالة التي تُسمى موبيروسين.

هو يستعمل لعلاج حالات العدوى الجلدية مثل:

- عدوى في جريبات الشعر حيث يؤدي إلى تشكل بثور قيحية ("التهاب الجريب")
 - عدوى جلدية مُعدية ترافق بحويصلات وقشور والمعروفة بالقوباء "impetigo"
 - جروح قيحية متكررة ("دُمّال" - furunculosis)
- هذا المرهم مخصص للاستعمال الخارجي على الجلد فقط.

الفصيلة العلاجية:

مضاد حيوي للاستعمال الموضعي.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أرجي) لـ موبيروسين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في البند 6).
- لا يجوز الاستعمال إذا كان ما دُونَ أعلاه ينطبق عليك. إذا لم تكن واثقاً لا تستعمل هذا الدواء. توجه للطبيب أو الصيدلي قبل استعمال باكتروبان للجلد.
- لا يجوز استعمال هذا المستحضر في العينين، في الأنف أو حول أنبوبة داخل الوريد ("تسريب").

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- باكتروبان للجلد يمكن أن يسبب حساسية أو ردود فعل جلدية شديدة. أنظر في البند 4 "الأعراض الجانبية".
- لا يجوز استعمال هذا الدواء في أحيان متقاربة أو لفترة طويلة بدون استشارة الطبيب. يمكن أن يتطور فطر (عدوى فطرية) إذا تم استعمال باكتروبان للجلد لفترة طويلة. إذا حدث ذلك، احك للطبيب أو الصيدلي.

يجب تفادي تماس المرهم مع العينين.

- إذا دخل المرهم بالخطأ إلى العينين، اغسلهما جيداً بالماء.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة، تعتقد أن من الجائز أن تكوني حاملاً أو إذا كنت تخططين للحمل، استشيري الطبيب قبل استعمال هذا الدواء.

عند علاج حلماة منشفقة، يجب غسل المرهم جيداً قبل الإرضاع.

السياقة واستعمال الماكينات

من غير المرجح أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السياقة أو استعمال الماكينات.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء

يحتوي باكتروبان للجلد على بولي إيثيلين جليكول، تحدث مع الطبيب قبل استعمال هذا الدواء إذا كان لديك:

- مشاكل في الكلى
- مساحات كبيرة لجروح مفتوحة أو جلد متضرر يحتاج لعلاج.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب، دائماً. عليك الاستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

استعمال هذا الدواء

لا يجوز خلط باكتروبان للجلد مع أدوية أخرى للاستعمال الخارجي على المكان المصاب من الجلد، سواء كريم أو مرهم نظراً لأن هذا الأمر يمكن أن يقلل من نجاعة باكتروبان للجلد.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الاعتيادي هو عادة:

دهن باكتروبان للجلد على الجلد مرتين حتى ثلاث مرات في اليوم.

1. اغسل وجفف يديك.
2. إدهن من المرهم على المكان المصاب في الجلد.
3. يمكنك تغطية المكان المعالج بـ بلاستر (بلاسترات) أو ضماد (ضمادات) مناسب (مناسبة)، إلا إذا قال لك الطبيب أن تبقيه مكشوفاً.
4. أعد الغطاء للأنبوبة واغسل يديك.

لا تتجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

استعمل باكتروبان للجلد للمدة الزمنية التي أوصاك بها الطبيب. إذا لم تكن واثقاً، اسأل الطبيب أو الصيدلي. عادة تختفي الجراثيم من الجلد خلال 10 أيام من بدء العلاج. لا يجوز استعمال باكتروبان للجلد لفترة أكثر من 10 أيام. إرم بقايا المرهم.

ليس للبلع!

هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

إذا بلعت بالخطأ من المرهم

إذا بلعت بالخطأ من المرهم، استشر الطبيب أو الصيدلي.
إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، راجع الطبيب حالاً أو غرفة الطوارئ في المستشفى مصطحباً معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

- إذا نسيت دهن باكتروبان للجلد، ادهنه لحظة تذكرك.
- إذا كان من المفترض أن يُدهن المقدار الدوائي التالي خلال الساعة القريبة، تجاوز المقدار الدوائي المنسي.
- لا يجوز استعمال مقدار دوائي مضاعف للتعويض على المقدار الدوائي المنسي.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء

إذا توقفت عن استعمال باكتروبان للجلد أبكر من اللازم، فمن الجائز بأن لا تتم إبادة كافة الجراثيم أو أنها قد تستمر بالتكاثر. اسأل الطبيب أو الصيدلي عن موعد التوقف عن استعمال المرهم.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص ملصق الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال باكتروبان للجلد قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تندهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه حالاً إلى الطبيب في حالات حدوث:

ردود فعل تحسسية أو ردود فعل جلدية شديدة - هذه الأعراض نادرة جداً لدى الأشخاص الذين يستعملون باكتروبان للجلد. العلامات تشمل:

- طفح بارز وحاك
 - انتفاخ، أحياناً في منطقة الوجه أو الفم، الذي يسبب صعوبة في التنفس
 - انهيار أو فقدان الوعي.
- ← إذا قاسبت أياً من تلك الأعراض، توجه حالاً للطبيب وتوقف عن استعمال باكتروبان للجلد.

إذا تطور لديك رد فعل جلدي حاد أو حساسية:

- اشطف المرهم
- توقف عن استعمال المرهم
- توجه للطبيب بأسرع ما يمكن.

في حالات نادرة، إن أدوية مثل باكتروبان للجلد يمكن أن تؤدي إلى التهاب المعى الغليظ الذي يسبب الإسهال، عادة ما يترافق بدم ومخاط، آلام في البطن وسخونة (*pseudomembranous colitis*).
← يجب مراجعة الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تقاسي أياً من تلك الأعراض.

الأعراض الجانبية التالية يمكن أن تحدث باستعمال هذا الدواء:

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص:
• شعور بحرق في مكان دهن المرهم.

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص:
• حكة، احمرار، وخز وجفاف الجلد في مكان دهن المرهم.
• طفح تحسسي، حكة، احمرار أو ألم في الجلد، من شأنها أيضاً أن تحدث في أجزاء أخرى في جسمك.

أعراض جانبية نادرة جداً

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10,000 شخص:
• انتفاخ الوجه و/أو صعوبة في التنفس. من شأن ذلك أن يشكل علامة لرد فعل تحسسي شديد بحيث يتطلب علاج طارئ.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقبؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية الى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- بعد الفتح للمرة الأولى بالإمكان استعمال المرهم لمدة 10 أيام وبما لا يتجاوز تاريخ انقضاء صلاحية المستحضر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- باكتروبان للجلد عبارة عن مرهم بلون أوف - وايت، نصف شفاف. لا تستعمله إذا بدا مختلفاً عن المعتاد.
- يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات في البيت. استشر الصيدليّ بالنسبة إلى كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد ضمن الاستعمال. هذه الخطوات ستساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

- يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Polyethylene glycol 400, polyethylene glycol 3350

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
- باكتروبان للجلد هو مرهم بلون أوف - وايت، نصف شفاف.
- باكتروبان للجلد يتوفر على شكل أنبوبة 15 غرام. كل أنبوبة معبأة ضمن كرتون.
- صاحب التسجيل: جلاكسو سميثكلين (إسرائيل) م.ض، شارع بازل 25، بيتح تيكفا.
- المنتج: جلاكسو أوبيريشنس (إنكلترا) م.ض، برنارد كاسل، إنكلترا.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 037-75-25332
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم تحريرها في أيلول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
©2022 مجموعة شركات GSK أو صاحب الامتياز الخاص بها.

Bac Der PT v5A