

פגיל

תמיסה להזרקה במזרק מוכן לשימוש 6 מ"ג/ג 0.6 מ"ל (10 מ"ג/ג 1 מ"ל)

למתן תת-עורי

הרכב:

כל מזרק מוכן לשימוש מכיל:
פגפילגרסטים 6 מ"ג/ג 0.6 מ"ל
Pegfilgrastim 6 mg/0.6 ml

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר - ראה סעיף 6 - "מידע נוסף" וסעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

- **קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא, הרוקח או האחיות.
- כמו כן, קרא גם את עלון הוראות השימוש עבור פגיל, המצורף לאריזה.
- שמור עלון זה. ייתכן ותצטרך לקרוא אותו שוב.
- תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.
- אם מופיעות תופעות לוואי כלשהן, היוועץ ברופא, ברוקח או באחות. זה כולל תופעות לוואי אפשריות כלשהן אשר אינן מצוינות בעלון זה. ראה סעיף 4 - "תופעות לוואי".

מידע חשוב לעיוןך

- אם נאמר לך שהנך רגיש לסוגים מסוימים של סוכרים, התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה פגיל.
- ניתן להזריק את התרופה פגיל באופן עצמאי בביתך לאחר קבלת הדרכה מהצוות הרפואי. אנא קרא בעיון את ההוראות להזרקה עצמית המופיעות בעלון הוראות השימוש המצורף לאריזה.
- הקפדה על הנחיות הרופא (מינון, מועדי הזרקה ומשך הטיפול) מגדילה את הסיכוי להצלחת הטיפול. בכל מקרה, אין להפסיק את הטיפול ללא התייעצות עם הרופא המטפל. אנא עיין בסעיפים 2 ו-4 למידע בטיחותי מורחב.
- יש לשמור את התרופה פגיל במקרר (ראה סעיף 5 - "איך לאחסן את התרופה?").
- התרופה, פגיל מזרק מוכן לשימוש, מיועדת לשימוש חד-פעמי!

פגיל הינו תכשיר ביו-סימילאר. למידע נוסף על תכשירי ביו-סימילאר יש לפנות לאתר משרד הבריאות:

<https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTL/Drugs/Registration/Pages/Biosimilars.aspx>

1. למה מיועדת התרופה?

התרופה פגיל משמשת לקיצור משך הזמן של נויטרופניה (ספירה נמוכה של תאי דם לבנים עם חום), העלולה להיגרם על-ידי טיפול כימותרפי ציטוטוקסי (תרופות אשר משמידות תאים הגדלים במהירות), הניתן במרווחים של 14 ימים ויותר, לטיפול בממאיריות (למעט לוקמיה מיאלואידית כרונית [CML] ותסמונת מיאלודיספלסטית [MDS]).

תאי דם לבנים הינם חשובים, מאחר והם מסייעים לגופך להילחם בזיהום. תאים אלו מאוד רגישים להשפעות של הטיפול הכימותרפי, אשר עלול לגרום לירידה במספר התאים הללו בגופך. אם מספר תאי הדם הלבנים יורד מתחת לרמה מסוימת, יכולת ההתגוננות של גופך כנגד חיידקים נפגעת ואתה עלול להיות בסיכון מוגבר ללקות בזיהום.

הרופא שלך נתן לך את התרופה פגיל כדי לעודד את מה העצם שלך (אזור בעצם המייצר תאי דם) לייצר עוד תאי דם לבנים המסייעים לגופך להילחם בזיהום.

קבוצה תרפויטית

פגיל היא תרופה מקבוצת החלבונים הנקראים גורמי גדילה של תאי דם לבנים מסוג גרנולוציטים (G-CSF).

התרופה **פגיל** מכילה את החומר הפעיל פגפילגרסטים. פגפילגרסטים הוא חלבון המופק באמצעים ביוטכנולוגיים בחיידקים הנקראים *E. coli*. החלבון שייך לקבוצת חלבונים הנקראים ציטוקינים והינו דומה מאוד לחלבון טבעי (Granulocyte-colony stimulating factor = G-CSF) המיוצר על-ידי גופך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

הנך רגיש (אלרגי) לפגפילגרסטים (pegfilgrastim), פילגרסטים (filgrastim), חלבונים תוצרי חיידקי *E. coli*, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6 - "מידע נוסף").

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפגיל, ספר לרופא שלך, לרוקח או לאחות:

- אם אתה חווה תגובה אלרגית, הכוללת חולשה, צניחה בלחץ דם, קושי בנשימה, נפיחות של הפנים (אנפילקסיס), אדמומיות והסמקה, פריחה בעור, ואזורים מגרדים בעור.
 - אם אתה חווה שיעול, חום וקשיי נשימה. הדבר יכול להוות סימן לתסמונת מסוג ARDS (תסמונת מצוקת הנשימה החדה – Acute Respiratory Distress Syndrome).
 - אם יש לך את אחת או שילוב של תופעות הלוואי הבאות:
 - נפיחות או מלאות אשר עלולות להיות קשורות למתן שתן בתדירות נמוכה יותר, קשיי נשימה, נפיחות בבטן והרגשת מלאות, והרגשת עייפות כללית. אלו יכולים להיות תסמינים של מצב הנקרא "Capillary Leak Syndrome" הגורם לדם לדלוף מתוך כלי הדם הקטנים אל תוך הגוף שלך. ראה סעיף 4 – "תופעות לוואי".
 - אם יש לך כאב בחלק העליון השמאלי של הבטן או כאב בקצה הכתף שלך. דבר זה עלול להיות סימן לבעיה בטחול שלך (טחול מוגדל - splenomegaly).
 - אם סבלת לאחרונה מזיהום חמור של הריאות (דלקת ריאות), נוזלים בריאות (בצקת ריאות), דלקת בריאות (מחלה בין-רקמתית של הריאה) או צילום רנטגן לא תקין של החזה (תסנינים בריאות).
 - אם אתה מודע לשינויים כלשהם בספירות תאי דם (כגון, עליה בספירת תאי הדם הלבנים או אנמיה) או ירידה בספירת תאי הדם, אשר מפחיתה את יכולת דמך להיקרש (תרומבוציטופניה). ייתכן שהרופא שלך ירצה לבצע מעקב צמוד יותר.
 - אם הנך סובל מאנמיה חרמשית. ייתכן שהרופא שלך יבצע מעקב צמוד יותר אחר מצבך.
 - אם אתה מטופל עם סרטן שד או סרטן ריאות, **פגיל** בשילוב עם כימותרפיה ו/או טיפול בהקרנה עלול להעלות את הסיכון שלך לפתח מצב טרום-סרטני בדם הנקרא תסמונת מיאלודיספלסטית (MDS) או סרטן-הדם הנקרא לוקמיה מיאלואידית חריפה (AML). התסמינים עשויים לכלול עייפות, חום ודימומים או חברות מפגיעות קלות.
 - אם יש לך סימנים פתאומיים של אלרגיה, כגון פריחה, גירוד או סרפדת על העור, נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או של חלקים אחרים בגוף, קוצר נשימה, צפצופים או בעיות נשימה, אלו יכולים להיות סימנים של תגובה אלרגית חמורה.
 - אם יש לך תסמינים של דלקת של האאורטה (כלי הדם הגדול אשר מעביר דם מהלב לגוף), תופעה זו דווחה באופן נדיר בחולי סרטן ובתורמים בריאים. התסמינים יכולים לכלול חום, כאב בטן, חולשה, כאב גב ועליה במדדי דלקת. ספר לרופא אם אתה חווה תסמינים אלו.
- הרופא שלך יבדוק את הדם ואת השתן שלך בקביעות מאחר ו**פגיל** עלול לפגוע בפילטרים בכליות שלך (גלומרולופריטיס).

דווחו תגובות עוריות חמורות (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון) עקב השימוש בפגפילגרסטים. הפסק את השימוש בפגיל ופנה מיד לקבלת עזרה רפואית אם הבחנת באחד התסמינים המתוארים בסעיף 4 – "תופעות לוואי".

עליך לדבר עם הרופא שלך בנוגע לסיכונים שלך לפתח סוגים של סרטן הדם. אם הנך מפתח או אם קיימת סבירות שתפתח סוגים של סרטן הדם, אל תשתמש בתרופה **פגיל**, אלא אם כן הרופא שלך הורה על כך.

אובדן תגובה לפגפילגרסטים

אם אינך מגיב יותר או אם אינך מצליח לשמר את התגובה לטיפול בפגפילגרסטים, הרופא שלך יחקור את הסיבות לכך, כגון האם פיתחת נוגדנים אשר מנטרלים את פעילות פגפילגרסטים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או אם אתה עשוי לקחת תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ילדים ומתבגרים

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בפגיל בילדים ובמתבגרים.

היריון, הנקה ופוריות

היוועצי ברופא שלך או ברוקח לפני נטילת תרופות כלשהן.

התרופה פגיל לא נבדקה בנשים בהיריון.

אם את בהיריון, חושבת שיתכן ואת בהיריון או מתכננת להרות, התייעצי עם הרופא שלך לפני השימוש בתרופה זו.

עליך להפסיק הנקה במידה ואת משתמשת בתרופה פגיל, אלא אם הרופא ינחה אותך אחרת.

נהיגה ושימוש במכוונות

לתרופה פגיל אין השפעה או שהשפעתה זניחה על היכולת לנהוג או להשתמש במכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה 30 מ"ג סורביטול בכל מזרק מוכן לשימוש, אשר שווים בערכם ל- 50 מ"ג/מ"ל. תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה של 6 מ"ג, כלומר, היא למעשה 'נטולת נתרן'.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ומשטר הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל הינו זריקה אחת תת-עורית (זריקה תחת העור שלך) של 6 מ"ג באמצעות מזרק מוכן לשימוש, ויש להזריקה לפחות 24 שעות לאחר מנת הכימותרפיה האחרונה שלך בסוף כל מחזור של טיפול כימותרפי.

אין לנער את התרופה פגיל בחוזקה, מכיוון שזה עלול לפגוע בפעילותה.

אין לעבור על המנה המומלצת.

הזרקה עצמית של התרופה פגיל

ייתכן והרופא שלך יחליט שיהיה לך יותר נוח להזריק את התרופה פגיל בעצמך. הרופא שלך או האחיות ידריכו אותך כיצד להזריק לעצמך. אל תנסה להזריק לעצמך אם לא קיבלת הדרכה.

להוראות נוספות כיצד להזריק לעצמך את התרופה פגיל, אנא קרא בעיון את עלון הוראות השימוש, המצורף לאריזה.

אם בטעות הזרקת מינון גבוה יותר של פגיל

אם השתמשת ביותר פגיל מהנדרש, פנה לרופא שלך, לרוקח או לאחות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת להזריק את התרופה פגיל

אם אתה מזריק את התרופה בעצמך ושכחת מנה של פגיל, עליך לפנות לרופא שלך כדי להתייעץ מתי עליך להזריק את המנה הבאה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, שאל את הרופא שלך, הרוקח או האחיות.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפגיל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

אנא ספר מיידית לרופא שלך אם יש לך את אחת או שילוב של תופעות הלוואי הבאות:

- נפיחות או מלאות אשר עלולות להיות קשורות למתן שתן בתדירות נמוכה יותר, קשיי נשימה, נפיחות בבטן והרגשת מלאות, והרגשת עייפות כללית.
- תסמינים אלה בדרך כלל מתפתחים באופן מהיר.

אלו יכולים להיות תסמינים של מצב שאינו שכיח (תופעה שמופיעה ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000) הנקרא "Capillary Leak Syndrome", הגורם לדם לדלוף מתוך כלי הדם הקטנים אל תוך גופך ומצריך טיפול רפואי דחוף.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- כאב בעצמות. הרופא שלך יאמר לך מה אתה יכול לקחת להקלה על הכאב בעצמות.
- בחילות וכאבי ראש.

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):

- כאב באזור ההזרקה.
- מיחושים וכאבים כלליים במפרקים ובשרירים.
- ייתכנו שינויים מסוימים בדם שלך, אך הם יאובחנו בבדיקות דם שגרתיות. ספירת תאי הדם הלבנים שלך עלולה להיות גבוהה לתקופה קצרה. ספירת תסיות הדם שלך עלולה להיות נמוכה, דבר אשר עלול להוביל להופעה של חבורות.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- תגובות המסווגות כתגובות אלרגיות הכוללות אדמומיות והסמקה, פריחה בעור, ואזורים בולטים בעור אשר מגרדים.
- תגובות אלרגיות חמורות הכוללות אנפילקסיס (חולשה, צניחה בלחץ דם, קשיי נשימה, נפיחות של הפנים).
- הגדלת טחול.
- קרע בטחול. ישנם מקרים של קרע בטחול אשר הסתיימו במוות. חשוב שתפנה לרופא שלך מיד אם אתה חש כאב בצד השמאלי העליון של הבטן או כאב בכתף השמאלית, מאחר ואלו עלולים להיות קשורים לבעיה בטחול שלך.
- בעיות נשימה. אם הנך סובל משיעול, חום וקושי בנשימה, אנא ספר לרופא שלך.
- הופיעו מקרים של סינדרום Sweet's (נגעים סגלגלים, כואבים ובולטים על הגפיים ולפעמים בפנים ובצוואר, המלווים בחום), אך ייתכן כי גורמים אחרים יהיו מעורבים בכך.
- וסקוליטיס עורי (דלקת של כלי הדם בעור).
- פגיעה בפילטרים הקטנים בכליות שלך (גלומרולונפריטיס).
- אדמומיות באזור ההזרקה.
- שיעול דמי (המופטיזיס).
- בעיות בדם (תסמונת מיאלודיספלסטית [MDS] או לוקמיה מיאלואידית חריפה [AML]).

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- דלקת של האאורטה (כלי הדם הגדול אשר מעביר דם מהלב לגוף). ראה סעיף 2 – "לפני השימוש בתרופה".
- דימום מהריאה (Pulmonary hemorrhage).
- תסמונת סטיבנס-ג'ונסון, שיכולה להופיע בצורת כתמים דמויי מטרה בצבע אדמדם או כנגעים עגולים, לעתים קרובות עם שלפוחיות במרכז הממוקמים באמצע הגוף, כקילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באברי המין ובעיניים; כהקדמה לכך יכולים להופיע חום ותסמינים דמויי שפעת. יש להפסיק את השימוש בפגיל אם אתה מפתח תסמינים אלה וליצור קשר עם הרופא שלך או לגשת מיד לקבלת טיפול רפואי. ראה גם סעיף 2 - "לפני השימוש בתרופה".
- אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מתמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/> בנוסף, ניתן לדווח לחברת "אוניפארם בע"מ" בכתובת: <https://unipharm.co.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראות מפורשות מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. date) המופיע על גבי אריזת הקרטון ועל גבי תווית המזרק. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

אחסן במקרר (2°C-8°C) באריזת הקרטון החיצונית, על מנת להגן מאור. ניתן להוציא את התרופה פגיל מחוץ למקרר ולאחסנה בטמפרטורת החדר עד 72 שעות. יש להשליך את המזרקים שאוחסנו בטמפרטורת החדר מעל 72 שעות. אין להקפא. במידה והוקפא, יש להפשיר במקרר לפני השימוש. יש להשליך את המזרק אם הוקפא יותר מפעם אחת. אל תשתמש בתרופה זו אם אתה מבחין שהיא עכורה או שיש בה חלקיקים.

התרופה פגיל מזרק מוכן לשימוש מיועדת לשימוש חד-פעמי בלבד!

אין להשליך תרופות כלשהן לביוב או לאשפה הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות אשר אינך משתמש בהן יותר. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

D-sorbitol, Acetate, Polysorbate 20, Sodium, Water for injection.

ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה

התרופה פגיל היא תמיסה להזרקה במזרק מוכן לשימוש (6 מ"ג/0.6 מ"ל).

כל אריזה מכילה מזרק אחד מוכן לשימוש הכולל מחט להזרקה ומכסה מחט. המזרק ארוז בתוך מגשית (בליסטר). המזרק מסופק עם מגן מחט אוטומטי. התמיסה צלולה וחסרת צבע.

בעל הרישום ויבואן: אוניפארם סחר בע"מ, ת.ד. 21429 תל אביב, 6121301.

נערך ביוני 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 165 36 35770 00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

0622C

KR/DRUGS/KTK/28D/07/2006

הוראות שימוש

פגיל


תמיסה להזרקה במזרק מוכן לשימוש

6 מ"ג/ג 0.6 מ"ל

למתן תת-עורי

הוראות שימוש בפגיל מזרק מוכן לשימוש:

פירוט החלקים



חשוב

לפני השימוש בפגיל מזרק מוכן לשימוש עם מגן מחט אוטומטי, קרא מידע חשוב זה:

- חשוב שלא תנסה להזריק לעצמך, אלא אם קיבלת הדרכה מהרופא שלך או מגורם רפואי אחר.
- פגיל ניתן בזריקה לתוך הרקמה אשר נמצאת ממש מתחת לעור (זריקה תת-עורית).
- X אל תסיר את מכסה המחט האפור מהמזרק המוכן לשימוש עד שאתה מוכן להזריק.
- X אל תשתמש במזרק המוכן לשימוש אם הוא נפל על משטח קשה. השתמש במזרק מוכן לשימוש חדש והתקשר לרופא או לגורם רפואי אחר.
- X אל תנסה להפעיל את המזרק המוכן לשימוש לפני ההזרקה.
- X אל תנסה להסיר את מגן הבטיחות השקוף של המזרק מהמזרק המוכן לשימוש.
- X אל תנסה להסיר את התווית הניתנת לקילוף משפופרת המזרק המוכן לשימוש לפני מתן הזריקה שלך.

צור קשר עם הרופא שלך או גורם רפואי אחר אם יש לך שאלות נוספות.

שלב 1: הכן

- א. הוצא את מגש המזרק המוכן לשימוש מהאריזה ואסוף את הציוד הנדרש להזרקה שלך: מטליות אלכוהול, כדור צמר גפן או פד גזה, פלסטר ומיכל לסילוק חפצים חדים (לא כלול).

להזרקה נוחה יותר, הנח את המזרק המוכן לשימוש בטמפרטורת החדר במשך כ-30 דקות לפני ההזרקה. שטוף את ידיך ביסודיות עם סבון ומים.

הנח את המזרק המוכן לשימוש החדש ואת שאר הציוד, על משטח עבודה נקי ומואר היטב.


X אל תנסה לחמם את המזרק באמצעות מקור חום כגון מים חמים או מיקרוגל.

X אל תשאיר את המזרק המוכן לשימוש חשוף לאור שמש ישיר.

X אל תנער את המזרק המוכן לשימוש.

• הרחק את המזרקים המוכנים לשימוש מהישג ידם וטווח ראייתם של ילדים.

ב. פתח את המגש, על-ידי קילוף הכיסוי. אחוז במגן הבטיחות של המזרק המוכן לשימוש מהמגש.



מסיבות בטיחותיות:

X אל תאחוז בבוכנה.

X אל תאחוז במכסה המחט האפור.

ג. בדוק את התרופה ואת המזרק המוכן לשימוש.



X אל תשתמש במזרק המוכן לשימוש אם:

• התרופה עכורה או מכילה חלקיקים. הנוזל חייב להיות צלול וחסר צבע.

• חלק כלשהו נראה סדוק או שבור.


• מכסה המחט האפור חסר או לא מחובר היטב.

• תאריך התפוגה המופיע על התווית עבר את היום האחרון של החודש המצוין.

בכל אחד מהמקרים, צור קשר עם הרופא שלך או גורם רפואי אחר.

שלב 2: התכונן

א. שטוף את ידיך ביסודיות. הכן ונקה את אזור ההזרקה שלך.



המקומות המתאימים להזרקה:


- החלק העליון של הירך.
- הבטן, מלבד באזור של 5 ס"מ סביב הטבור.
- האזור החיצוני של הזרוע העליונה (רק אם מישהו אחר מזריק לך את הזריקה).

נקה את אזור ההזרקה עם מטלית אלכוהול. תן לעור שלך להתייבש.


X אל תיגע באזור ההזרקה לפני ההזרקה.

X אל תזריק לאזורים בהם העור רגיש, חבול, אדום או קשה. הימנע מלהזריק לאזורים עם צלקות או סימני מתיחה.

ב. משוך בזהירות את מכסה המחט האפור בקו ישר והרחק מגופך.




ג. צבט את אזור ההזרקה שלך כדי ליצור משטח קשיח.



- חשוב להמשיך ולצבט את העור בזמן ההזרקה.

שלב 3: הזרק

א. אחוז באזור הצבוט. החדר את המחט לתוך העור.




אל תיגע באזור ההזרקה הנקי של העור.

ב. דחוף את הבוכנה בלחץ איטי וקבוע עד שתרגיש או תשמע צליל נקישה. דחוף את הבוכנה כלפי מטה עד הסוף ככל שניתן עד הישמע צליל הנקישה.



חשוב לדחוף את הבוכנה כלפי מטה עד הישמע צליל הנקישה על מנת לשחרר את המנה המלאה.

ג. שחרר את האגודל שלך. לאחר מכן **הרם** את המזרק מהעור.



לאחר שחרור הבוכנה, מגן הבטיחות של המזרק יכסה את מחט ההזרקה בבטחה. X אל תחזיר את מכסה המחט האפור על מזרקים משומשים.

אנשי צוות רפואי בלבד

יש לרשום בבירור את השם המסחרי של התכשיר שניתן בתיק המטופל.

שלב 4: סיום

א. השלך את המזרק המשומש והציוד הנוסף למיכל לסילוק חפצים חדים.



יש להשליך תרופות בהתאם לדרישות המקומיות. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות אשר אינן נחוצות עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה. שמור את המזרק והמיכל לסילוק חפצים חדים הרחק מטווח ראייתם ומהישג ידם של ילדים.

- אל תעשה שימוש חוזר במזרק.
- אל תמחזר מזרקים ואל תשליך אותם לאשפה הביתית.

ב. בדוק את אזור ההזרקה:

אם הבחנת בדם, לחץ כדור צמר גפן או פד גזה על אזור ההזרקה. אל תשפשף את מקום ההזרקה. הדבק פלסטר במידת הצורך.

בעל הרישום ויבואן: אוניפארם סחר בע"מ, ת.ד. 21429 תל אביב, 6121301.

נערך בנובמבר 2020.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 165-36-35770-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

1220B

KR/DRUGS/KTK/28D/07/2006