

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

קורסודיל דנטל ג'ל 1% w/w

חומר פעיל וריכוזו: כלורהקסידין דיגלוקונאט 1% w/w Chlorhexidine Digluconate 1% w/w

רשימת החומרים הבלתי פעילים מפורטת בסעיף 6 ובסעיף 2 תחת הכותרת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם הנך זקוק למידע נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- לעיכוב היווצרות פלאק.
 - כעזר לטיפול ומניעה של דלקת חניכיים (ג'נג'יטיס).
 - כעזר בשמירה על היגיינת הפה.
 - לשימוש לאחר ניתוחים או טיפולים דנטליים, לקידום ריפוי החניכיים.
 - לשימוש בכיבים, בדלקות בעקבות שיניים תותבות ובפטרת בפה.
 - כעזר למניעה של עששת לנמצאים בסיכון גבוה, בתוספת לפלואוריד.
- החומר הפעיל כלורהקסידין דיגלוקונאט הוא חומר אנטיביוטי המפחית את היווצרות הפלאק.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לכלורהקסידין דיגלוקונאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- אין להשתמש בתרופה בילדים מתחת לגיל 12 שנים, אלא בהמלצת רופא שיניים.
- אין להשתמש בתרופה בכל מקום אחר למעט בפה שלך. שטוף ביסודיות אם התכשיר בא במגע עם העיניים או עם האוזניים שלך.
- אין להשתמש בתרופה מיד לאחר צחצוח השיניים שלך. משחת השיניים יכולה לפגוע בפעילות התכשיר. לאחר צחצוח השיניים יש לשטוף את הפה ביסודיות במים ולהמתין 5 דקות בטרם השימוש בקורסודיל דנטל ג'ל. לחילופין ניתן להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל בזמן אחר במהלך היום.
- הפסק את השימוש בקורסודיל דנטל ג'ל ופנה לסיוע רפואי דחוף אם הנך חווה תגובה אלרגית קשה. ראה מידע נוסף בסעיף "תופעות לוואי".
- תיתכן הכתמה זמנית של השיניים ושל הלשון. ראה מידע נוסף בסעיף "תופעות לוואי".
- הנך עלול להבחין בשינוי בתחושת הטעם או בתחושת צריבה. ראה מידע נוסף בסעיף "תופעות לוואי".
- אין להלבין בדים שהיו במגע עם הג'ל.

תגובות בין תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון, הנקה ופוריות:

אין עדות לפגיעה בעובר בשימוש עם קורסודיל דנטל ג'ל. הנך יכולה להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל אם את בהריון או מניקה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

קורסודיל דנטל ג'ל מכיל את הרכיב Macrogolglycerol hydroxystearate, העלול לגרום לגירוי בעור.

3 כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל הוא:

- **דלקת חניכיים:** צחצח את שיניך למשך דקה אחת לפחות, פעם או פעמיים ביום תוך שימוש ב-2 ס"מ של ג'ל. המשך בטיפול למשך כחודש אחד.
- **כיבים בפה ופטרת בפה:** מרח ג'ל ישירות על האזורים הכואבים באמצעות קצה האצבע שלך או מקלון צמר גפן פעם או פעמיים ביום למשך דקה אחת לפחות. המשך להשתמש במשך 2 ימים לאחר הריפוי.
- **דלקות פה בעקבות שיניים תותבות:** לפני הכנסת התותבות, מרח בעדינות קורסודיל דנטל ג'ל על התותבות באיזורי המגע עם החניכיים.
- **כעזר למניעה של עששת או לאחר ניתוחים דנטליים:** השתמש לפי הוראות רופא השיניים שלך.

אם התסמינים שלך נמשכים, פנה לרופא שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לבלוע, לשימוש מקומי בחלל הפה.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4 תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקורסודיל דנטל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

- **הפסק להשתמש בקורסודיל דנטל ג'ל ופנה מיד לעזרה רפואית** אם מופיעות אצלך **פריחה, נפיחות של השפתיים, הלשון, הגרון או הפנים או אם יש לך קשיי נשימה**. תופעות אלה עלולות להיות תסמינים של תגובה אלרגית חמורה ונדירה מאוד.
- **הפסק להשתמש בג'ל ופנה לרופא השיניים שלך** אם מופיעים אצלך **גירוי, כאב או נפיחות בפה**.

תופעות לוואי אחרות שיכולות להתרחש:

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- **הכתמה זמנית של הלשון.** הכתמה נעלמת עם הפסקת הטיפול.
- **הכתמה זמנית של השיניים.** הכתמה זו בדרך כלל ניתנת להסרה על ידי צחצוח. אתה יכול להימנע מהכתמה באמצעות המנעות משתיית תה, קפה או יין אדום, במיוחד בשעה שלאחר השימוש, ועל ידי צחצוח יומימי במשחת שיניים (ראה סעיף 3 – "כיצד תשתמש בתרופה?"). אם הכתמה נותרת, היא ניתנת להסרה באמצעות ניקוי וליטוש אצל רופא השיניים או השינינית. אתה יכול לנקות את התותבות שלך באמצעות חומר לניקוי תותבות.
- ייתכן שתבחין בשינוי **בחוש הטעם** או בתחושת **צריבה** כאשר אתה משתמש בג'ל לראשונה. זה בדרך כלל חולף עם המשך הטיפול.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5 איך לאחסן את התרופה

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.
- לאחר הפתיחה הראשונה יש להשתמש בתוך 6 חודשים.

.6 מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:**

Purified water, Isopropyl Alcohol, Hydroxypropylcellulose, Macrogolglycerol
Hydroxystearate, Sodium Acetate, Peppermint Oil, Levomenthol.

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** שפופרת המכילה 50 גר' ג'ל צלול או מעט עכור, בריח מנטה.
- **בעל הרישום:** ג'י.אס.קיי. קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ, ת.ד. 3256. פתח תקווה.
- **יצרן:** פורנה פארמציוטיקלס, ריגקסווג 17, 2870 פורס, בלגיה.
- נערך במאי 2021 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 114-62-29571
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK. © 2022 קבוצת החברות של GSK או הזכיון שלה.