

וּטוֹבִייה מִ"ג טבֵלוֹת הרוקחים (כחשיים) התשמ"ו 1986 התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

וּטוֹבִייה מִ"ג טבֵלוֹת מסיטות כל טבליה מסיסה מכילה אוורולימוס 2 מ"ג everolimus 2 mg

וּטוֹבִייה מִ"ג 3 טבֵלוֹת מסיטות כל טבליה מסיסה מכילה אוורולימוס 3 מ"ג everolimus 3 mg

חומרים בלתי פעילים **אולרגנים**: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהתרופים של התרופה" וכן סעיף 6 "מידע נוסף".
קרא בעיון את העלון עד סופו
טרם תשתמש בתרופה, עלון זה מכיל מידע המעתיב על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה בעבורך. אך מעבר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

וּטוֹבִייה משמשת לטיפול במילים פּבֵלִידים בני שנתיים ומעלה ובמגורים עם פרכוסים (המטפים אפילפטים) הקשורים להפרעה גנטית הנקראת טרשת קרשית (TSC - Tuberos Sclerosis Complex), אשר אינם נשלטים על ידי תרופות אנטי-אפילפטיות אחרות.

וּטוֹבִייה ניתנת יחד עם תרופות אחרות לאפילפסיה.

קבוצה תרפויטית: מעכבי פרנטאין קינזא

2. לפני השימוש בתרופה

וּטוֹבִייה תירשם רק על-ידי רופא בעל ניסיון בטיפול במטופלים עם פרכוסים שיש לו גישה לרבידות דם למדידת כמות ווטוביה בדמך.

עקוב אחרי כל הוראות הרופא בקפדנות. הן עשויות להיות שונות מהמידע הכללי המופיע בעלון זה.

אם יש לך שאלות בנוגע לווטוביה או מדוע נרשמה לך תרופה זו, שאל את הרופא.

אין להשתמש בתרופה אם:

• הינך אלרגי (בעל רגישות יתר) ל- everolimus, לחומרים דומים כגון temsirolimus, sirolimus או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המפורטים בסעיף 4 "מידע נוסף" בעלון זה.

אם היו לך תגובות אלרגיות בעבר, ייתכנני עם הרופאך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בוטוביה, ספר לרופא אם:

• יש לך בעיות כלישתן כבדא או אם היו לך מחלות כלישהן אשר ייתכן שהשפיעו על הכבד.

במקרה זה, ייתכן שהרופא יצטרך לרשום לך מינון שונה של ווטוביה או להפסיק את הטיפול, לזמן קצר או לצמיתות.

• יש לך סוכרת (רמה גבוהה של סוכר בדם). ווטוביה עלולה להעלות את רמות הסוכר בדם ולהחמיר סוכרת. הדבר עלול לגרום לצורך בטיפול באינזולין ו/או טיפול בסוכרת דרך הפה. ספר לרופא אם אתה מרגיש צמא מוגבר או עלייה בסוכרת במתן הטיפול.

עליך לקבל חיסון בעת לקיחת ווטוביה, כי ייתכן שהחיסון יהיה פחות יעיל. לגבי ילדים עם פרכוסים, חשוב לדון עם הרופא על תוכנית החיסונים בלידתו לפני הטיפול בוטוביה.

עשוי להגדיל את כמות ווטובייה שמיץ אשכוליות במהלך הטיפול בוטוביה. זה ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון, אבל יש לעשות זאת בעקביות בכל יום באותו אופן.

וּטוֹבִייה עלולה להעלות את הסיכון לבעיות ברפיוי הפצע. עברת לאחרונה ניתוח רצני, או אם עדיין יש לך פצע שטרם התרפא לאחר הניתוח.

וּטוֹבִייה עלולה להעלות את הסיכון לבעיות ברפיוי הפצע. יש לך זיהום. ייתכן שיהיה צורך לטפל בזיהום לפני הטיפול בוטוביה.

הייתה לך בעבר דלקת כבד מסוג B (הפטיטיס B), מאחר שהיא עלולה לחזור במהלך הטיפול בוטוביה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

יש לך נטייה לדימומים או סבלות מדימומים בעבר, או אם אתה משתמש בתרופות אחרות שעלולות להשפיע על תפקוד הטיסיות או להגביר את הסיכון לדימום. יש להיות ערני לסימנים של דימום במהלך הטיפול בווטוביה.

עברת או עומד לעבור טיפול בקרינה (רדיותרפיה).

וּטוֹבִייה עלולה גם:

• לגרום לפצעים בפה (כיבי פה).

• להחליש את מערכת החיסון. לכן, אתה עלול להיות בסיכון לזיהום במהלך הטיפול בוטוביה. אם יש לך חום או סימנים אחרים של זיהום, היוועץ ברופא. חלק מהזיהומים חלולים להיות חמורים ועלולות להיות להם השלכות קטלניות במבוגרים וילדים.

• להשפיע על תפקוד הכליות. לכן, הרופא ינטר את תפקוד הכליות שלך במהלך הטיפול בווטוביה.

לגרום לקוצר נשימה, שיעול וחום (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

לגרום לסיבוכים של טיפול בקרינה. סיבוכים חמורים של טיפול בקרינה (כגון קוצר נשימה, בחילות, שלשולים, פריחות בעור וכאבים בפה, חניכיים וגברון), כולל מקרים קטלניים, נוצפו בחלק מהחולים שבגטו. אנורולימוס מקרינה לטיפול בקרינה או נטול אוורולימוס זמן קצר לאחר שגוררו טיפול בקרינה בעבר, בנוסף, דווח על תופעה שממנה תסמונת זיכרון קרינה (radiation recall syndrome) הכוללת אדמומיות עור או דלקת ריאות באזור טיפול בקרינה קודם, בחולים שעברו טיפול בקרינה בעבר.

ספר לרופא אם אתה מתכנן לעבור טיפול בקרינה בזמן הקרוב, או אם עברת טיפול בקרינה בעבר.

דווח לרופא באופן מיידי אם אתה מרגיש בתסמינים אלו.

ילדים ומתבגרים

וּטוֹבִייה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל שנתיים עם טרשת קרשית (TSC) ופרכוסים.

בדיקות ומועקב

לפני ובמהלך הטיפול בוטוביה (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי"), אשר ניטרו את כמות תאי הדם (תאי דם לבנים, תאי דם אדומים וטיסיות) בנוסף על מנת לראות אם לווטוביה יש השפעה שאינה רצויה על תאים אלו. כמו כן, יבוצעו בדיקות דם כדי לנטר את תפקוד הכליות (רומש של קרטינין, רמות ההגון בצורת שתן (אוראה) או חלבון בשתן), תפקודי הכבד (רמות של טרנסאמינאזות דם) וכן רמות הסוכר והשומנים בדם, היות שכל אלו עשויים להיות מושפעים מווטוביה.

בדיקות דם שגרתיות נדרשות גם על מנת למדוד כמה ווטוביה יש בדמך כי זה יעזור לרופא להחליט כמה ווטוביה אתה צריך לטול.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות

וּטוֹבִייה עלולה להשפיע על פעילותן של תרופות אחרות. אם אתה לוקח תרופות אחרות באותו זמן עם ווטוביה, ייתכן שהרופא יצטרך לשנות את המינון של ווטוביה או מינון התרופות האחרות.

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי מזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

במידה אם אתה לוקח:

- התרופות הבאות ימלות להעלות את הסיכון לתופעות לוואי עם ווטוביה:
 - קנטוקסואול, איטרקונאזול, ווריקונאזול, או פלוקונאזול ועוד תרופות אנטי-פטריותיות המשמשות לטיפול בזיהומים פטרייתיים.
 - קלריתרומיצין, טליתרומיצין או אריתרומיצין, אנטיביוטיקות המשמשות לטיפול בזיהומים חיידקיים.
 - ריטונאביר ותרופות אחרות המשמשות לטיפול בגנגיף הכשל החיסוני האנטי/איידס (HIV).

וּטוֹבִייה או דיילטאזם, המשמשות לטיפול בבעיות לב או לחץ דם גבוה.
דרודארון, תרופה ליוולוט קצב הלב.

ציקלוספורין, תרופה המשמשת למניעת דחיית שתלים על ידי הגוף.
קאמיטיב, המעכבת גדילת תאים לא תקינים.

מאכבי האנזים Angiotensin Converting enzyme (ACE) (כגון רמיפריל), המשמשים לטיפול בלחץ דם גבוה או בעיות לב וכלי דם אחרות. השילוב עלול להעלות את הסיכון לאנגיואדמה (התנפחות של הרשוך או של דרכי האוויר העלולה להיות מלווה בקשיי נשימה).

קנפאבדיל (שמשמש בני היתר לטיפול בהתקפים).

ג'וארדוזול, תרופה המשמשת לטיפול בזיקאון.

• התרופות הבאות יכולות להפחית את יעילות ווטוביה:

• ריפמיפיצין, המשמשת לטיפול בשחפת.

• אפאווריד או ניבראפין - המשמשות לטיפול בגנגיף הכשל החיסוני האנטי/איידס (HIV).

• סנט ג'ון וורט (St. John's Wort) - תרופה צמחית המשמשת לטיפול בקנאבדיל (שמשמש בני היתר לטיפול בהתקפים).

• דקמטאזין, קורטיקוסטרואיד המשמש לטיפול במגוון רחב של מצבים כולל דלקות או בעיות במערכת החיסון.

• פניטואין, קרבמאזפין או פנוברביל תרופות אנטיאפילפטיות אחרות המשמשות להפסקת פרכוסים או התקפים.

• תרופות העלולות להשפיע על תפקוד הטיסיות או להגביר את הסיכון לדימום.

• תרופות מסוימות בעלות טווח תרפויטי צר במתן דרך הפה, כגון פלואיד, טרפנאדן, אסטמזול, כינדין, נגזרות של ארגוט אלקלואידים או קארבמאזפין. ישילוב עם ווטוביה עלול להעלות סיכוי להופעת תופעות לוואי של התרופות הנ"ל.

יש להימנע מתרופות אלו במהלך הטיפול שלך בווטוביה. אם הינך נוטל אחת מהתרופות אלו, ייתכן שהרופא ירשום לך תרופה אחרת או שישנה את המינון של ווטוביה.

אם אתה נוטל תרופה נגד פרכוסים, שינוי במינון של התרופה נגד פרכוסים (העלאת או הורדת) עלול להחמיר סוכרת. הדבר עלול לגרום לצורך בטיפול באינזולין ו/או טיפול בסוכרת דרך הפה. ספר לרופא.

אם אתה נמצא בדיאטה מסוימת על מנת להפחית את הדירות הפרכוסים, אנו ידע את הרופא לפני נטילת ווטוביה.

שימוש בתרופה ומזון

אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות במהלך הטיפול בוטוביה. זה עשוי להגדיל את כמות ווטובייה שמיץ אשכוליות ימנע להיטול.

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון, אבל יש לעשות זאת בעקביות בכל יום באותו אופן.

היריון, הנקה ופוריות

וּטוֹבִייה עלולה לפגוע בעובר ולכן אינה מומלצת במהלך ההיריון. ספרי לרופא אם את בהריון או חושבת שאת יכולה להיות בהריון.

נשים עלולות להיכנס להיריון חיובית להשתמש באמצעי מניעה יעילים ביותר במהלך הטיפול, ולמשך 8 שבועות לאחר הפסקת הטיפול. אם למרות צעדים אלה, את חושבת שנסכסת להיריון, פני לרופא לקבלת יעוץ לפני נטילה נוספת של ווטוביה.

הנקה

וּטוֹבִייה עלולה לפגוע בתינוק יונק, אין להניק במהלך הטיפול ובמשך שבועיים לאחר לקיחת המנה האחרונה של ווטוביה. ספרי לרופא אם הינך מיניקה.

פוריות

ייתכן שיש לווטוביה השפעה על פוריות הגבר והאישה.

יש היוועץ ברופא אם הינכם מעוניינים בילדים.

נהיגה ושימוש במכוונת

אם אתה מרגיע עייף באופן חריג (עייפות היא תופעת לוואי נפוצה), יש לפעול במשנה זהירות בעת נהיגה או שימוש במכוונת.

באשר לילדים, יש להזהירם מקריבה על אופנים או ממשקים בקרבת הכביש וכדומה.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

וּטוֹבִייה מכילה ליקטוז (סוכר החלב). אם נאמר לך על ידי הרופא כי הינך רגיש לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו.

3. כיצד שתשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוד על הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

הרופא יקבע את המינון לווטוביה בהתאם ל:

- גילך

- גודל גופך

- בריאות הכבד שלך

- תרופות אחרות שאתה לוקח

אין לעבור על המנה המומלצת.

יערכו לך בדיקות דם במהלך הטיפול בווטוביה. זאת על מנת למדוד את כמות הווטוביה בדמך ולמצוא את המנה היומית הטובה ביותר עבורך.

אם הינך סובל מתופעות לוואי מסוימות (ראה סעיף 4: "תופעות לוואי") במהלך הטיפול בוטוביה, ייתכן שהרופא יורה לך להוריד את המינון או להפסיק את הטיפול לזמן קצר או לצמיתות.

צורת הטיפול

- יש לטול ווטוביה בטבילות מסוימות פעם ביום.

- יש לטול בכל יום באותו זמן.

ניתן ליטול את ווטוביה או בלי מזון, אבל יש לעשות זאת בעקביות בכל יום באותו אופן.

יש לטול ווטוביה טבילות מסויטות כתרחיף למתן דרך הפה בלבד.

אין ללוטם או לנתוש את הטבילות המסיטות. אין לבלוע אותן בשלמות. עליך לערבב את הטבילות המסיטות עם מים כדי ליצור נוזל עכור (המכונה תרחיף למתן דרך הפה).

כיצד להכין ולקחת את התרחיף למתן דרך הפה

הכן את התרחיף למתן דרך הפה על ידי ערבוב הטבילות המסיטות עם מים במזרק למתן או לחריץ מין של הפה או לחיזולה בכוס קטנה. עליך לשחות את התרחיף מיד לאחר הכנתו. אם לא נשתית בתוך 60 דקות, דזוק את התרחיף והכן תרחיף חדש. אנו קרא את ההוראות המפורטות בסוף עלון זה כדי לדעת כיצד לעשות זאת. ישאל את הרופא או הרוקח אם אינך בטוח.

מידע מיוחד למטפלים

למטפלים מומלץ להימנע ממגע עם תרחיף של ווטוביה טבילות מסיטות. יש לטשוף ידיים הימידיות לפני ואחרי הכנת התרחיף.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר
אם נטלת מנת יתר או אם טבעת בלוע ילד או אדם אחר מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של פני חולים, והבא אריזת התרופה והעלון איתך כדי שהרופא ידע מה נטלת. ייתכן שיהיה צורך בטיפול רפואי דחוף.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרוש, טול את המנה הבאה במועד הבא הרגיל. אין לקחת מנה כפולה כדי לפצות על המנה ששכחח.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בודק תוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בווטוביה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אין תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

הפסק את נטילת ווטוביה ופנה לעזרה רפואית באופן מיידי, אם אתה או ילדך חווה אחד מהסימנים הבאים של תגובה אלרגית:

• קשיים בנשימה או בבליעה

• נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשוך או הגרון [סימנים של בצקת אלרגית (אנגיואדמה)]

• גירוד חמור בעור, עם פריחה אדומה או נפיחויות בולטות

שימוש בתרופה ומזון

אין לאכול אשכוליות או לשותות מיץ אשכוליות במהלך הטיפול בוטוביה. זה עשוי להגדיל את כמות ווטובייה שמיץ אשכוליות ימנע להיטול.

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון, אבל יש לעשות זאת בעקביות בכל יום באותו אופן.

וּטוֹבִייה עלולה לפגוע בעובר ולכן אינה מומלצת במהלך ההיריון. ספרי לרופא אם את בהריון או חושבת שאת יכולה להיות בהריון.

נשים עלולות להיכנס להיריון חיובית להשתמש באמצעי מניעה יעילים ביותר במהלך הטיפול, ולמשך 8 שבועות לאחר הפסקת הטיפול. אם למרות צעדים אלה, את חושבת שנסכסת להיריון, פני לרופא לקבלת יעוץ לפני נטילה נוספת של ווטוביה.

הנקה

וּטוֹבִייה עלולה לפגוע בתינוק יונק, אין להניק במהלך הטיפול ובמשך שבועיים לאחר לקיחת המנה האחרונה של ווטוביה. ספרי לרופא אם הינך מיניקה.

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100)

- נפיחות, תחושת כובד או לחץ מקומי, כאב, תנועתיות מוגבלת של חלקי הגוף (יכולה להתרחש בכל מקום בגוף ומהווה סימן אפשרי להצטברות נוזלים חריגה ברקמה רכה עקב קשימה במערכת הלימפה. הנקראת גם לימפואדמה (Lymphoedema))

- פריחה, גירוד, ספרדות, קשיים בנשימה או בבליעה, סחרחורת (סימנים של תגובה אלרגית חמורה, הנקראת גם רגישות יתר)

- חום, שיעול, קשיי נשימה, צנפונים (סימנים של דלקת ברקמת הריאה, הנקראת גם פנאומוניטיס [pneumonitis]).

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100)

- פריחה של שלפוחיות קטנות מלאות נוזל המופיעות על עור אדמומי (סימנים של זיהום ויראלי בעל פוטנציאל להיות חמור, הנקרא גם הרפס חוסר [שלבקת גורטרן])

- צמרמורת, נשימה יקצב כל מהירים, פריחה וייתכן בלבול וחוסר התמצאות (סימנים לזיהום חמור, הנקרא גם אלח דם [sepsis]).

אם תרגיש באחת מתופעות לוואי אלו, פנה מיד לרופא שלך כי ייתכן שתוצאותיהן מסכנות חיים.

תופעות לוואי אפשריות נוספות של ווטוביה כוללות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (תופעות שמופיעות ביותר משתמש 1 מתוך 10)

- דלקת של דרכי הנשימה העליונות

- כאב גרון ונזלת (nasopharyngitis)

- כאב ראש, לחץ בעיניים, באף או באזור הלחיים (סימנים של דלקת בינוסית)ובמעברים של האף, הנקראת גם סינוסיטיס)

- זיהום בדרכי השתן

- רמה גבוהה של שומנים בדם (יתר כולסטרול בדם)

- ירידה בתיאבון

- כאב ראש

- שיעול

- כיבים בפה

- שלשול

- הקאה

- אנהק (חטטת)

- פריחה בעור

- הרגשת עייפות

- חום

- הפרעות במחזור הווסת כגון היעדר מחזור הווסת (אל וסת) או מחזורי וסת לא סדירים

- כאב גרון (דלקת הלוע [דלקת גרון])

- כאב ראש, סחרחורת, סימנים של לחץ דם גבוה (יתר לחץ דם).

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב 10-1 משתמשים מתוך 100)

- זיהום באוזן התיכונה

- זיהום נפוחות ומדוממות (סימנים לדלקת בחניכיים, הנקראת גם gingivitis)

- דלקת בעור (צליוליטיס)

- רמה גבוהה של ליפידים (שומנים) בדם (עודף שומנים בדם, עלייה בטריגליצרידים)

- רמה נמוכה של ספואסט בדם (היפופוספטיה)

- רמה גבוהה של סוכר בדם (היפרגליקמיה)

- עייפות, קוצר נשימה, סחרחורת, חיוורון (סימנים של רמה נמוכה של תאי דם אדומים [אנמיה])

- חום, כאב גרון או כיבים בפה עקב זיהומים (סימנים של רמה נמוכה של תאי דם לבנים [לימפופניה, לימפופניה, נויטרופניה])

- דימום או חבלה פוטנטיים (סימנים של רמה נמוכה של טסיות דם [תרומבוסטופניה])