

مايزنت®

دليل للمُتعالج والمُعالج

أمور هامة يجدر تذكرها حول علاجك بـمايزنت (سيپونيمود)

إذا عانيت من أعراض جانبية أيا كانت، تحدث مع الصيدلي، الممرضة، أو الطبيب الخاص بك بما في ذلك إذا كان الحديث يجري عن عارض جانبي لم يُذكر في النشرة للمستهلك المرفقة بالعبوة.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

إضافة إلى ذلك، يمكنك إبلاغ صاحب التسجيل، نوفارتيس إسرائيل م.ض، على:

safetydesk.israel@novartis.com

تمت الصادقة على هذا الدليل وفق تعليمات وزارة الصحة في تاريخ 21 كانون الأول 2022

 NOVARTIS

نوفارتيس إسرائيل م.ض شارع توتسيرت هارتس 6، ص.ب. 7126، تل أبيب، هاتف: 03-9201111، فاكس: 03-9229230

RMP 2022-011 ARB



المحتويات:

4	مقدمة
4	ما هو التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis)
4	ما هو مايزنت وكيف يعمل
5	قبل تناول مايزنت
6	تناول مايزنت في المرة الأولى
6	بدء علاجك بمايزنت
7	جدول مواعيد تناول مايزنت
7-9	الأعراض الجانبية والمخاطر الهامة
10	العلاج بمايزنت لدى النساء
11	نسيت تناول أقراصك وتوقفت عن العلاج بالدواء
11	التوقف عن العلاج بمايزنت
11	تفاصيل الاتصال بطبيبك



مقدمة



قبل تناول مايزنت

الفحص والتحضير للعلاج



قبل بدء العلاج، سيجري الطبيب فحص دم لتحديد مدى تفکك مايزنت في جسمك، لتحديد الجرعة الملائمة لك. في حالات معينة، قد يُظهر الفحص أن مايزنت لا يشكل إمكانية علاجية ملائمة لك.

قد تكون هناك حاجة إلى إجراء فحص دم لـتعداد خلايا الدم البيضاء وفحص أداء الكبد لديك، في حال لم تُجر هذه الفحوصات مؤخرًا (خلال الأشهر الـ 6 الأخيرة).

سيفحص طبيبك الجلد لمعرفة إذا طرأ نمو شاذ أو تغيير على الجلد.

إذا لم تعان من جدري الماء في الماضي، أو إذا كنت لا تذكر إذا أصبت بالمرض، عليك إبلاغ الطبيب. إذا لم تكن محميًا من هذا الفيروس، عليك تلقي لقاح قبل بدء العلاج بمايزنت. في هذه الحال، سيؤجل طبيبك بدء العلاج بمايزنت لمدة شهر واحد بعد إكمال كل سلسلة اللقاحات.



أخبر طبيبك إذا كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اضطرابات في الرؤية أو من مشاكل في مركز العين (وذمة بقعية)، من التهاب أو عدوى في العين (uveitis)، أو إذا كنت تعاني من مستويات سكر مرتفعة في الدم (السكري). إذا كان لديك ماض من إحدى هذه الحالات، فقد يقترح عليك طبيبك أن تجتاز فحص عيون قبل بدء العلاج بمايزنت.



إذا كنت تعاني من مرض قلبي أو إذا كنت تتناول دواء قد يبطئ وتيرة نظم قلبك، سوف يقيس طبيبك ضغط دمك، ويجرى فحصاً يدعى مخطط كهربائية القلب (ECG) لفحص وتيرة نظم قلبك قبل بدء العلاج بمايزنت. كذلك، قد يطلب منك طبيبك زيارة طبيب أمراض القلب للحصول على استشارة حول طريقة بدء العلاج بمايزنت وطريقة المتابعة لاحقاً.



أدوية أخرى



أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أية أدوية من شأنها أن تؤثر في جهازك المناعي، أو دواء قد يؤدي إلى بطء نظم قلبك.

قد تحتاج إلى تغيير علاجك الدوائي الاعتيادي أو التوقف عنه مؤقتاً لفترة زمنية قصيرة. وذلك لأن تأثيرات هذه الأدوية قد تزداد أثناء استعمالها سوياً مع مايزنت.

يحتوي هذا الدليل على معلومات مهمة عن تناول مايزنت (سيبونيود)، الجرعة، الأعراض الجانبية، والمخاطر المحتملة المنوطة بها، بما في ذلك إرشاد حول الحمل. قبل بدء العلاج، اقرأ هذا الدليل بتمعن، والنشرة للمستهلك المرفقة بعبوة دواء مايزنت. تحتوي النشرة للمستهلك على معلومات إضافية عن الأعراض الجانبية المحتملة.

احفظ بهذا الدليل سوية مع النشرة للمستهلك المرفقة بعبوة لمراجعتها عند الحاجة خلال العلاج. يجب إبلاغ أي طبيب تزوره بأنك تلتقي علاجاً بمايزنت.

عند بدء العلاج بمايزنت، يمكن استعمال جدول المواعيد لتناول الدواء الموجود في الصفحة 7.

إذا كانت لديك أعراض جانبية، من المهم أن تخبر طبيبك بها.

يشتمل ذلك على كل الأعراض الجانبية المحتملة التي لم تُذكَر في النشرة للمستهلك.

ما هو التصلب المتعدد (Multiple Sclerosis)

التصلب المتعدد (MS) هو مرض عصبي يلحق ضرراً بالدماغ والجبل الشوكي. لدى مرضى التصلب المتعدد (MS)، تهاجم الخلايا الذاتية في الجسم، عن طريق الخطأ، الخلايا العصبية في الدماغ والجبل الشوكي. مع مرور الوقت، يحدث فقدان لهذه الخلايا العصبية، مما يؤدي إلى عجز متزايد.

لدى بعض الأفراد، تتفاقم الأعراض تدريجياً منذ بدء المرض، ويتميز المرض لديهم بالنمط المتقدم (التصلب المتعدد المتقدم)، ولكن لدى آخرين تظهر الأعراض وتزول (التصلب المتعدد متكرر الانكماش والهدوء، RRMS).

في نهاية المطاف، خلال 10 سنوات، يعني أكثر من 50% من مرضى التصلب المتعدد من نوع التصلب المتعدد متكرر الانكماش والهدوء، من تفاقم الأعراض المتواصل، دون علاقة بالنوبات، ما يؤدي إلى عجز. تدعى هذه الحالة التصلب المتعدد المتقدم الثانوي (SPMS).

ما هو مايزنت وكيف يعمل

يحتوي مايزنت على مادة فعالة تدعى سيبونيود، وهو معدّل لمستقبل سفينچوزين-1 - فوسفات

(S1P-receptor modulator)

يُستعمل مايزنت لعلاج أشكال نوبات التصلب المتعدد (MS) التي تشتمل على مرض من نوع التصلب المتعدد متكرر الانكماش والهدوء، ومرض متقدم ثانوي نشط لدى البالغين.

يعمل مايزنت عبر تقليل قدرة خلايا المناعة الذاتية في الجسم (خلايا الدم البيضاء) على الانتقال إلى الدماغ والجبل الشوكي ومحاربة الخلايا العصبية.

تبين من بحث واسع بالمرحلة 3 أن مايزنت قد نجح في إبطاء تأثيرات نشاط المرض، مثلاً: إبطاء تفاقم العجز، الآفات الدماغية والنوبات.

لا يوصى باستعمال مايزنت إذا كنت تعاني من مرض قلب معين، أو إذا كنت تتناول أدوية أخرى معروفة كأدوية لإبطاء وتيرة نظم القلب.



جدول مواعيد تناول مايزنت

تناول مايزنت في المرة الأولى



* تعتمد جرعة العلاج على نتائج فحص دمك الذي أجري قبل بدء العلاج.

الأعراض الجانبية والمخاطر الهمامة:

أعراض متعلقة بالرؤية

قد يؤدي مايزنت إلى تورم في الجزء الخلفي من العين. تُعرف هذه الحالة كوذمة بقعية وهي قابلة للانعكاس في حال تشخيصها في مرحلة مبكرة.



تشتمل الأعراض المحتملة على:

- تشوّش الرؤية أو رؤية متوجّحة في مركز العين
- فقدان الرؤية
- تبدو الألوان فاتحة أو مختلفة

قد يطلب منك طبيبك إجراء فحص عيون قبل أن تبدأ العلاج بمايزنت وخلاله.

أخبر طبيبك فوراً بأي تغيير يطرأ على رؤيتك، خلال العلاج وحتى شهر بعد التوقف عن العلاج بمايزنت

وتيرة نظم قلب بطيئة

عند بدء العلاج، قد يبطئ مايزنت وتيرة نظم القلب بشكل مؤقت، ما قد يسبب لديك الدوخة أو الشعور بالدوار. لدى معظم المتعالجين، تعود وتيرة نظم القلب إلى الوتيرة السليمة في غضون 10 أيام.



- لا يجوز لك السياقة أو استعمال الماكينات خلال اليوم الأول من بدء العلاج بمايزنت لأنك قد تشعر بالدوخة.
- أخبر طبيبك فوراً إذا عانيت من دوخة، دوار (vertigo)، غثيان، تعب أو ضربات قلب (خفقان)، بعد الجرعة الأولى أو خلال الأيام الستة الأولى من العلاج.

إذا كنت تعاني من مرض قلبي، فقد يطلب منك طبيبك أن تظل في العيادة أو في المستشفى لمدة 6 ساعات على الأقل بعد تناول الجرعة الأولى، لإجراء فحوصات منتظمة لضغط الدم والنبض لديك، ومخطط كهربائية القلب (ECG) لفحص وتيرة نظم قلبك. إذا ظهرت أية نتائج استثنائية في فحص مخطط كهربائية القلب خلال هذه الفترة، فقد تحتاج إلى الخضوع لمتابعة لفترة زمنية أطول (ربما طوال ليلة) حتى تزول هذه النتائج.

بدء العلاج بمايزنت



يبدا العلاج الخاص بك بعبوة معايرة الجرعة التي تستغرق 5 أيام. ستبدأ بجرعة مقدارها 0.25 ملغ (قرص واحد) في اليومين 1 و 2، ثم 0.5 ملغ في اليوم 3 (قرصين)، 0.75 ملغ في اليوم 4 (ثلاثة أقراص) و 1.25 ملغ في اليوم 5 (خمسة أقراص)، لبلوغ الجرعة العلاجية الموصى بها بدءاً من اليوم 6 فصاعداً (2 ملغ أو 1 ملغ وفق نتائج فحص دمك، الذي أجري قبل بدء العلاج).

يساعد رفع جرعة مايزنت تدريجياً طوال فترة زمنية على تقليل التأثير المؤقت على قلبك عند بدء العلاج.

عليك تناول أقراص مايزنت مرة واحدة في اليوم. بشكل مثالي، يُفضل تناوله في ذات الساعة من كل يوم. خلال الأيام الـ 6 الأولى، يوصى بتناول الأقراص في الصباح. يجب تناول الأقراص مع أو من دون طعام.



الأعراض الجانبية والمخاطر الهمامة:

أداء الكبد

قد يؤدي مايزنت إلى نتائج استثنائية في فحوصات أداء الكبد.

توجه إلى طبيبك إذا لاحظت أعراضًا مثل:



- غثيان مجهول السبب
- تقيؤات
- ألم في البطن
- تعب
- اصفرار العينين أو الجلد
- بول داكن

قد تكون هذه الأعراض علامات على مشاكل في الكبد، لهذا عليك التوجه إلى طبيبك الذي سيقوم بفحص أداء الكبد.

عدوى



بما أن مايزنت يؤثر في جهاز المناعة، فقد تكون معرضًا أكثر للعدوى. إذا عانيت من أحد الأعراض التالية خلال العلاج، وحتى شهر بعد التوقف عن العلاج، عليك إبلاغ طبيبك فوراً.

الأعراض المحتملة لعدوى فطرية خطيرة أو عدوى فيروسية خطيرة (مثل التهاب في الدماغ وأو السحايا) هي:

- حمى
- أعراض شبيهة بالإإنفلونزا
- صداع مصحوب بتيبس الرقبة
- غثيان
- حساسية للضوء
- طفح
- هريس نطاقي (القوباء المنطقية)
- ارتباك
- اختلالات (نوبات)

الأعراض الجانبية والمخاطر الهمامة:

الأورام الخبيثة

عندما تتلقى علاجاً بمايزنت، هناك خطر متزايد لحدوث أورام خبيثة جلدية.



عليك الحد من تعرضك للشمس والأشعة فوق البنفسجية (UV) وحماية نفسك بارتداء ملابس ملائمة واستعمال بشكل ثابت لوافي حماية من الأشعة ذي عامل حماية مرتفع من أشعة UV.

لا يجوز لك الحصول على علاج بالضوء بأشعة UV-B أو على علاج كيميائي ضوئي بأشعة PUVA (علاج PUVA يستعملن لاضطرابات جلدية معينة) خلال العلاج بمايزنت.

إذا كنت تعتقد أن التصلب المتعدد لديك تفاقم بوتيرة أسرع بكثير (مثلاً: ضعف، اختلالات أو تغيرات في الرؤية) أو إذا اخترطت أعراضًا جديدة أو استثنائية (مثلاً صداع، نسيان، تغيرات في المزاج أو السلوك)، تحدث مع طبيبك في أسرع وقت ممكن. قد تظهر هذه الأعراض بسبب عدوى دماغية نادرة جداً تدعى اعتلال بيضاء الدماغ متعدد البور المترافق (PML)، الذي قد يحدث لدى متعالجين يتلقون أدوية مثل مايزنت وأدوية أخرى تُستعمل لعلاج التصلب المتعدد (MS).

عليك إبلاغ طبيبك فوراً إذا تطورت لديك نتوءات جلدية (مثلاً: نتوءات لامعة شبيهة باللؤلؤ)، بقع أو جروح مفتوحة لا تلتئم خلال أسبوع. قد تشتمل أعراض سرطان الجلد على نمو استثنائي أو تغيرات في نسيج الجلد (مثلاً: شامات استثنائية) مع تغيير في لون الجلد، شكله أو حجمه مع مرور وقت. يجري طبيبك فحوصات جلدية منتظمة في بداية العلاج وبعد ذلك خلال العلاج بمايزنت.

الأعراض الجانبية والمخاطر الهمامة:

أعراض/علامات متعلقة بالأمراض العصبية والنفسية

يجب إبلاغ طبيبك فوراً بكل الأعراض/العلامات العصبية أو النفسية غير المتوقعة (مثلاً ظهور مفاجئ لحالات صداع خطيرة، ارتباك، اختلالات وتغيرات في الرؤية) أو تفاقم مشكلة عصبية.






نسيت تناول أقراصك وتوقفت عن العلاج بالدواء

لا يجوز لك بدء العلاج مجدداً حسب جرعتك العادمة إذا:

- نسيت تناول علاجك في أي يوم خلال أيام العلاج الـ 6 الأولى
- نسيت تناول علاجك أو اضطررت للتوقف عن علاجك لمدة 4 أيام أو أكثر على التوالي بينما تتناول الجرعة العلاجية التي وصفها لك الطبيب



عليك الامتناع عن أن تصبحي حاملاً خالل تناول مايزنت لأن هناك خطرًا لحدوث ضرر لدى الجنين. يجب أن تكون نتيجة فحص الحمل لديك سلبية، وذلك قبل بدء العلاج وفي فترات زمنية محددة.



تحديث مع طبيبك عن وسائل منع الحمل الموثوق بها التي عليك استعمالها خلال العلاج بمايزنت ولمدة 10 أيام على الأقل بعد إيقاف العلاج.



في حال حدوث إحدى الحالات المذكورة أعلاه، يجب بدء العلاج مجدداً باستخدام عبوة معايرة جرعة جديدة، وكذلك يجب بعد الجرعة الأولى متابعة المعالجين الذين لديهم مشاكل قلبية معينة. توجه إلى طبيبك لملاعبة بدء العلاج مجدداً.

التوقف عن العلاج بمايزنت

بعد التوقف عن العلاج بمايزنت، أخبر طبيبك فوراً إذا كنت تعتقد أن علامات المرض تفاقمت (مثل ضعف أو تغييرات في الرؤية) أو إذا اختبرت أعراضًا جديدة.



لمزيد من المعلومات، اقرأ النشرة للمستهلك قبل استعمال الدواء.

لا يجوز لك استعمال مايزنت إذا كنت حاملاً أو قادرة على الحمل و كنت لا تستعملين وسائل منع حمل ناجعة.

تفاصيل الاتصال بطبيبك

** لتبسيط وتسهيل قراءة هذا الدليل ورد النص بصيغة المذكر، مع ذلك الدواء معدّ لأبناء كلا الجنسين.