

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986** התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

## סקייריזימא 150 מ"ג תמיסה להזרקה במזרק מוכן להזרקה

**החומר הפעיל וריכוזו:** כל מזרק מוכן להזרקה מכיל ריזאנקיזומאב 150 מ"ג מ"ל, 150 mg/1 ml Risankizumab לרשימת חומרים בלתי פעילים ואלרגניים – אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" בעלון זה.

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטום תשתמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

**1. למה מיועדת התרופה?**

ספחת רובדיית

סקייריזי מיועדת לטיפול בספחת (פסוריאזיס) רובדית בינונית עד חמורה, במבוגרים שמועמדים לטיפול סיסטמי. דלקת מפרקים ספחתית

סקייריזי, לבד או בשילוב עם מתורקסאט (MTX), מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית פעילה במבוגרים אשר חוו תגובה לא מספקת בטיפול קודם בתרופה אנטי ראוטית אחת או יותר מקבוצת DMARDs או שהטיפול היה בלתי נסבל עבורם.

**קבוצה תרפיטית:**

מדכאי מערכת החיסון, מעכבי אינטרלוקין.

סקייריזי פועלת על ידי חסימת חלבון בגוף המכונה 'IL-23', אשר גורם לדלקת.

ספחת רובדיית

סקייריזי מיועדת לטיפול במבוגרים עם ספחת (פסוריאזיס) רובדית בינונית עד חמורה. סקייריזי מפחיתה דלקת ובכך יכולה לסייע בהפחתת תסמינים של ספחת (פסוריאזיס) רובדית כגון צריבה, גרד, כאב, אדמומיות והיווצרות שקששים. דלקת מפרקים ספחתית

סקייריזי מיועדת לטיפול בדלקת מפרקים ספחתית במבוגרים. דלקת מפרקים ספחתית הינה מחלה הגורמת למפרקים מודלקים ופסוריאזיס. אם אתה סובל מדלקת מפרקים ספחתית פעילה, ייתכן ותחילה תקבל תרופות אחרות. אם תרופות אלו אינן מפשיעות באופן מספק, תקבל סקייריזי עם או ללא תרופות אחרות לטיפול בדלקת המפרקים הספחתית שלך.

סקייריזי מפחיתה לגעת ובכך יכולה לעזור בהפחתת כאב, נוקשות ונפיחות במפרקים שלך ומסביבם, כאב ונוקשות בעמוד השדרה וספחתיים בעור. נזק ספחתי לציפורניים ועלולה להאט את הגוף לצעם במפרקים שלך. השפעות אלו יכולות להקל על הפעילות היום-יומית הרגילה שלך, להפחית עייפות ולשפר את איכות חיךך.

**2. לפני השימוש בתרופה**

**אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגיש (אלרגי) לריזאנקיזומאב או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה תרופה זו (מפורטים בסעיף 6).
- יש לך זיהום, כולל שחפת פעילה, שלדעת הרופא שלך הינו משמעותי.

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול ובמהלך השימוש בסקייריזי ספר לרופא אם:**

- יש לך זיהום כעת או אם אתה סובל מזיהומים חוזרים.
- יש לך שחפת.
- קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון.

בסקייריזי, קיבלת לאחרונה או שאתה מתכנן לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקייריזי.

**תגובות אלרגיות**

ספר לרופא או פנה מיד לעזרה רפואית אם אתה מבחין באחד מהסימנים של תגובה אלרגית במהלך השימוש בסקייריזי, כגון:

- קושי בנשימה או בבליעה
- נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון או הגרון
- גרד חמור של העור, המלווה בפריחה אדומה או בנגעי עור מורמים

**ילדים ומתבגרים**

סקייריזי אינה מיועדת עבור ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים, זאת מאחר שסקייריזי לא נחקרה בקבוצת גיל זו.

**אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות**

**אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.** במיוחד אם קיבלת לאחרונה או אתה מתכנן לקבל חיסון. עליך להימנע מקבלת חיסונים מסוגים מסוימים במהלך השימוש בסקייריזי.

אם אינך בטוח, שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך לפני ובמהלך השימוש בסקייריזי.

**הריון, הנקה ופוריות**

אם הינך אישה בגיל הפוריות, עלייך להשתמש באמצעי מניעה במהלך השימוש בתרופה זו, ובמשך 21 שבועות לפחות לאחר המנה האחרונה של סקייריזי.

לא קיים מידע מספק בנוגע לשימוש בסקייריזי בהריון, ועל כן, כאמצעי זהירות, מומלץ להימנע מהשימוש בתרופה במהלך ההריון.

לא ידוע אם סקייריזי מופרשת לחלב אם. ספרי לרופא שלך אם הינך מניקה או מתכננת להניק לפני השימוש בתרופה זו.

**נהיגה ושימוש במכוונת**

סקייריזי לא צפויה להשפיע על שימוש במכוונת ועל הנהיגה שלך.

**מידע חשוב על חלק מהרכיבים של התרופה**

אנא ראה סעיף 6 – "מידע נוסף" בעלון זה.

**3. כיצד תשתמש בתרופה?**

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח שלך אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתרופה.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

תרופה זו ניתנת בוריקה מתחת לעור שלך (נקראת הזרקה תת-עורית).

כל מנה מכילה 150 מ"ג הניתנת בזריקה אחת. לאחר המנה הראשונה, תקבל את המנה הבאה כעבור 4 שבועות, ולאחר מכן כל 12 שבועות.

אתה והרופא, הרוקח או האחות שלך צריכים להחליט האם אתה אמור להזריק תרופה זו בעצמך. אל תזריק לעצמך את התרופה עד שתקבל הדרכה על ידי הרופא, הרוקח או האחות שלך. גם מטפל יכול להזריק לך אחרי הדרכה מתאימה.

**אין לעבור על המנה המומלצת.**

עיינ בסעיף 7 'הוראות שימוש' בסוף עלון זה לפני שתזריק לעצמך סקייריזי.

**אם הזרקת בטעות מינון גבוה יותר**

אם בטעות הזרקת מנת יתר של סקייריזי או שהמנה ניתנה במועד מוקדם יותר מזה אשר נקבע על פי מרשם רופא או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

**אם שכחת להזריק סקייריזי**

אם שכחת להזריק סקייריזי, עליך להזריק מנה מיד כשתיזכר בכך. שוחח עם הרופא שלך אם אינך בטוח בנוגע למה עליך לעשות.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

**אם אתה מפסיק להשתמש בסקייריזי**

אין להפסיק להשתמש בסקייריזי ללא התייעצות תחילה עם הרופא. אם תפסיק את הטיפול התסמינים שלך יכולים לחזור.

**אין ליטול תרופות בחושיך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

**4. תופעות לוואי**

כמו בכל תרופה, השימוש בסקייריזי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל חיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**תופעות לוואי חמורות**

**עליך לשוחח עם הרופא או לפנות לעזרה רפואית באופן מיידי אם יש לך תסמינים של זיהום חמור, כגון:**

- חום, תסמינים דמויי שפעת, הזעות לילה
- תחושת עייפות או קוצר נשימה, שיעול שאינו חולף
- עור חם, אדום וכואב, או פריחה כואבת בעור עם שלפוחיות
- הרופא שלך יחליט אם תוכל להמשיך להשתמש בסקייריזי.

**תופעות לוואי אחרות**

ספר לרופא שלך אם מופיעה אחת מתופעות הלוואי הבאות:

**תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) (תופעות שמופיעות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):**

- זיהומים בדרכי הנשימה העליונות המלווים בתסמינים כגון כאב גרון וגודש באף

**תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 100):**

- תחושת עייפות
- זיהום פטרייתי בעור
- תגובות במקום הזרקה (כגון אדמומיות או כאב)
- גרד
- כאב ראש

**תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב- 10-1 משתמשים מתוך 1,000):**

- בליטות קטנות ואדומות על העור

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

**דיווח תופעות לוואי**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שממצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

**5. איך לאחסן את התרופה?**

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date). המופיע על גבי תווית המזרק ואריות הקרטון החיצונית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן במקרר (2°C–8°C). אין להקפיא.
- יש לשמור את המזרק באריות הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- במידת הצורך, ניתן לאחסן את המזרק מוכן להזרקה גם מחוץ למקרר (עד מקסימום 25°C) עד 24 שעות באריות הקרטון המקורית על מנת להגן מאור.
- אין להשתמש בתרופה זו אם הנוזל נראה עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים.
- אין להשליך תרופות לביוב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח שלך כיצד יש להשליך תרופות שאינן עוד בשימוש. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

**6. מידע נוסף**

**מה סקייריזי מכילה**

נוסף על החומר הפעיל, התרופה מכילה גם:

Trehalose dihydrate, sodium acetate trihydrate, polysorbate 20, acetic acid glacial and water for injection

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל מזרק מוכן להזרקה, כלומר למעשה היא 'נטולת נתרן'.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה?** סקייריזי היא נוזל צלול וחסר צבע עד צהוב הנמצא בתוך מזרק מוכן להזרקה עם מגן מחט. הנוזל עלול להכיל חלקיקים זעירים בצבע לבן או שקוף. כל אריזה מכילה 1 מזרק מוכן להזרקה.

- בעל הרישום וכתובתו:** אבובי ביופארמה בע"מ, החרש 4, הוד השרון, ישראל.

- שם היצרן וכתובתו:** אבובי דויטשלנד ג'י.אם.בי.איז'י' אנד קו. קיי.ג'י, קנולטסרסה, 67061, לודיגשפן, גרמניה.

- נערך בספטמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות**

- מספר ירשום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:** 169-73-36871

למידע נוסף ולמוקד תוכנית התמיכה


התקשרו 6718\*

**abbvie**  
**care** *with you*

**7. הוראות שימוש**

**אנא קרא את סעיף 7 במלואו לפני השימוש בסקייריזי**

**סקייריזי מזרק מוכן להזרקה**



**לפני שתזריק סקייריזי, חשוב שתדע**

- עליך לקבל הדרכה כיצד להזריק סקייריזי לפני מתן הזריקה. שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך אם אתה זקוק לעזרה
- סמן את התאריכים על לוח השנה שלך, כך שתדע מתי להזריק סקייריזי
- שמור את סקייריזי באריות הקרטון המקורית על מנת להגן על התרופה מפני אור עד למועד השימוש בה
- אין להזריק אם הנוזל עכור או מכיל פתיתים או חלקיקים גדולים.** הנוזל צריך להיראות צלול עד צהוב ועלול להכיל חלקיקים זעירים לבנים או שקופים
- אין** לנער את המזרק
- המתן עם הסרת מכסה המחט עד ממש לפני הזרקה

**החזר תרופה זו לבית המרקחת**

- אם תאריך התפוגה (EXP) חלף
- אם הנוזל אי פעם קפא (אפילו אם הפשיר)
- אם המזרק נפל או נפגם
- אם אריות הקרטון איננה שלמה

**להזרקה נוחה יותר:** הוצא את אריות הקרטון מהמקרר והשאר אותה בטמפרטורת החדר, הרחק מאור שמש ישיר, למשך **עד 15 עד 30 דקות** לפני הזרקה.

- אין לחמם את סקייריזי בשום דרך אחרת (לדוגמא, בתוך מיקרוגל או במים חמים)
- שמור את המזרק בתוך אריות הקרטון עד שתהיה מוכן להזריק

**עקוב אחר השלבים מטה בכל פעם שאתה משתמש בסקייריזי**

<b>שלב 1</b>	<p>הוצא את המזרק מוכן להזרקה מעטיפתו בעזרת ידית האחיזה.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>אין</b> להחזיק או למשוך את הבוכנה בעת הוצאת המזרק מוכן להזרקה מעטיפתו</li></ul> <p>הנח את הפריטים הבאים על משטח נקי ושטוח:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1 מזרק מוכן להזרקה</li> <li>1 פד אלכוהול (אינו כלול באריות הקרטון)</li> <li>1 דודר צמר גפן או פד גאזה (אינו כלול באריות הקרטון)</li></ul> <p>שטוף ויבש את ידיך.</p>	<p>אזורי הזרקה</p>
<b>שלב 2</b>	<p>בחר מתוך 3 אזורי הזרקה:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ירך שמאל קדמית</li> <li>ירך ימין קדמית</li> <li>בבטן במרווח של 5 ס"מ לפחות מהטבור</li></ul> <p>לפני הזרקה, נגב את המקום שבו אתה עומד להזריק עם פד אלכוהול בתנועה סיבובית.</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>אין</b> לגעת או לנשוף על מקום הזרקה לאחר שהוא נוקה. אפשר לעור להתייבש לפני הזרקה</li> <li><b>אין</b> להזריק דרך בגדים</li> <li><b>אין</b> להזריק לתוך עור כואב, חבול, אדום, קשה, מצולק, או עם סימני מתחים</li> <li><b>אין</b> להזריק לתוך אזורים עם פסוריאזיס</li></ul>	<p>אזורי הזרקה</p>

<b>שלב 3</b>	<p>בדוק נוזל</p>	אחוז במזרק כשהמחט המכוסה פונה כלפי מטה, לפי האיור.
<b>שלב 4</b>	<p>בדוק נוזל</p>	הסרת מכסה המחט: <ul style="list-style-type: none"><li>אחוז את המזרק ביד אחת בין ידית האחיזה למכסה המחט</li> <li>עם היד השנייה, משוך בעדינות והסר את מכסה המחט</li> <li><b>אין</b> להחזיק או למשוך את הבוכנה בעת הסרת מכסה המחט</li> <li>ייתכן ותראה טיפה של נוזל בקצה המחט. זה תקין</li> <li>השלך את מכסה המחט</li> <li><b>אין</b> לגעת במחט עם האצבעות שלך ואין לאפשר מגע של המחט עם משטח כלשהו</li></ul>
<b>שלב 5</b>	<p>45°</p>	אחוז את גוף המזרק ביד אחת, בין האגודל לאצבע המורה, כפי שהיית מחזיק עיפרון. <p>צטוב בעדינות את האזור עם העור שעבר ניקוי עם ידך השנייה ואחוז בו בחוזקה.</p> <p>החדר את המחט עד הסוף לתוך העור בזווית של כ- 45 מעלות תוך שימוש בתנועה מהירה וקצרה. שמור את המזרק יציב באותה הזווית.</p>
<b>שלב 6</b>	<p>45°</p> <p>מגן המחט</p>	דחוף באיטיות את הבוכנה פנימה עד הסוף, עד שכל הנוזל מזרק. <p>משוך את המחט מתוך העור תוך שמירת המזרק באותה הזווית.</p> <p>הסר באיטיות את האגודל מהבוכנה. בשלב זה, המחט תכוסה על ידי מגן המחט.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>מגן המחט לא יופעל עד אשר יזרוק כל הנוזל</li> <li>שוחח עם הרופא, הרוקח או האחות שלך אם נדמה לך שלא ניתנה מנה מלאה</li></ul> <p>לחץ דודר צמר גפן או פד גאזה במקום הזרקה והחזק למשך 10 שניות.</p>
<b>שלב 7</b>	<p>מגן המחט</p>	השלך את המזרק המשומש למיכל מיוחד לפסולת מיד לאחר השימוש. <ul style="list-style-type: none"><li><b>אין</b> להשליך את המזרק המשומש בפסולת הביתית</li> <li>הרופא, הרוקח או האחות שלך יסבירו לך כיצד יש להחזיר את המיכל המלא המיוחד לפסולת</li></ul>