

أعلم الطبيب أو الصيدلي إذا:

• كنت تعانين من أمراض أخرى،

• وجدت لديك حساسية أو

• كنت تتناولين أدوية أخرى (بما في ذلك تلك التي اشتريتها بنفسك) أو تستعملينها بشكل خارجي

؟
(3) كيف تستعملين الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك الفحص مع الطبيب أو طريقة العلاج سيخدمهما الطبيب، فقط. الجرعة المتبعة بالمستحضر، هي قرص واحد في اليوم لمدة 21 يوماً. يجب تناول القرص كاملاً مع الماء يومياً في ساعة محددة. الساعة التي يتم فيها تناول القرص ليست مهمة، لكن يجب الالتزام بالساعة التي تم اختيارها بذاتها، مثلاً بعد وجبة الفطور أو بعد وجبة العشاء. يُمنع سحق/شطّر/مضغ القرص خوفاً من عدم التوصل إلى جرعة دقيقة. يجب التوقف عن الاستعمال فوراً في الحالات التالية:
- ظهر حالات صداع شديدة بالحقيقة (الصداع النصفي) للمرة الأولى أو ظهر متكرر أكثر لحالات صداع شديدة بصورة شاذة،
- اضطراب ادراكي فجائي (مثل اضطرابات في الرؤية، اضطرابات في السمع)،
- علامات أولى للالتهاب وردي المصحوب بختل أو باضطرابات الناجمة عن تجلط دموي (انصمام) (مثلاً ألم شاذ في الساق أو انتفاخ في الساق، ألم حادة أثناء التنفس أو سعال بدون سبب ظاهر للعين، إعماق)،
- ألم وإناس بالضغط في منطقة الصدر،
- يرقان،
- بنقطة خاطفة الفحص فيما إذا تم تناول القرص في يوم معين.

لا حاجة للشراءط الأخرى.

ابدئي بتناول القرص المشار إليه في اليوم المناسب في الأسبوع. الأسهوم سترشدك بالنسبة لاتجاه التقدّم. يجب تناول الأقراص بحسب اتجاه الأسهوم حتى انتهاء العلبة. هذا يعني أنه يجب تناول قرص واحد أليس في اليوم، خلال الأيام الـ 10 التالية. بعد 21 يوماً من تناول الأقراص، قومي بالاستراحة لمدة 7 أيام. خلال أيام الاستراحة الـ 7، من الممكن أن يظهر تزيف شبهه بزيف الدورة الشهرية، هذه حالة طبيعية. ابدئي بتناول أقراص من العلبة التالية في اليوم الثامن، حتى إذا استمر التزيف أيضًا. بهذه الحالة ستبدين في كل شهر علىة جديدة في نفس اليوم من الأسبوع.

متى يامكانك بدء الاستعمال لأول مرة؟
• إذا كانت لديك دورة شهرية منتظمة، ابدئي بتناول الدواء في اليوم الخامس من التزيف.

• إذا لم يكن لديك دورة شهرية منتظمة، يامكانك البدء بتناول الدواء في كل لحظة تختارينها.

• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، أكملي العلاج كما هو مطلوب، وفي اليوم التالي ابدئي بتناول پروجليوتون.
• إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي لا يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، يامكانك البدء بتناول پروجليوتون في اللحظة التي تختارينها.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

سيحدد الطبيب - وفقاً لاحتياجاتك - كم من الوقت عليك تناول پروجليوتون.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى لم يتم الحصول على تقارير عن جرعة مفرطة. مع ذلك، يحتمل ظهور صداع، غثيان، تقيّبات، إحساس بالضغط في الثديين ونزيف في الرحم. لا حاجة لعلاج خاص، لكن يجب عليك التوجه إلى طبيب.

إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى عرفة الطوارئ في المستشفى، وإحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول القرص:

• إذا كان التأخير بتناول القرص يقل عن 12 ساعة، تناولي القرص بأسرع وقت ممكن واستمري بتناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

• إذا كان التأخير بتناول القرص يزيد عن 12 ساعة، أتركي القرص المنسي في العلبة واستمري في تناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

من المحتمل ظهور نزف في حال نسيت تناول القرص. هذه حالة طبيعية. يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تتحققى من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الوافية في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.
• كنت تتناولين أدوية أخرى (بما في ذلك تلك التي اشتريتها بنفسك) أو تستعملينها بشكل خارجي

4 الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يتسبب استعمال پروجليوتون أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتصدى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل الآتي من أي منها:

أعراض جانبية خطيرة

يجب التوقف عن الاستعمال فوراً في الحالات التالية:
- ظهر حالات صداع شبيهة بالحقيقة (الصداع النصفي) للمرة الأولى أو ظهور متكرر أكثر لحالات صداع شديدة بصورة شاذة،

- اضطراب ادراكي فجائي (مثل اضطرابات في الرؤية، اضطرابات في السمع)،
- علامات أولى للالتهاب وردي المصحوب بختل أو باضطرابات الناجمة عن تجلط دموي (انصمام). بحيث أن القرص الذي يتم تناوله في اليوم الأول هو القرص المشار إليه بـ "1". مثلاً: إذا كان اليوم الأول الذي تناولت به القرص هو يوم الأربعاء، يتم لصنف شريط أيام الأسبوع الذي يبدأ بـ "يوم الأربعاء" الذي يبدأ في يوم الجمعة، لذلك، يتم تناول الأقراص بقية الأسبوع المناسب، مما يتيح لك بنقطة خاطفة الفحص فيما إذا تم تناول القرص في يوم معين.

يجب الالتزام بالشراءط الأخرى.

ابدئي بتناول القرص المشار إليه في اليوم المناسب في الأسبوع. الأسهوم سترشدك بالنسبة لاتجاه التقدّم. يجب تناول الأقراص بحسب اتجاه الأسهوم حتى انتهاء العلبة. هذا يعني أنه يجب تناول قرص واحد أليس في اليوم، خلال الأيام الـ 10 التالية. بعد 21 يوماً من تناول الأقراص، قومي بالاستراحة لمدة 7 أيام. خلال أيام الاستراحة الـ 7، من الممكن أن يظهر تزيف شبهه بزيف الدورة الشهرية، هذه حالة طبيعية. ابدئي بتناول أقراص من العلبة التالية في اليوم الثامن، حتى إذا استمر التزيف أيضًا.

بهذه الحالة ستبدين في كل شهر علىة جديدة في نفس اليوم من الأسبوع.

متى يامكانك بدء الاستعمال لأول مرة؟
• إذا كانت لديك دورة شهرية منتظمة، ابدئي بتناول الدواء في اليوم الخامس من التزيف.

• إذا لم يكن لديك دورة شهرية منتظمة، يامكانك البدء بتناول الدواء في كل لحظة تختارينها.

إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، أكملي العلاج كما هو مطلوب، وفي اليوم التالي ابدئي بتناول پروجليوتون.

إذا كنت تتناولين علاجاً هرمونياً بديلاً آخر الذي لا يسبب ظهور الدورة الشهرية لديك، يامكانك البدء بتناول پروجليوتون في اللحظة التي تختارينها.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

مدة العلاج

سيحدد الطبيب - وفقاً لاحتياجاتك - كم من الوقت عليك تناول پروجليوتون.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى لم يتم الحصول على تقارير عن جرعة مفرطة. مع ذلك، يحتمل ظهور صداع، غثيان، تقيّبات، إحساس بالضغط في الثديين ونزيف في الرحم. لا حاجة لعلاج خاص، لكن يجب عليك التوجه إلى طبيب.

إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، يجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى عرفة الطوارئ في المستشفى، وإحضار علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول القرص:

• إذا كان التأخير بتناول القرص يقل عن 12 ساعة، تناولي القرص بأسرع وقت ممكن واستمري بتناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

• إذا كان التأخير بتناول القرص يزيد عن 12 ساعة، أتركي القرص المنسي في العلبة واستمري في تناول بقية الأقراص كالمعتاد باتجاه السهم، وفي الساعة المحددة لذلك.

من المحتمل ظهور نزف في حال نسيت تناول القرص. هذه حالة طبيعية.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

5 كيف يخزن الدواء؟
تحت/ي التسمم يجب حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي و مجال رؤية الأولاد وأو الأطفال، وهذا تحت/ي التسمم. لا تحت/ي القيب دون تعليمات صريحة من الطبيب.
يُمنع تناول الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) (الظاهر على العبوة/ الشرطية. تاريخ انتهاء الصلاحية يتبّع إلى اليوم الأخير من نفس الشهور.

شروط التخزين

يُمنع التخزين بدرجة حرارة تزيد عن 25°C.

معلومات إضافية

بالإضافة إلى المركبات الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:

أقراص بيضاء

lactose monohydrate, maize starch, povidone 25, talc, magnesium stearate.

طلاء القرص:

sucrose, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, titanium dioxide, povidone 90, glycerol 90, glycol montanate.

أقراص بنية فاتحة

lactose monohydrate, maize starch, povidone 25, talc, magnesium stearate.

طلاء القرص:

sucrose, calcium carbonate, talc, macrogol 6000, titanium dioxide, povidone 85%, ferric oxide red, ferric oxide yellow, glycol montanate.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يوجد في علبة پروجليوتون 10 أقراص بلون بنى فاتح و- 11 قرصاً بلون أبيض. في كل عبوة يوجد 21 قرصاً ممزوجة في شريط.

صاحب التسجيل وعنوانه: باير إسرائيل م.ض. شارع هرحيش 36، هود هشارون 4527702.

اسم المنتج وعنوانه: باير وایم H GmbH وکو KG، وایم، آلمانيا.

تم التحرير في أيار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

032 90 22502 00

DOR-PRO-tabs-0722-10