

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה:

דקוקס וטרינרי

קדם תערובת מגורענת לבעלי-חיים

2. חומר פעיל:

כל ק"ג תכשיר מכיל:

דקוקוינט (Decoquinat) 60 גרם.

רשימת חומרים בלתי פעילים מפורטת בסעיף 13 – "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ופטמים.
- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם.
- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוסיס.

קבוצה תרפויטית: קוקסידיוסטאט מקבוצת קוינולונים.

4. התוויות נגד:

אין להשתמש במקרים של רגישות יתר לחומר הפעיל או לאחד החומרים הלא פעילים.

5. תופעות לוואי:

לא ידועות.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

6. חיות מטרה:

עגלים, טלאים, עזים ופטמים.

7. אופן המתן ומינון:

- לטיפול בקוקסידיוזיס בעגלים, טלאים, עזים ומניעת קוקסידיוזיס בטלאים: יש להתאים ריכוז ה-decoquinate על בסיס יומי לצריכה של 1 מ"ג decoquinate לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו.

- לטיפול בקוקסידיוזיס בפטמים: לתוך כל טונה מספוא, יש להוסיף 0.50 ק"ג דקוקס וטרינרי (לקבלת 30ppm decoquinate). משך המתן יקבע ע"י רופא וטרינר.

- למניעת קוקסידיוזיס בעגלים ולמניעת קוקסידיוזיס בטלאים דרך מתן לכבשה האם: יש להתאים ריכוז ה-decoquinate על בסיס יומי לצריכה של 0.5 מ"ג decoquinate לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – לא פחות מ- 28 יום. בעת הצורך ניתן להמשיך הטיפול מעבר לתקופה זו. במקרים חריפים, ניתן להכפיל את המינון.

- מתן לכבשה למניעת הפלות עוברים ומוות בלידה הנגרם מטוקסופלסמוסיס: לשימוש בכבשה בהריון. יש להתאים ריכוז ה-decoquinate על בסיס יומי לצריכה של 2.0 מ"ג decoquinate לכל ק"ג משקל גוף. משך המתן – טיפול יומי למשך 14 שבועות אחרונים של ההריון.

8. אופן השימוש:

כדי לסייע בהשגת פיזור אחיד במספוא הסופי, מומלץ תחילה לערבב היטב ביחס של חלק 1 תכשיר ל-3 חלקים של מספוא, לפני שמערבבים לתוך התערובת הסופית. בהקשר של הכנת כופתיות מזון, נעשה שימוש בטיפול מקדים בטמפרטורות של עד 80°C לפרקי זמן קצרים, ונמצא כי אין לכך השפעה על התכשיר.

יצרן המורשה לשלב את התכשיר בתכולה הנמוכה מ-2 ק"ג לטונה חייב להיות אחראי לערבוב כאשר הכמות הנכללת היא פחות מ-2 ק"ג לטונה במספוא הסופי.

9. זמן המתנה:

- זמן המתנה לשחיטת בשר עבור בקר, צאן - יום אחד (1) לאחר הטיפול האחרון.
- זמן המתנה לשחיטת בשר פטמים –אפס ימים (0) לאחר הטיפול האחרון.
- חלב: התכשיר אינו מיועד לשימוש בחולבות.

10. אזהרות:

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחית המטרה

בטיפול של טלאים דרך כבשת האם, יש בנוסף לתת טיפול אוראלי ישירות לטלה.

השימוש בתכשיר ישמור על גדילה תקינה בתנאים של זיהום בקוקסידיה, אך הוא אינו משפר גדילה של טלאים או עגלים בריאים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות השימוש בתרופה בבעלי חיים
ייתכן כי תרופות במזון לכבשות לא ימנעו מקרים של קוקסידיוזיס בטלאים ויש לתת אותן רק במקביל לתרופה המיועדת לטלאים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר

בעת הטיפול בתכשיר יש להימנע ממגע ישיר עם העור, להימנע משאיפת אבק ויש לשטוף ידיים לאחר השימוש. אין לאכול, לשתות או לעשן בעת הטיפול בתכשיר. יש לטפל במקום מאוורר היטב בלבד.

אזהרות נוספות

לא מאושר לשימוש בבעלי חיים המייצרים חלב לצריכת אדם.

תכשיר זה מאושר לשימוש אך ורק בחומרי מספוא תרופתיים או בקדם תערובות. בשני המקרים יש לערבב אותו היטב עם חומרי המספוא כדי לוודא שהוא מפוזר באופן אחיד בכל חלקי התערובת. כל קדם תערובת המכילה תכשיר זה חובה לערבב היטב עם חומרי המספוא, כדי לוודא שהתכשיר מפוזר באופן אחיד במספוא הסופי.

הריון והנקה של בעל החיים המטופל

הריון

ניתן להשתמש במהלך הריון.

הנקה

ניתן להשתמש במהלך הנקה.

תגובות עם תרופות אחרות, וסוגים אחרים של אינטראקציות

אין לערבב הטיפול בתכשיר זה יחד עם טיפולים אנטי-קוקסידיאליים נוספים.

מינון יתר

מינון יתר אינו סביר עם תרופה המשולבת במזון. נמצא כי מינונים של דקוקוינט של 4 מ"ג/ק"ג משקל גוף בכבשים וטלאים ו-6 מ"ג/ק"ג משקל גוף בעגלים נסבלים היטב ואינם כרוכים בתופעות לוואי נראות לעין.

11. הוראות אחסון:

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. הרחק מאנשים לא מוסמכים.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון: יש לאחסן במקום קריר ויבש, מתחת ל- 25°C.

- חיי מדף לאחר ערבוב עם מזון- 3 חודשים.
- לשימוש וטרינרי בלבד.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש:

כל שארית של תכשיר וטרינרי או כל פסולת שהתקבלה משימוש בתכשיר וטרינרי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף:

- נוסף על החומר(ים) הפעיל(ים) התרופה מכילה גם:
Colloidal silica, Soya-bean oil, Wheat middlings.

- אריזה: שק המכיל 10 ק"ג
- היצרן: Codbeck Blenders, England
- בעל הרישום: א. בי-זי ייעוץ ושיווק בע"מ, גאליה 76885.

נערך בנובמבר 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 082 95 92333.