نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة (مستحضرات) - 1986

الاستعمال في جيل 6-3 أشهر هو وفق وصفة طبيب فقط

فوق عمر 6 شهور - يُسوّق الدواء بدون وصفة طبيب

أيْبو 2% للأطفال

معلّق

التركيب

يحتوي كل 1 ملل على: إيبيوروفين (Ibuprofen) 20 ملغ

لمعلومات عن المواد غير الفعّالة والمثيرة للحساسيّة، أنظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركّبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافيّة".

اقرأ النشرة بتمعّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك استعمال المستحضر وفقًا للتعليمات في بند المقدار الدوائي في هذه النشرة. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت أعراض المرض أو إذا لم تتحسّن بعد مرور 24 ساعة لدى الرضّع بأعمار 3-6 شهور أو بعد مرور 3 أيام لدى الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق.

هذا الدواء ملائم لمعظم الرضّع ما فوق عمر 3 شهور، للأطفال وللبالغين. الاستعمال للرضع بأعمار 3-6 شهور هو بموجب وصفة طبيب.

يجب التوجه للطبيب إذا كان طفلك يتناول الأسبيرين بمقدار دوائي فوق 75 ملغ في اليوم أو إذا تطوّر لدى طفلك طفح جلدي، صعوبات في التنفس، إسهال أو إرهاق متزايد.

1. لم أعدّ الدواء؟

لخفض السخونة ولتسكين الآلام الخفيفة حتى المتوسطة، للرضع وللأطفال من عمر 3 أشهر وحتى 12 سنة (الذين يبلغ وزنهم 40 كغم تقريبًا).

الفصيلة العلاجية: مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية (NSAIDs).

2. قبل استعمال الدواء

يلائم هذا الدواء معظم الأشخاص لكن على أشخاص معينين الامتناع عن استعماله. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن واثقًا.

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت أنت أو طفلك حساسين (أليرجي) لـ إيبيوروفين أو لكل واحد من المركّبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر البند 6).
- كان لديك أو لدى طفلك ردود فعل تحسسية (مثل ربو، التهاب الأنف (Rhinitis)، انتفاخات تحت جلدية (وذمة وعائية) أو شرى (urticaria)) نتيجة تناول إيبيوروفين، حمض الأسيتيل ساليسيليك (أسبيرين) أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية (NSAIDs).
- كان لديك أو لدى طفلك (أو سبق وكان لديك أو لدى طفلك) قرحة/نزيف في المعدة (حدثان واضحان أو أكثر لتثقّب أو نزيف مثبتين).
- كنت قد عانيت أو إذا كان طفلك قد عانى في السابق من نزيف أو تثقّب في الجهاز الهضمي اللذان يتعلقان بعلاج سابق بأدوية مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية (NSAIDs).
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من قصور حاد في الكبد، في الكلى أو قصور في القلب.
- كنتِ في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ أيْبو 2% للأطفال أعلم الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق **من ارتفاع ضغط الدم، مشاكل قلبية** أو **سكتة دماغية**، لأنّ هنالك ارتفاع طفيف في الخطورة لحدوث مشاكل في القلب عند استعمال إيبيوروفين.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من عامل خطورة **لمشاكل قلبية**، مثل **السكري** أو **نسب كوليسترول مرتفعة**.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من **الربو** أو من أي **مرض تحسّسي في الرئتين**.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من **مشاكل في الكبد، الكلى، القلب أو الأمعاء**.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من الجفاف، لأنه هنالك خطورة لحدوث مشاكل في الكلى.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من **الذِّئبة الحُمَامِيَّة الجهازية (SLE**، مرض متعلق بالمناعة الذاتية) أو من مرض آخر مشابه.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من **مرض التهابي مزمن في الأمعاء** مثل داء كرون أو التهاب تقرحي في الأمعاء الغليظة (التهاب القولون التقرحي).
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من مشكلة وراثية تتعلق في التعامل مع الفركتوز/سكر الفاكهة (عدم تحمّل وراثي للفركتوز)، لأنّ الجسم يستطيع أن ينتج قليلا من الفركتوز من المركب مالتيتول.
- يوصى بتجنب استعمال الدواء خلال الفترة الزمنية التي يتواجد فيها **الحُماق** (Varicella).
- **توجد عدوى لدى المريض** - نظرًا إلى أنّ هذا الدواء ممكن أن يخفي علامات عدوى مثل سخونة وألم. لذلك من المحتمل أن يعيق هذا الدواء العلاج المناسب للعدوى، مما قد يؤدي إلى خطورة متزايدة لحدوث مضاعفات. وشوهد هذا الأمر في حالة الالتهاب الرئوي الناجم عن جراثيم وحالات عدوى جلدية جرثومية المتعلقة بالحُماق (جدري الماء). إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان هذا الدواء خلال وجود عدوى واستمرت أعراض العدوى أو تفاقمت، عليك استشارة طبيب دون تأجيل.

ردود فعل جلدية - تمّ التبليغ عن ردود فعل جلدية حادة تتعلق بالعلاج بهذا الدواء. يجب عليك التوقف عن تناول/إعطاء الدواء والتوجه فورًا للحصول على علاج طبيّ إذا تطور لديك أو لدى طفلك طفح جلدي، آفات في الأنسجة المخاطية، حويصلات أو علامات أخرى من الحساسية، لأنّ هذه ممكن أن تكون العلامة الأولى لرد فعل جلدي خطير جدًا. أنظر البند 4.

تحذيرات إضافية

تتطرق التحذيرات التالية بالأخص للبالغين. على كل حال، قم بأخذها بعين الاعتبار قبل إعطاء أو تناول هذا الدواء:

- للأدوية مثل أيْبو 2% للأطفال، قد تكون هنالك علاقة مع ارتفاع طفيف بخطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكتة دماغية. احتمال حصول أيّة خطورة يرتفع مع تناول مقادير دوائية مرتفعة ومع العلاج المتواصل. لا يجوز تخطي المقدار الدوائي أو فترة العلاج الموصى بهما.
- إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، تعرضت لسكتة دماغية أو كنت تعتقد أنك عرضة لخطر حدوث هذه الحالات (مثلًا إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، من السكري أو من نسب كوليسترول مرتفعة أو إذا كنت مدخنًا)، عليك التحدث مع الطبيب أو الصيدلي فيما يتعلق بالعلاج.

إذا كنت مسنًا استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يجب أن تُخبر الطبيب فورًا إذا:

- **لم تختفِ الأعراض لدى طفلك بشكل سريع أو إذا تفاقمت.**
- **لم تكن واثقًا ما هو مرض طفلك أو إذا كان المرض مصحوبًا بطفح جلدي، صعوبات في التنفس، إسهال أو إرهاق متزايد.**

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان أو إذا تناولتما مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. وبشكل خاص، إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان:

- **أدوية أخرى التي تحتوي على إيبيوروفين أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيروئيدية**، يشمل تلك التي يمكنك الحصول عليها بدون وصفة طبيب
- **أسبيرين بمقدار دوائي منخفض** (حتى 75 ملغ لليوم)
- **مدرّات البول** (تساعد على التبوّل)
- **مضادات التخثر** (أدوية مسيّلة للدم مثل وارفارين)
- **أدوية لعلاج ضغط الدم المرتفع** (مثل كابتوبريل، أتنولول، لوسارتان)
- **ليثيوم** (لاضطرابات المزاج)
- **ميثوتريكسات** (للصدفية، التهاب المفاصل وأنواع من السرطان)
- **زيدوفودين** (للـ HIV، فيروس نقص المناعة البشري)
- **كورتيكوستيرونيدات** (دواء مضاد للالتهاب)
- **جليكوزيدات القلب** (لمشاكل القلب)
- **سيكلوسبورين أو تاكروليموس** (لمنع رفض الأعضاء بعد زرعها)
- **ميفيبريستون** (لإنهاء الحمل)
- **مضادات حيوية من مجموعة الكوينولونات** (لحالات العدوى)
- **أدوية مضادة للاكتئاب من مجموعة SSRI**
- **أدوية مضادة لصفائح الدم** مثل دبيريدامول، كلوبيدوجريل

إذا لم تكن واثقًا أية أصناف من الأدوية يتناول طفلك، أعرض الدواء على الطبيب أو الصيدلي.

استعمال الدواء والطعام:

بإمكان المتعالجين ذوي معدة حساسة استعمال الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

الحمل

- قد يُسبّب هذا المستحضر عارض جانبي محتمل الذي قد يؤدي إلى إصابة في الكلى لدى الجنين ونقص في السائل الأمنيوسي، ابتداءً من الأسبوع 20 للحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من عائلة NSAIDs ابتداءً من الأسبوع 20 للحمل واستشارة شخص من الطاقم الطبيّ عند اللزوم.
- يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحمل.
- لا يجوز استعمال أيْبو 2% للأطفال إذا كنتِ في الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل.

الإرضاع

في بعض الأبحاث، وُجدت تراكيز منخفضة جدًا من إيبيوروفين في حليب الأم، لكن ليس محتملًا أن يكون لهذه الكميات تأثير على الطفل الرضيع.

الخصوبة

ينتمي إيبيوروفين لفصيلة من الأدوية التي قد تسبب ضررًا في الخصوبة لدى النساء. هذا الأمر قابل للانعكاس مع التوقف عن استعمال الدواء. ليس من المحتمل أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين لآخر على احتمالات حصول حمل لديك، مع ذلك، أخبري طبيبك قبل استعمال الدواء إذا كنت تعانين من صعوبات في أن تحملي.

السياقة واستعمال الماكينات:

من غير المتوقع وجود تأثيرات على القدرة على السياقة وتشغيل الماكينات بالمقادير الدوائية وبفترة العلاج الموصى بهما.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:

- **مالتيتول** - يحتوي الدواء على مالتيتول. إذا أخبرك الطبيب بأنك أنت أو طفلك تعانيان من عدم قدرة تحمل لسكريّات معينة، يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. يحتمل أن يكون لـ مالتيتول تأثير بحيث يسبّب إسهالًا خفيفًا.
  قيمة السعرات الحرارية لـ مالتيتول: 2.3 كيلوكالوري/غرام.
- **صوديوم** - يحتوي هذا الدواء على 17.92 ملغ صوديوم (المركّب الأساسي في ملح الطعام) في 5 ملل، ما يعادل 0.9% من الكميّة القصوى اليومية من الصوديوم الموصى باستهلاكها للشخص البالغ.
- **بنزوات الصوديوم** - يحتوي هذا الدواء على 5 ملغ بنزوات الصوديوم في 5 ملل. قد يؤدي إلى اصفرار الجلد والعينين لدى الرُضع (حتى عمر 4 أسابيع).
- **بروبيلين جليكول** - يحتوي هذا الدواء على 0.0035 ملغ بروبيلين جليكول في 5 ملل.
- **كحول بنزيلي** - يحتوي هذا الدواء على 0.0008 ملغ كحول بنزيلي في 5 ملل.
  قد يسبّب الكحول البنزيلي إلى:
  - ردود فعل تحسسيّة
  - خطر ظهور أعراض جانبيّة حادة التي تشمل مشاكل تنفس لدى الأطفال (gasping syndrome)
  - يُمنع استعماله لدى الأطفال الرُضع (حتى عمر 4 أسابيع) إلا بتوصية من طبيب
  - يُمنع استعماله لمدة أكثر من أسبوع لدى الأطفال (دون عمر 3 سنوات)، إلا بتوصية من طبيب بسبب ارتفاع خطورة حدوث تراكم للمادة في أجسامهم
  - يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت حاملا أو مرضعة أو إذا كنت تعانين من أمراض في الكبد أو في الكلى، لأنّ كميات كبيرة من الكحول البنزيلي ممكن أن تتراكم في جسمك وأن تؤدي إلى أعراض جانبيّة (التي تدعى "حُماض استقلابي")

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك الفحص مع الطبيب أو الصيدليّ إذا لم تكن متأكّدًا فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المُتّبعة، عادة، هي:

قائمة المقادير الدوائية بحسب الوزن

وزن (كغم)	مقدار دوائي	عدد المرّات خلال 24 ساعة
	وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	
دون 5 كغم	بموجب وصفة طبيب	
5-5.4	2 ملل	3-4
5.5-8.1	2.5 ملل	3-4
8.2-10.9	3.75 ملل	3-4
11-15	5 ملل	3-4
16-21	7.5 ملل	3-4
22-26	10 ملل	3-4
27-32	12.5 ملل	3-4
33-43	15 ملل	3-4

جدول مقادير دوائية بحسب العمر

العمر (سنوات)	مقدار دوائي	عدد المرّات خلال 24 ساعة
	وفقًا لـ ملل لاستعمال محقنة قياس	
3-6 شهور	بموجب وصفة طبيب	
6-11 شهرًا	2.5 ملل	3-4
12-23 شهرًا	3.75 ملل	3-4
2-3	5 ملل	3-4
4-5	7.5 ملل	3-4
6-8	10 ملل	3-4
9-10	12.5 ملل	3-4
11-12	15 ملل	3-4

يمكن للأطفال بأعمار متماثلة أن يكونوا بأوزان مختلفة بشكل ملحوظ. لذلك يجب الاجتهاد والاستفسار بالنسبة لوزن الطفل وتحديد مقدار دوائي وفقًا لجدول الأوزان. فقط في حال عدم وجود إمكانية للاستفسار بشأن وزن الطفل، يمكن تحديد المقدار الدوائي حسب هذا الجدول.

يُمنع إعطاء الأطفال دون عمر 3 شهور. الأطفال بعمر 3-6 أشهر أو الذين يزنون أقل من 5 كغم، يكون الاستعمال بموجب وصفة طبيب. من عمر 6 أشهر وما فوق يكون الاستعمال دون وصفة طبيب.

يجب أن تعطى الجرعات الدوائية كل 8-6 ساعات، بفوارق زمنية ذات 4 ساعات على الأقل بين الجرعة والجرعة. يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به خلال 24 ساعة.

إذا كان معروفًا لك وزن الطفل - يجب إعطائه المقدار الدوائي كما هو ظاهر في جدول الوزن الذي يشير إلى المقدار الدوائي بحسب الوزن.

فقط في حال لم يكن معروفًا لك وزن الطفل - يتّم تحديد المقدار الدوائي بحسب العمر كما يظهر في جدول الأعمار الذي يشير إلى المقدار الدوائي بحسب عمر الطفل.

تحذير: لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

مدة العلاج

للاستعمال للمدى القصير فقط

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 24 ساعة لدى الرضع بأعمار 3-6 شهور. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة أو إذا تفاقمت، يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 3 أيام لدى الأطفال من عمر 6 شهور فما فوق. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمت، يجب استشارة الطبيب.

يجب تناول أقل جرعة ممكنة لأقصر فترة ممكنة من أجل تخفيف الأعراض.

استشر طبيب دون تأخير إذا كان طفلك يتناول هذا الدواء أثناء وجود عدوى لديه، وأعراض هذه العدوى استمرت أو تفاقمت.

طريقة تناول الدواء:

يجب دائمًا خض القنينة جيدًا قبل الاستعمال.

طريقة الاستعمال:

تحتوي العبوة على محقنة لقياس جرعة دوائية حتى 5 ملل.

يجب عليك استعمال محقنة القياس المُرفقة، لقياس الكمية الصحيحة من الدواء.

لا يجوز استعمال ملعقة صغيرة بيتية من أجل قياس كمية الدواء. الملاعق الصغيرة البيتية تختلف بأحجامها ويحتمل ألا تحصل على كمية الدواء الصحيحة.

1. أدخل المحقنة داخل الفوهة الخاصة الموجودة في عنق القنينة.
2. لتعبئة المحقنة، اقلب القنينة. اسحب المكبس بلطف نحو الأسفل وأنت محافظ على ثبات المحقنة في مكانها، من أجل سحب الدواء حتى الإشارة الملائمة على ظهر المحقنة. أنظر جداول المقادير الدوائية.
3. عند الانتهاء من تعبئة المحقنة، اقلب القنينة مجددًا، وحرّر المحقنة بلطف.
4. أدخل طرف المحقنة إلى الفم (باتجاه الخد) وأفرغ محتواها ببطء وبلطف.
5. بعد الاستعمال، يجب إغلاق القنينة جيدًا، يجب فصل أجزاء المحقنة، وغسلها بالماء الفاتر والصابون وتركها لتجف.

إذا استعملت أو أعطيت لطفلك مقدارًا دوائيًا أكبر

إذا تناولت أو إذا تناول طفلك جرعة أكبر من المطلوب أو إذا قام طفل بابتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى المستشفى الأقرب من أجل الحصول على رأي أخصائي حول الخطورة والاستشارة بشأن التصرف الذي يجب اتخاذه.

قد تشمل الأعراض غثيان، ألم بطن، تقيؤ (قد تظهر كمية قليلة من الدم)، صداع، رنين في الأذنين، ارتباك وحركة عينين نفضيّة.

بمقادير دوائية مرتفعة تم التبليغ عن نعاس، آلام في الصدر، نبضات قلب قوية، فقدان الوعي، تشنجات (خصوصًا لدى الأطفال)، وهن ودوار، دم في البول، شعور بالبرد في الجسم ومشاكل في التنفس.

إذا نسيت استعمال الدواء

إذا نسيت أن تعطي أو تتناول جرعة دوائية، أعطِ أو تناول الجرعة الدوائية التالية بحسب الحاجة، بشرط أن تكون قد مرّت 4 ساعات من موعد تناول الجرعة السابقة. **يُمنع إعطاء أو تناول جرعة دوائية مضاعفة.**

يُمنع تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملصق على عبوّة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال أيْبو 2% للأطفال أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل الا تعاني من أيّ منها. العارض الجانبيّ الأكثر شيوعًا هو تهيّج في المعدة الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل صعوبات في الهضم وحرقة.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب فورًا في حالة:

- دم في البراز.
- براز زفتي أسود.
- تقيؤ دموي أو جزيئات غامقة التي تبدو كحبيبات قهوة.
- صفير غير مفسّر، ربو، ضيق في التنفس، طفح جلدي (الذي قد يكون وخيمًا ومصحوبًا بحويصلات أو تقشر الجلد)، حكة أو كدمات، ردود فعل جلدية وخيمة تشمل متلازمة ستيڤنس جونسون، نظم قلب سريع، احتباس سوائل (كاحلان منتفخان أو انخفاض في كمية البول).
- تصلّب الرقبة، صداع، غثيان، تقيؤ، سخونة وتوهان.
- انتفاخ الوجه، اللسان أو الحلق (قد تكون هذه مؤشرات لردود فعل تحسسية حادة).
- رد فعل جلدي وخيم المعروف بمتلازمة DRESS (متلازمة رد الفعل الدوائي مع كثرة اليوزينيّات وأعراض جهازية). أعراض DRESS تشمل طفح جلدي، سخونة، انتفاخ الغدد الليمفاوية وارتفاع عدد اليوزينيّات (نوع من خلايا الدم البيضاء).
- طفح جلدي أحمر مع حراشف (قشور)، منتشر ومع نتوءات تحت الجلد وحويصلات تظهر في الأساس في طيّات الجلد، في مركز الجسم والأطراف العلوية، ويكون هذا الطفح مصحوبًا بسخونة في بداية العلاج (البثور الطفحية الحادة المعممة (AGEP)، نسبة شيوعها غير معروفة). أنظر البند 2.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب في حالة:

- ألم بطن غير مفسّر، صعوبات في الهضم، حرقة، غثيان أو تقيؤ.
- اصفرار العينين، براز شاحب وبول غامق (قد تكون هذه مؤشرات لمشاكل في الكلى أو الكبد).
- ألم حاد في الحلق المصحوب بسخونة عالية.
- كدمات أو نزيف غير مفسّران، إرهاق، الإصابة بحالات عدوى أكثر من المعتاد مثل تقرّحات في الفم، حالات زكام، ألم في الحلق، سخونة (قد تكون هذه مؤشرات لفقر دم أو اضطرابات دموية أخرى).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية غير شائعة:

- صداع.

أعراض جانبية نادرة:

- إسهال، انتفاخ أو إمساك. أخبر الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من عدة أيام أو إذا كانت مزعجة.

أعراض جانبية نادرة جدًا:

- مشاكل في الكلى أو الكبد قد تحدث عند استعمال إيبيوروفين.
- سكتة دماغية أو مشاكل في القلب قد تحدث عند استعمال إيبيوروفين. الاحتمالية لذلك منخفضة بمستوى المقدار الدوائي الذي يُعطى للأطفال.
- تفاقم التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون -colitis) وداء كرون.
- ضغط دم مرتفع.
- قرحة في المعدة، نزيف في المعدة، التهاب في مخاطية المعدة.

أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة:

- في حالات شاذة، حدثت حالات عدوى حادة في الجلد والأنسجة الرخوة خلال ظهور الحُماق (Varicella).
- أصبح الجلد حساسًا للضوء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مذكور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحّة عن أعراض جانبيّة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبيّة نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحّة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبيّة، أو عبر دخول الرابط: https://sideeffects.health.gov.il

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيّؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحيّة (exp. date) الظاهر على العبوّة والقنينة. تاريخ انتهاء الصلاحيّة ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- **شروط التخزين: يجب التخزين بدرجة حرارة تحت الـ 25 درجة مئوية.**
  بعد فتح القنينة للمرة الأولى، يمكن استعمال الدواء حتى ستة أشهر، لكن ليس ما بعد تاريخ انتهاء تاريخ الصلاحية.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعّالة على:

Liquid maltitol, glycerol (E-422), sodium citrate, citric acid anhydrous, sodium chloride, hypromellose, xanthan gum, sodium benzoate, strawberry flavor, saccharin sodium, purified water.

Strawberry flavoring containing substances identical to natural flavorings, natural flavoring preparations, maize maltodextrin, triethyl citrate (E-1505) 8.4%, propylene glycol (E-1520) 0.1% and benzyl alcohol 0.0236%.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوّة:

المعلق كثيف وذو لون أبيض/أبيض كريم.

يوجد في كل عبوّة قنينة معلق ومحقنة من أجل الدقة في الجرعة الدوائية. الكمية في العبوّة: 100 ملل، 150 ملل، 200 ملل.

قد لا يتّم تسويق جميع أحجام العبوّات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

تيڤع إسرائيل م.ض.، شارع دڤورا هنڤيئا 124، تل أبيب 6944020

اسم المنتج وعنوانه: فارماليدر إس.إي.، ألكوبيندس 28108 مدريد، إسبانيا

تمّ تحرير هذه النشرة في تموز 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 153.81.34080

للتبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.