

ديكاپيتيل 0.1 محلول لحقن تحت الجلد

التركيب:

تحتوي كل م حقنة ديكاپيتيل 0.1 على 0.1 ملغ تريپتوريلىن (على شكل أسيتات).
0.1 mg triptorelin (as acetate)

المواضي غير الفعالة والمثيرة للحساسية: انظر الفصل 2 البند "معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء" والفصل 6 "معلومات إضافية".

اقرني النشرة يتمتعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسلمة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي. وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للأخرين. لأنّه قد يضرّهم حتى لو بدا لك تشابه بين مرضك ومرضهم.

1. لم أعد هذا الدواء؟

الدواء معد لعلاجات الخصوبة.

المجموعة العلاجية: نظير اصطناعي لهرمون يطلق محرّضات تناسلية (GnRH - Gonadotropin releasing hormone)

2. قبل استعمال الدواء

يمكن استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) لトリپتوريلىن أسيتات أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظر الفصل 6).
- كانت لديك حساسية (أرجية) لهرمون يطلق محرّضات تناسلية (GnRH) أو لبدائله.
- كنت حاملاً أو مرضعة (انظر فصل "الحمل والإرضاع").

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء
قبل العلاج بالدواء أخبر الطبيب إذا:

تم الإبلاغ عن الإصابة بالإكتئاب الذي قد يكون خطيراً لدى المتعالجين اللواتي يتناولن ديكاپيتيل. إذا كنت تتناولين الدواء وتتطور لديك مزاج سيء - أخبر الطبيب.

كانت هناك بلاغات عن تغيير في المزاج أثناء العلاج بالدواء. ستابع الطبيب حالتك إذا كان لديك إكتئاب.

في حالات نادرة، قد يسبب العلاج بهذا الدواء نزيفاً في الدماغ (pituitary apoplexia). إذا كنت تشعرين بصداع مفاجئ، حالات تقيؤ أو اضطرابات في الرؤية - توجه إلى الطبيب فوراً.

قد يؤدي العلاج بهذا الدواء إلى هشاشة العظام وارتفاع خطر تعرض العظام للضرر. عليك بإبلاغ الطبيب إذا كانت لديك عوامل خطر إضافية لهشاشة العظام (osteoporosis). تشمل عوامل الخطر:

أفراد العائلة الذين لديهم هشاشة العظام

استهلاك كميات كبيرة من الكحول، خلل في التغذية، التدخين بكثرة.
تناول أدوية إضافية قد تضعف العظام

كنت تُعانيين أو عانيت في الماضي من مرض معتمد حتى شديد في الكبد.
كنت تُعانيين أو عانيت في الماضي من ردود فعل تحسسية (حكة، طفح جلدي، سخونة) (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية").

كنت تحقين الدواء بنفسك فعليك أن تكوني دائمًا على دراية بردود الفعل التحسسية المحتملة (حكة، طفح جلدي، سخونة) (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية").

يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا تطورت بعد حقن الدواء الأعراض التالية:

- ألم في منطقة البطن
- انتفاخ في البطن
- حالات غثيان
- حالات تقيؤ
- حالات إسهال
- ارتفاع الوزن
- صعوبات في التنفس
- انخفاض في التبول

يجب إبلاغ الطبيب فوراً حتى لو تطورت الأعراض بعد بضعة أيام من آخر حقن. قد تكون هذه أعراض فرط إثارة المبيضين، التي قد تتفاقم (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية"). إذا تفاقمت الأعراض، عليك التوقف عن علاجات الخصوبة والحصول على علاج في المستشفى.

قد ترفع علاجات الخصوبة بواسطة الهرمونات مثل هذا الدواء خطر حدوث:

- حمل خارج الرحم، إذا كان لديك ماض من مرض في قناتي فالوب
- الإجهاض

حمل متعدد الأجنة (توائم، ثلاثة توائم وما إلى ذلك)

عاهات خلقية (عاهات في جسم المولود)

الفحوصات والمتابعة

أثناء العلاج بالدواء، يطلب منك الطبيب غالباً إجراء فحوصات الموجات فوق الصوتية (ultra-sound) وأحياناً فحوصات دم وذلك لمعرفة تأثير الدواء.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية

إذا كنت تتناولين، أو تناولت مؤخراً، أدوية أخرى، بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكممات غذائية، أخبري الطبيب أو الصيدلي بذلك.

الحمل والإعراض

يمكن استعمال الدواء إذا كنت حاملاً، تظنين أنك قد تكونين حاملاً، أو إذا كنت مرضعة. على الطبيب أن يستبعد كونك حاملاً قبل بدء العلاج بالدواء. إذا اتضحت لك أنك حامل خلال العلاج بـ ديكاپيتيل، فلا تواصل العلاج. يجب استعمال وسائل منع حمل غير هرمونية (مثل الواقي الذكري أو الحاجز) خلال العلاج بـ ديكاپيتيل.

السيادة واستعمال الماكينات

ديكاپيتيل لا يؤثر أو قد يؤثر بصورة ضئيلة على القدرة على السيادة أو استعمال الماكينات وتشغيل الأجهزة.

معلومات مهمة عن قسم من مركيبات الدواء

يحتوي ديكاپيتيل على أقل من 23 ملغم من الصوديوم في كل مقدار دوائي، لهذا يعتبر "خاليًّا من الصوديوم".

3. كيف تستعملين الدواء؟

يجب استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحصي مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكوني متأكدة فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وبطريقة العلاج بالمستحضر.

يمكن بدء العلاج بحقنة واحدة تحت الجلد في منطقة أسفل البطن، مرة واحدة في اليوم. يمكن بدء العلاج في اليوم الثاني أو الثالث أو في اليوم 21 إلى 23 من الدورة الشهرية (أو 5-7 أيام قبل اليوم المتوقع أن يبدأ فيه الطمث الشهري). بعد 2 إلى 4 أسبوع، سيتم إعطاء هرمونات أخرى لتشجيع نمو الجريبات (نمو كيس البوبيات). غالباً ما يستمر العلاج بـ ديكاپيتيل 0.1 حتى تصل الجريبات إلى الحجم المناسب. يستمر ذلك عادة من 4 إلى 7 أسابيع.

إذا كان هناك عدد كافٍ من الجريبات، سيتم إعطاؤك حقنة واحدة من دواء يحتوي على hCG لتفعيل الإباضة (إطلاق البوبيات).

سيراقب طبيبك تقام العلاج لمدة أسبوعين على الأقل بعد إعطاء حقنة hCG.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط.

يمكن تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

تعليمات الحقن

إذا أخبرك طبيبك أن تتحقى الدواء بنفسك، عليك اتباع التعليمات التي تلقينها من الطبيب. تُعطى الحقنة الأولى دائمًا تحت إشراف الطبيب.

يجب إزالة الغلاف واخراج المحقنة من الصينية. امسكي المحقنة بشكل مستقيم، بحيث يكون الغطاء الواقي الرمادي متوجهاً نحو الأعلى. أزيلي الغطاء الواقي الرمادي. اضغط على المكبس حتى تظهر القطرة الأولى في طرف الإبرة.

أرفعي ثانية من الجلد في منطقة البطن وأمسكيها بين الإبهام والسبابة. بحركة سريعة أدخل الإبرة بزاوية 90 درجة داخل ثانية الجلد. اضغط على المكبس واحقني محظى المحقنة ببطء.

إذا حققت مقدارًا دوائياً مفرطاً عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى إذا حققت مقدارًا دوائياً مفرطاً عن طريق الخطأ أو إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضرري عليه الدواء معك.

إذا نسيت تلقي حقنة في الوقت المطلوب، استشيري الطبيب المعالج.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ تحسن على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

يمكن تناول الأدوية في الظلام! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن المقدار الدوائي في كل مرة

إذا كنت تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسلمة إضافية تتعلق باستعمال الدواء، استشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبب استعمال ديكاپيتيل أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمات. لا تتدھشى عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. فمن المحتمل أن تُعاني من أيٍ منها.

• أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من 1 من بين 10 مستعملات):

صداع، نزف مهبلي / تبقيع، التهاب في موقع الحقن، ألم في البطن، غثيان

• أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 1-10% من بين 100 مستعملات):

انزعاخ في البطن، تعرق مفرط، ردود فعل حساسية (انظر الفصل 2 "قبل استعمال الدواء")، اضطرابات،

فرط إثارة المبيضين (انظر الفصل 4 "الأعراض الجانبية")، آلام أثناء الطمث، ارهاق، أعراض شبيهة بالإإنفلونزا، دوران، حالات تقيؤ، ألم في الظهر، ألم في منطقة الحوض، كيسات في المبيضين (في بداية العلاج)، ألم أو رد فعل في موقع الحقن، جفاف في المهبل، آلام أثناء إقامة علاقات جنسية، ألم في الثديين، أحمرار في موقع الحقن، زيادة الوزن.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٍ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عارض جانبى لم يذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن

أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة، أو عبر

دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>.

5. كيف يُخزن الدواء؟

تجنبي التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأولاد / أو الأطفال، وهكذا تتجنبين التسمم. لا تسببي التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب.

يمكن استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينبع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب تخزين في الثلاجة بدرجة حرارة 2°C-8°C، في العبة الأصلية للحماية من الضوء. يُمنع التجميد.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء أيضًا على:

Sodium chloride, glacial acetic acid and water for injection

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

الدواء هو عبارة عن سائل صافي، عديم اللون. الدواء معيناً في محاذان جاهزة مسبقاً مع إبرة موصولة بها.

المحقنة والإبرة مسدودتان بغطاء واقٍ مطاطي.

تحتوي عبوة المستحضر على 7 محاذان مع محلول لحقن.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

فرينج فارماسيوتيكالس م.ض، شارع هشيطاه 8، بارك هتسبياه، قيسارية 3088900

اسم المنتج وعنوانه: FERRING GmbH, Germany

تم تحرير هذه النشرة في أيلول 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 023 76 24855

DOR-Dec-0.1mg-0922-08