

**سينجولير 4 ملغ**  
**أقراص للمضغ لأطفال الروضة**  
كل قرص للمضغ يحتوي على:  
Montelukast (as sodium) 4 mg  
مونتيلوكاست (كصوديوم) 4 ملغ

**سينجولير 10 ملغ**  
**أقراص**  
كل قرص يحتوي على:  
Montelukast (as sodium) 10 mg  
مونتيلوكاست (كصوديوم) 10 ملغ

**سينجولير 4 ملغ**  
**حُبيبات للصغار**  
كل كيس من الحُبيبات يحتوي على:  
Montelukast (as sodium) 4 mg  
مونتيلوكاست (كصوديوم) 4 ملغ

**سينجولير 5 ملغ**  
**أقراص للمضغ**  
كل قرص للمضغ يحتوي على:  
Montelukast (as sodium) 5 mg  
مونتيلوكاست (كصوديوم) 5 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة، انظر للبند 6.

اقرأ هذه النشرة بامعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن سينجولير. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، اسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- هذا الدواء وصف علاجي. لا تعطه إلى آخرين. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن وضعهم الصحي مماثل لوضعك.

**ما هي أهم المعلومات التي يتوجب علي معرفتها بخصوص سينجولير؟**

- حدثت مشاكل نفسية وخيمة لدى الأشخاص الذين يتناولون سينجولير أو حتى بعد إيقاف العلاج. قد يحدث الأمر لدى أشخاص مع أو بدون تاريخ من المشاكل النفسية. أوقف تناول سينجولير وأخبر طبيبك فوراً إذا كان لديك أو لدى طفلك تغيرات غير طبيعية في السلوك أو في التفكير، يشمل أي واحد من الأعراض التالية:  
عدم الهدوء (تهيج)، يشمل سلوك عدائي أو عدواني، اضطرابات في الانتباه، أحلام سيئة أو ملموسة، اكتئاب، توهان (ارتباك)، شعور بالقلق، عصبية، هلوسات (رؤية أو سماع أشياء غير موجودة)، خلل في الذاكرة، أعراض وسواسية-قهرية، قلة الراحة، السير أثناء النوم، تآتأة، أفكار وأفعال انتحارية (يشمل الانتحار)، رعاش، أرق، حركات عضلات لا إرادية.

**1. ما هو سينجولير ولأي غرض يستعمل؟**

سينجولير مستطاب لمنع وعلاج مزمن للربو، بما في ذلك منع أعراض المرض في النهار والليل، لعلاج مرضى الربو الحساسين للأسييرين ولمنع التضييق القصبي الناتج عن بذل جهد بدني لدى المرضى البالغين والأطفال من جيل 12 شهراً وما فوق.  
سينجولير مُستطاب لتخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي الموسمي لدى البالغين والأطفال ما فوق جيل سنتين.

**الفصيلة العلاجية: سينجولير هو مناهض انتقائي لمستقبلات اللوكوترين.**

يعمل سينجولير بواسطة حصر مستقبلات في المسالك التنفسية لمواد تدعى اللوكوترينات، التي تسبب التضييق القصبي وتورم في المسالك التنفسية. كما وتسبب اللوكوترينات أعراض تحسس.

**ما هو الربو؟**

الربو هو مرض رئة مزمن. لا يمكن شفاؤه – فقط السيطرة عليه.

مميزات الربو تشمل:

- تضييق المسالك التنفسية والذي يُصعب التنفس. هذا التضييق يتفاقم ويتحسن استجابةً لعدة حالات.
- مسالك تنفسية ملتهبة؛ مما يعني، بطانة المسالك التنفسية تتورم.
- مسالك تنفسية حساسة والتي تستجيب لأشياء كثيرة، مثل دخان السجائر، حبوب اللقاح أو الهواء البارد.

أعراض الربو تشمل:

سعال، أزيز وضغط في الصدر. ليس لكل الأشخاص المصابين بالربو يوجد أزيز. لدى البعض، قد يكون السعال هو العرض الوحيد للربو. تحدث الأعراض على الأغلب خلال الليل أو بعد نشاط بدني.

**ما هو الربو الناتج عن نشاط بدني؟**

الربو الناتج عن نشاط بدني، وبدقة أكثر يسمى تضيق القصبات (bronchoconstriction) الناتج عن جهد (EIB) يحصل عندما يحفز النشاط البدني أعراض الربو.

**ما هو التهاب الأنف التحسسي الموسمي؟**

- التهاب الأنف التحسسي الموسمي (ويسمى أيضاً حمى الكلى) يتم تنشيطه من قبل مُستأرجات خارجية مثل حبوب اللقاح التي تُحمل في الهواء والتي مصدرها من الأشجار، العشب والحشائش.
- الأعراض اليومية والليلية لالتهاب الأنف التحسسي الموسمي غالباً ما تشمل:
  - انسداد الأنف، سيلان الأنف، حكة في الأنف

- عطاس
- عيون دامعة, متورمة, حمراء, حاكّة

## 2. قبل تناول سينجولير

### 2.1 لا تتناول سينجولير إذا:

كنت حساسًا (أرجي) لمونتيلوكاست أو لأي واحد من مركبات سينجولير الإضافية (لقائمة المركبات الغير فعالة, انظر للبند 6.1).

### 2.2 تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال سينجولير

#### قبل البدء باستعمال سينجولير أخبر الطبيب:

- إذا كنت حساسًا للأسبيرين.
- إذا كانت لديك في الحاضر أو كانت لديك في الماضي مشاكل نفسية.

#### تحذيرات إضافية:

- إذا تفاقمت أعراض الربو الخاصة بك أو الخاصة بطفلك, عليك الاتصال بطبيبك بشكل فوري.
- المستنصر غير مخصص لعلاج النوبات الحادة من الربو; في هذه الحالات, يجب اتباع التعليمات التي أعطاها لك طبيبك لهذه الحالات. احرص دائمًا بأن تحمل معك أجهزة استنشاق الأدوية التي أمرك الطبيب بأن تستعملها وقت النوبة الحادة.

### 2.3 تداخلات/تفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت في الأونة الأخيرة أدوية أخرى, بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية, يجب عليك إعلام الطبيب أو الصيدلي بذلك.

قد تؤثر أدوية معينة على فعالية سينجولير, أو قد يؤثر سينجولير على طريقة عمل أدويةك الأخرى. إذا كان لديك ربو والأسبيرين يفاقم أعراض الربو الخاص بك, واصل الامتناع عن تناول الأسبيرين أو أدوية أخرى التي تُدعى مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أثناء تناول سينجولير. عليك إعلام طبيبك بالأخص إذا كنت تتناول: مستحضرات مضادة للربو مثل المُوسِّعات القصبيّة والستيرويدات التي تعطى بالاستنشاق أو عن طريق الفم.

### 2.4 تناول سينجولير مع الطعام والشراب

يمكن تناول سينجولير مع أو بدون الطعام.

### 2.5 الحمل والإرضاع

قبل تناول سينجولير, أخبري طبيبك إذا:

- كنت حاملاً أم تخططين للدخول بالحمل. تحدثي مع طبيبك إذا كنت حاملاً أو تخططين للدخول بالحمل, لأنه من الممكن ألا يلائمك سينجولير.
- كنت ترضعين أو تخططين لأن ترضعي. من غير المعروف إذا كان سينجولير ينتقل لحليب الأم الخاص بك. تحدثي مع الطبيب بخصوص الطريقة الأمثل لإطعام رضيعك أثناء تناول سينجولير.

### 2.6 الاستعمال لدى الأطفال

السلامة والنجاعة لدى الأطفال الذين لديهم ربو تحت جيل 12 شهرًا, لم يتم إثباتها.

### 2.7 معلومات هامة فيما يتعلق بجزء من مركبات سينجولير

تحتوي سينجولير 10 ملغ أقراص مغلفة على لاكتورز. إذا قيل لك من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة, قم بالاتصال بطبيبك قبل تناول هذا الدواء (انظر للبند 6).

قبل تناول سينجولير 4 ملغ أقراص للمضغ وسينجولير 5 ملغ أقراص للمضغ, أخبر طبيبك إذا كان لديك بيلة الفينيل كيتون. تحتوي أقراص سينجولير للمضغ على أسبارتام, والذي هو مصدر للفينيل ألانين (انظر للبند 6). هو قد يضر بالأطفال الذين لديهم بيلة الفينيل كيتون. إذا كان لدى طفلك بيلة الفينيل كيتون (اضطراب جيني وراثي نادر في الأيض) عليك الأخذ بعين الاعتبار أن كل قرص للمضغ من سينجولير 4 ملغ وكل قرص للمضغ من سينجولير 5 ملغ يحتوي على فينيل ألانين (يعادل 0.674 ملغ و- 0.842 ملغ فينيل ألانين في كل قرص للمضغ على التوالي).

### 3. كيف تستعمل سينجولير؟

يجب دائمًا تناول سينجولير بالضبط بحسب ما قال لك الطبيب. عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج.

الجرعة وطريقة العلاج تُحددان من قبل الطبيب فقط.

الجرعة الاعتيادية هي:

البالغون والمراهقون ما فوق جيل 15 سنة لعلاج الربو و/أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي: قرص واحد من 10 ملغ مرّة في اليوم.

الأطفال من جيل 6 حتى 14 سنة لعلاج الربو و/أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي: قرص واحد للمضغ من 5 ملغ مرّة في اليوم.

الأطفال من جيل 2 حتى 5 سنوات لعلاج الربو و/أو التهاب الأنف التحسسي الموسمي: قرص واحد للمضغ من 4 ملغ مرّة في اليوم أو كيس واحد من 4

ملغ حبيبات فموية مرّة في اليوم.

الأطفال من جيل 12 شهرًا حتى سنتين لعلاج الربو: كيس واحد من 4 ملغ حبيبات فموية مرّة في اليوم.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

يجب تناول سينچولير مرة في اليوم مع أو بدون طعام، وفقاً لتعليمات الطبيب.  
لعلاج الربو، يجب أخذ سينچولير مرة في اليوم، في المساء.  
لعلاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي، يجب أخذ سينچولير مرة في اليوم وفقاً لتعليمات الطبيب.  
احرص دائماً بأن تكون أدوية الاستنشاق الخاصة بك المخصصة لنوبة الربو الحادة في متناول اليد. لا يجوز أخذ جرعة إضافية من سينچولير خلال أقل من 24 ساعة من الجرعة السابقة.  
سينچولير أقرص للمضغ غير مُخصصة للأطفال دون جيل سنتين.

#### كيفية الاستعمال:

##### سينچولير 10 ملغ أقرص

لا يجوز المضغ! يجب بلع القرص مع القليل من الماء، دون علاقة بالوجبات.

##### سينچولير 4 ملغ و- 5 ملغ أقرص للمضغ

يجب مضغ القرص قبل بلعه، دون علاقة بالوجبات.

##### سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار

لا يجوز فتح الكيس إلى أن يحين وقت استعماله.

يمكن إعطاء سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار:

- مباشرة للفم؛
- مذاب بملعقة واحدة صغيرة (5 ملل) من الحليب الصناعي الخاص بالرضع بارد أو بدرجة حرارة الغرفة أو بحليب الأم؛
- مخلوط مع ملعقة كبيرة من الطعام الرخو البارد أو بدرجة حرارة الغرفة (على سبيل المثال: مهروس التفاح، أرز أو بوظة).
- اخلط كل محتوى سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار لداخل ملعقة كبيرة من الطعام الرخو البارد أو بدرجة حرارة الغرفة، أو ملعقة صغيرة واحدة من الحليب الصناعي الخاص بالرضع بارد أو بدرجة حرارة الغرفة أو حليب الأم، مع الانتباه إلى أن كل الجرعة مخلوطة بالطعام، بالحليب الصناعي الخاص بالرضع، أو بحليب الأم.
- يجب التأكد من أن يحصل الطفل على الملعقة التي تحتوي على سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار المخلوطة بالطعام، بالحليب الصناعي الخاص بالرضع، أو بحليب الأم بكاملها فوراً (خلال 15 دقيقة).
- هام: لا يجوز حفظ سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار المخلوطة بالطعام، بالحليب الصناعي الخاص بالرضع، أو بحليب الأم للاستعمال في وقت لاحق.
- سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار غير مخصصة للإذابة بسائل ما، باستثناء الحليب الصناعي الخاص بالرضع أو حليب الأم. بالرغم من ذلك، يمكن لطفلك أن يشرب السوائل بعد بلعه لسينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار.

#### إذا تناولت سينچولير أكثر مما كان ينبغي عليك

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع طفل من الدواء بالخطأ، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب!

#### إذا نسيت تناول سينچولير

إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، لا يجوز تناول الجرعة المنسية فور تذكرك. يجب الاستمرار بالجدول الزمني الاعتيادي للتناول بحسب ما أمرك الطبيب المُعالج. لا يجوز تناول جرعة مُضاعفة للتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب عليك إكمال العلاج بأكمله حسب ما أوصى به الطبيب.

حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية أو على حالة طفلك الصحية، أو إذا كنت أنت أو طفلك تعاشان نوبة ربو، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء أو تغيير موعد تناوله دون استشارة الطبيب.

يجب تقادي، بقدر المستطاع، التماس مع عوامل التي من شأنها التسبب بنوبة ربو، مثل التدخين، عثة الغبار، العفن، حبوب اللقاح، الحيوانات، تقلبات الطقس، التعرض لهواء بارد.

إذا كان لديك ربو والاسبيرين يفاقم أعراض الربو الخاص بك، واصل الامتناع عن تناول الأسبيرين أو أدوية أخرى التي تُدعى مُضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs) أثناء تناول سينچولير.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أية أسئلة إضافية فيما يتعلق باستعمال الدواء، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية المحتملة

ككل أي دواء، قد يسبب سينچولير أعراضاً جانبية لدى جزء من المستخدمين.

لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية، من الممكن ألا تعاني من أي واحد منها.

قد يسبب سينچولير أعراضاً جانبية وخيمة، بما في ذلك:

- مشاكل نفسية وخيمة (انظر "ما هي أهم المعلومات التي يتوجب علي معرفتها بخصوص سينچولير؟" في بداية هذه النشرة).
- ارتفاع في خلايا دم بيضاء معينة (الخلايا الليمفاوية) ويُحتمل التهاب في الأوعية الدموية في كل الجسم (التهاب وعائي مجموعي). في حالات نادرة، قد يحدث هذا الأمر لدى الأشخاص الذين لديهم ربو ويتناولون سينچولير. يحدث الأمر أحياناً لدى الأشخاص الذين يتناولون أيضاً دواء ستيرويدي عن طريق الفم الذي تم إيقافه أو تقليل جرعته.
- استشر طبيبك فوراً إذا تطور لديك واحد أو أكثر من الأعراض التالية:  
شعور بوخز إبر ودبابيس أو حذر في الذراعين أو الرجلين، مرض شبيه بالإنفلونزا، طفح جلدي، التهاب حاد (آلم وتورم) في الجيوب الأنفية (التهاب الجيوب الأنفية).

## الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا لسينچولير تشمل:

- عدوى في المسالك التنفسية العليا
- حمى
- ألم رأس
- ألم حلق
- سعال
- ألم في البطن
- إسهال
- آلام أو عدوى في الأذنين
- إنفلونزا
- رشح
- عدوى في الجيوب الأنفية

## بالإضافة، تم التبليغ أيضًا عن الأعراض الجانبية التالية:

- ردود فعل تحسسية [بما في ذلك تورم الوجه، الشفتين، اللسان و/أو الحلق (التي قد تسبب صعوبة في التنفس أو في البلع)، شرى، طفح جلدي، وحكة].
- دوخة، ميل للنوم، نعاس، اختلاجات.
- تغيرات في الرؤية، تورم أو احمرار داخل العين أو من حولها.
- خفقان القلب (نظم قلب غير منتظم)
- نزيف من الأنف؛ احتقان في الأنف، تورم (التهاب) الرئتين
- حرقة، إسهال، ألم بطن، صعوبات هضم، غثيان، تقيؤ، آلام أسنان
- أعراض لمشاكل في الكبد تشمل غثيان، تقيؤ، تعب، يرقان (اصفرار الجلد والعينين)، بول داكن، أعراض شبيهة بالإنفلونزا، فقدان الشهية، وألم في البطن.
- تم التبليغ عن ردود فعل جلدية وخيمة (متلازمة ستيفينس-جونسون/تَقَشُّرُ الأَنْسِجَةِ الْمُتَمَوِّتَةِ البَشْرِيَّةِ التَّسْمُومِيَّةِ/حُمَامَى عَدِيدَةِ الأشْكَالِ)، الأعراض تشمل حويصلات، طفح جلدي، جلد متقشر وحاك؛ كتل حمراء رخوة تحت الجلد، غالبًا على الساقين (حُمَامَى عَقْدَةٍ)، كدمات.
- اضطرابات في العضلات والهيكلي العظمي والنسيج الضام: آلام مفاصل، آلام عضلات وتشنجات عضلية
- ضعف/تعب، انتفاخ.
- قابلية متزايدة للنزيف، تعداد منخفض للصفائح الدموية، ارتفاع في إنزيمات الكبد، عدد مرتفع من كريات الدم البيضاء في البول (بييلة قَيْحِيَّة).
- تبوُّل لا إرادي ليلي تم التبليغ عنه لدى الأطفال.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا لاحظت أي عرض جانبي لم يُذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه إلى النموذج الإلكتروني للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il/>

## 5. كيفية تخزين سينچولير؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال و/أو الرضع ومجال رؤيتهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب!  
لا يجوز استعمال سينچولير بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من الشهر المذكور.

## شروط التخزين:

سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار: يجب تخزينه بالعبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية. يجب استعماله خلال 15 دقيقة من بعد فتحه.

سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ: يجب تخزينه بالعبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة، يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ: يجب تخزينه بالعبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. يجب التخزين تحت 30 درجة مئوية.

سينچولير 10 ملغ أقراص: يجب تخزينه في العبوة الأصلية لحمايته من الضوء والرطوبة. يجب التخزين تحت 30 درجة مئوية.

## 6. معلومات إضافية

### 6.1 على ماذا يحتوي سينچولير؟

المادة الفعالة هي مونتيلاكاست (كسوديوم).

المركبات الأخرى هي:

كل قرص مغلف من 10 ملغ يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, croscarmellose sodium, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

الغلاف مركب من:

Hydroxypropyl methylcellulose, hydroxypropyl cellulose, titanium dioxide, yellow ferric oxide, carnauba wax and red ferric oxide.

كل قرص للمضغ من 4 ملغ و- 5 ملغ يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Mannitol, microcrystalline cellulose, hydroxypropyl cellulose, croscarmellose sodium, artificial cherry flavor, magnesium stearate, aspartame, and red ferric oxide.

كل كيس من 4 ملغ حبيبات فموية يحتوي على المواد غير الفعالة التالية:

Mannitol, hydroxypropyl cellulose, and magnesium stearate.

انتبه إلى أن الأقراص المغلفة من 10 ملغ تحتوي على لاكتوز. كل قرص من سينچولير 10 ملغ يحتوي على 89.3 ملغ لاكتوز أحادي الإماهة. انتبه إلى أن الأقراص للمضغ من 4 ملغ و- 5 ملغ تحتوي على أسبارتام، والذي يشكل مصدرًا للفينيل ألانين. كل قرص للمضغ من 4 ملغ يحتوي على 0.674 ملغ فينيل ألانين، وكل قرص للمضغ من 5 ملغ يحتوي على 0.842 ملغ فينيل ألانين.

## 6.2 كيف يبدو سينچولير ومحتوى العبوة

سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار هي حبيبات صلبة متجانسة التي تنزلق بسلاسة، بيضاء، خشنة، بدون وجود جزيئات خارجية. سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ لأطفال الروضة هي أقراص زهرية، بيضاوية، محدبة من الجهتين، مع سينچولير مطبوع على وجه واحد و- MSD 711 في جانبها الثاني.

سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ هي أقراص زهرية، مستديرة، محدبة من الجهتين مع سينچولير مطبوع على وجه واحد و- MSD 275 في جانبها الثاني.

سينچولير 10 ملغ أقراص هي أقراص مغلفة بلون البيج، على شكل مربع مستدير، مع سينچولير مطبوع على وجه واحد و- MSD 117 في جانبها الثاني.

حجم العبوات:

سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار: 7, 10, 28, 30 كيس في العبوة.  
سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ لأطفال الروضة: 7, 10, 28, 30 قرص للمضغ في العبوة.  
سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ: 7, 10, 28, 30 قرص للمضغ في العبوة.  
سينچولير 10 ملغ أقراص: 7, 10, 28, 30 قرص في العبوة.  
قد لا تكون جميع أحجام العبوات مُسوّقة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

أورچانون فارما إسرائيل م.ض., عتير يداع 1, كفار سابا

المُنتج: أورچانون LLC, نيو جيرسي, الولايات المتحدة

تم التتقيح في آب 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

130.14.30912 سينچولير 4 ملغ حبيبات للصغار:

121.67.30155 سينچولير 4 ملغ أقراص للمضغ لأطفال الروضة:

109.90.29316 سينچولير 5 ملغ أقراص للمضغ:

109.91.29317 سينچولير 10 ملغ أقراص:

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.