

على الطفل أن يقضي حاجته قبل إدخال التحميلة في فتحة الشرج (rectum). كيفية إدخال التحميلة:
• أولاً، اغسل يديك جيداً وجفها. إنزع غلاف التحميلة ورطبه بقليل من الماء.
• يجب الانتباه على الجانب، يجب إدخال التحميلة إلى أعقب قدر ممكن داخل الشرج بمساعدة الأصبع. إذا كانت التحميلة رخوة أكثر مما يتبع إدخالها، يرددها في التلاجة لمدة 30 دقيقة أو وضعها تحت تيار ماء بارد قبل إخراجها من الغلاف.
• اغسل يديك بعد إدخال التحميلة.

إذا استعملت أو اصطبت لطفلك جرعة مفرطة أو إذا تناول طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه دائماً إلى الطبيب أو إلى المستشفى الأقرب لتلقي استشارة بخصوص الاختطار والتشاور بخصوص الفعل الذي يجب تتخذه. الأعراض قد تشمل غثوان، نزيف من الجهاز الهضمي، ألم بطن، تقبؤ (قد تكون هناك كمية صغيرة من الدم)، ألم رأس، طنين في الأذنين، ارتباك وعدمس، آلام في الصدر، ضربة قلب سريعة، ضعف ونوار، دم في البول، شعور بالبرد في الجسم ومشاكل تنفس.

إذا نسيت استعمال أو إعطاء الدواء إذا نسيت الاستعمال أو الإعطاء، استعمل أو اعط الجرعة التالية حسب الحاجة بشرط أنه مرّت على الأقل 6 ساعات من وقت استعمال/ إعطاء الجرعة السابقة.
لا يجوز استعمال/ إعطاء جرعة مضاعفة.

لا يجوز تناول أيوية في النظام! تحقق من المصلى والجرعة للدوائية في كل مرة لتتوافق فيها نواء. ضع التنظرات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
إذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

ككل أي نواء، قد يسبب استعمال نوروفين للأطفال تحاميل أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرح من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي واحدة منها.

العرض الجانبي الأكثر انتشاراً هو تهيح المعدة الذي قد يسبب مشاكل مثل صعوبات هضم وحرقة.

يجب إيقاف استعمال هذا الدواء وإخبار الطبيب فوراً في حال:

- دم في البراز
- براز زرقاني أسود
- تقبؤ دم أو جزينات داكنة تبدو مثل حبات القهوة
- آزيز غير مبرر، ضيق تنفس، طفح جلدي (الذي قد يكون وخيماً ومصحوباً بحمى وصدات أو تقشر الجلد)، ردود فعل جلدية وخيمة مثل متلازمة ستيفن-جونسون، حكة أو كدمات، نظم قلب سريع، احتباس سوائل (انتفاخ

الكاملين أو انخفاض في كمية البول)

- انتفاخ الوجه، اللسان أو الحلق
- تصلب الرقبة، ألم رأس، غثيان، تقبؤ، سخونة وتوهان
- يجب إيقاف استعمال هذا الدواء وإخبار الطبيب في حال:
- ألم بطن غير مفسر، صعوبات هضم، حرقة غثوان أو تقبؤ
- اصفرار العينين، براز فاتح ويول داكن، مشاكل كبد
- ألم حلق وخيم مصحوب بسخونة عالية
- نزيف غير مفسر أو نزيف في الجمجمة، كدمات أو تعب، الإصابة بثلوثات أكثر من المعتاد مثل الزكام

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 1,000):
• ألم رأس

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 مستخدمين من بين 10,000):
• إسهال، انتفاخ أو إمساك. أخبر الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من بضعة أيام أو أنها مزعجة.

أعراض جانبية نادرة جداً (تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

- مشاكل كلية أو فشل كلوي قد تحدث عند الاستعمال مع إيبوبروفين
- سكتة دماغية أو مشاكل قلب قد تحدث عند الاستعمال مع إيبوبروفين. هذه الحالات غير مرجحة على مستوى الجرعة المعتادة للأطفال
- تقام الانتباه في القولون (colitis) ومرض كرون
- ضغط دم مرتفع
- ثلوثات جلدية وخيمة وتقييدات في الأسجة الرخوة خلال الضماق (Varicella)

أعراض جانبية شائعة غير معروف (أعراض التي لم يتم تحديدها شيوها بعد):

- رد فعل جلدي وخيم المعروف بمتلازمة DRESS (متلازمة رد الفعل الدوائي مع كثرة اللوزينيات وأعراض جهازية). أعراض (DRESS) تشمل: طفح جلدي، سخونة، انتفاخ الغدد اللمفاوية وارتفاع في عدد الخلايا الحمضية (أبوع من خلايا دم بيضاء).
- طفح جلدي أحمر مع حراشيف، مُتَدَد ومع نتوءات تحت الجلد وبنثرات الممرزة بشكل رئيسي في طيات الجلد. مركز الجسم والأطراف الطوية المصحوب بسخونة في بداية العلاج (تُتَرَك طفحها حاداً مُتَمَم (AGEP).
- توقف عن استعمال نوروفين للأطفال تحاميل إذا كنت تطور هذه الأعراض وتوجه فوراً لتلقي علاج طبي. أنظر أيضاً بند 2.
- الجلد أصبح حساساً للشمس

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني أنت أو المعالج من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.au) الذي يوجه لنموذج الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية. أو عن طريق الدخول للرابط: <http://sideeffects.health.gov.au>

5. كيفية تخزين الدواء

- تجنب التسمم، يجب حفظ هذا الدواء وكل نواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال، والوضع ونظفهم وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقبؤ دون أمر صريح من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين: خزّن دون 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:

- نوروفين للأطفال تحاميل 60 ملغ: Hard fat 1 (Witespol H15), Hard Fat 2 (Witespol W45)
- نوروفين للأطفال تحاميل 125 ملغ: Hard Fat
- كيف يبدو الدواء وما محتوى العبوة:

نوروفين للأطفال تحاميل 60 ملغ: تحميلة ناعمة بشكل توربيدو ويلون أبيض
نوروفين للأطفال تحاميل 125 ملغ: تحميلة ناعمة بشكل توربيدو ويلون أبيض، أبيض مُصَفَر

تحوي كل عبوة على 10 تحاميل بلون أبيض مغلفة بخلاف ألومنيوم/بولي إيثيلين.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

ريكيت بيكزور (بير إيسنت) مض، شارع هنغار 6، هود هشارون 4527704

اسم المنتج وعنوانه:

ريكيت بيكزور هيلث كير اينترنشنال مض، هال، إنجلترا.
تم تنقيحها في كانون الثاني 2022 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.
رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
نوروفين للأطفال تحاميل 60 ملغ: 142-88-31900-00
نوروفين للأطفال تحاميل 125 ملغ: 142-89-32016-01
للتبسيط وتسهيل الترامة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المنكر. بالرغم من ذلك، الدواء مخصص لكلا الجنسين.