

نشرة للمستهلكة وفق أنظمة الصيدالوية (مستحضرات) - 1986
يُسوق الدواء دون وصفة طبية

فأچيفم 10 مكغ
أقراص مطليّة للاستعمال المهبلّي

المادة الفعّالة:

إستراڊيول 10 مكغ (كهيميهدرات)
estradiol 10 mcg (as hemihydrate)

المواد غير الفعّالة ومُسببات الحساسية في المستحضر: انظري البند 6 "معلومات إضافية".

أقرني النشرة بتمعن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستخدام الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجّهي إلى الطبيب أو الصيدلي.
عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة من هذه النشرة. استشري الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى معلومات إضافية. عليك مراجعة الطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو لم تتحسن بعد أسبوعين حتى 4 أسابيع، أو إذا ظهرت أعراض أخرى.

1. لم أعد هذا الدواء؟

فأچيفم 10 مكغ معدّ لعلاج الضمور المهبلّي الناتج عن نقص الإستروجين لدى النساء بعد انقطاع الطمث. هناك خبرة محدودة حول العلاج لدى نساء تجاوزن عمر 65 سنة.

المجموعة العلاجية: إستروجينات طبيعية و شبه اصطناعية، بسيطة.

يحتوي فأچيفم 10 مكغ على إستراڊيول وهو هرمون جنسي أنثوي ينتمي إلى مجموعة هرمونات تسمى الإستروجينات. الإستراڊيول في فأچيفم 10 مكغ مماثل للإستراڊيول الذي ينتجانه المبيضان لدى المرأة. ينتمي فأچيفم 10 مكغ إلى مجموعة أدوية تسمى العلاج الهرموني البديل (HRT) للاستعمال المهبلّي. يُستعمل فأچيفم 10 مكغ للتخفيف على أعراض سن انقطاع الطمث في المهبل مثل الجفاف والتهيج، هذه الحالة تسمى "الضمور المهبلّي"، وهي تنتج جراء انخفاض مستويات الإستروجين في الجسم. تحدث هذه الحالة بشكل طبيعي بعد انقطاع الطمث.

يعمل فأچيفم 10 مكغ عن طريق استبدال الإستروجين المُنتج عادة في مبيض المرأة. يتم إدخاله إلى المهبل، بحيث يتحرر الهرمون في المنطقة التي تحتاجه. من شأن هذا الأمر أن يخفف من شعور الإنزعاج في المهبل.

2. قبل استعمال الدواء

يُمنع استعمال الدواء إذا:

- كانت لديك حساسية (أرجية) للإستراڊيول، أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتويها الدواء (انظري البند 6 "معلومات إضافية").
- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي سرطان الثدي أو إذا كان هناك شك لوجود سرطان الثدي لديك.
- يوجد لديك أو كان لديك في الماضي سرطان حساس للإستروجينات، مثل سرطان بطانة الرحم (endometrium) أو إذا كان هناك شك لوجود سرطان من هذا النوع لديك.
- كان لديك نزيف مهبلّي مجهول السبب.
- لديك فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia) غير المعالج.
- كنت تعانين أو عانيت في الماضي من خثرة دموية في الوريد (thrombosis)، مثلًا: في الساقين

(deep venous thrombosis) أو في الرئتين (pulmonary embolism).
 • كان لديك اضطراب في تخثر الدم (مثل نقص بروتين C، بروتين S أو مضاد الثرومبين).
 • يوجد لديك الآن أو كان لديك مؤخرًا مرض ناتج عن خثرات دموية في الشرايين، مثل نوبة قلبية، سكتة دماغية أو ذبحة صدرية (angina).
 • يوجد لديك أو كان لديك في الماضي مرض في الكبد، ولم تعد نتائج فحوصات أداء الكبد لديك إلى مستواها السليم.
 • كانت لديك مشكلة دم نادرة تسمى "برفيرية" التي تنتقل وراثيًا.
 إذا ظهرت أية حالة من الحالات التي ذكرت أعلاه للمرة الأولى أثناء استعمال فاجيفم 10 مكغ، توقفي فورًا عن استعمال الدواء واستشيري الطبيب حالًا.

التاريخ الطبيّ والفحوصات الطبيّة الروتينية

ينطوي استعمال علاج هرموني بديل (HRT) على مخاطر يجب أخذها بالحسبان عند اتخاذ قرار للبدء بهذا العلاج أو متابعتها.
 إن التجربة المكتسبة في علاج النساء اللواتي انقطعت الدورة الشهرية لديهن ميكرًا (نتيجة فشل المبيضين أو عملية جراحية) محدودة. إذا انقطعت الدورة الشهرية لديك ميكرًا، قد تختلف المخاطر الكامنة في استعمال علاج هرموني بديل. يرجى أن تستشيري الطبيب.
 قبل أن تبدئي باستعمال (أو عندما تستأنفين استعمال) علاج هرموني بديل (HRT)، سوف يسألك الطبيب عن تاريخك الطبي وتاريخ عائلتك. قد يقرر الطبيب إجراء فحص جسماني، الذي قد يشمل على فحص الثديين و/أو فحص داخلي عند الحاجة.
 بعد أن تبدئي العلاج بفاجيفم 10 مكغ، عليك إجراء فحص لدى الطبيب مرة في السنة على الأقل. في هذه الفحوصات، تحدثي مع الطبيب عن الفوائد والمخاطر في مواصلة العلاج بالدواء.
 عليك إجراء فحص مسح الثدي الروتيني وفق توصيات الطبيب.

تحذيرات خاصة متعلقة باستعمال الدواء

قبل العلاج بفاجيفم 10 مكغ، أخبري الطبيب إذا كنت تعانين أو عانيت في الماضي من إحدى المشاكل التالية، لأنها قد تعود ثانية أو تتفاقم خلال العلاج بالدواء. في مثل هذه الحالة، عليك زيارة الطبيب لإجراء فحوصات في فترات متقاربة أكثر:

- ربو
- الصرع
- السكري
- حصى في كيس المرارة
- ضغط دم مرتفع
- حالات شقيقة أو صداع شديدة
- اضطراب في الكبد مثل ورم حميد في الكبد
- نمو بطانة الرحم لديك خارج الرحم (endometriosis) أو إذا كان لديك تاريخ طبي من فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia)
- مرض يؤثر في طبلة الأذن والسمع (otosclerosis)
- مرض في جهاز المناعة يؤثر على أعضاء كثيرة في الجسم (ذئبة حمامية جهازية، SLE)
- خطر متزايد للإصابة بالسرطان الحساس للإستروجين (مثلًا في حال كان لوالدتك، أختك، أو جدتك سرطان الثدي)
- خطر متزايد لتطويع خثرات دموية (انظري البند "خثرات دموية في الوريد [thrombosis]")
- وجود أورام ليفية (fibroids) في الرحم
- كان مستوى الدهون في الدم مرتفعًا جدًا (التريجليسيريدهات)
- احتباس السوائل نتيجة مشاكل في القلب أو الكلى
- وذمة وعائية وراثية ومكتسبة (انظري البند 4 "الأعراض الجانبية")

نلفت انتباهك، فأجيفم 10 مكغ ليس وسيلة لمنع الحمل. إذا مضى أقل من 12 شهرًا منذ الطمث الأخير أو إذا كان عمرك أقل من 50 سنة، ربما عليك استعمال وسائل منع حمل إضافية لمنع الحمل. توجهي إلى الطبيب للحصول على استشارة.

العلاج الهرموني البديل والسرطان

فرط تنسج بطانة الرحم (endometrial hyperplasia) وسرطان بطانة الرحم (endometrial cancer)

إن تناول أقراص العلاج الهرموني البديل التي تحتوي على إستروجين فقط، لفترة زمنية طويلة، يمكن أن يزيد من خطر تطوير سرطان بطانة الرحم (endometrium).
ليس معروفًا بالتاكيد فيما إذا كان هناك خطر شبيهه عند معاودة العلاج أو في العلاج المطول (أكثر من سنة) بـ فأجيفم 10 مكغ. مع ذلك، أظهر فأجيفم 10 مكغ قدرة امتصاص منخفضة جدًا في الدم، لهذا فإن إضافة بروجستوجين غير ضرورية.
إذا كنت تعانين من **نزيف مهبلي مفاجئ** أو من **بقع دموية**، على الأغلب لا داعي للقلق، ولكن عليك تحديد موعد لدى الطبيب. يمكن لهذا الأمر أن يشكل علامة على سماكة بطانة الرحم.

تتطرق المخاطر التالية إلى الأدوية التي تحتوي على علاجات هرمونية بديلة تصل إلى الدورة الدموية. مع ذلك، فأجيفم 10 مكغ معدّ لعلاج موضعي في المهبل، وامتصاصه في الدم منخفض جدًا. إن احتمالية تفاقم الحالات المذكورة أدناه أو عودتها مجددًا خلال العلاج بفأجيفم 10 مكغ قليلة، ولكن عليك التوجه إلى الطبيب إذا كنت قلقة.

سرطان الثدي

هناك شهادات تدل على أن استعمال فأجيفم 10 مكغ لا يزيد خطر حدوث سرطان الثدي لدى نساء لم يُصنَّ بسرطان الثدي في الماضي. ليس معروفًا فيما إذا كان يمكن استعمال فأجيفم 10 مكغ بأمان لدى النساء اللواتي أصبن بسرطان الثدي في الماضي.

افحصي الثديين بشكل روتيني. توجهي إلى الطبيب إذا لاحظت أية تغييرات مثل:

- تشكل حفر في الجلد
 - تغييرات في الحلمة
 - كُتل يمكن رؤيتها أو تحسسها.
- بالإضافة إلى ذلك، يوصى بإجراء فحص تصوير الثدي الشعاعي في حال يتم اقتراحه عليك.

سرطان المبيض

سرطان المبيض نادر، وهو نادر أكثر بكثير من سرطان الثدي. إن استعمال علاج هرموني بديل من الإستروجين فقط مصحوب بارتفاع طفيف في خطر حدوث سرطان المبيض.

مقارنة:

يتغير خطر الإصابة بسرطان المبيض مع التقدم في العمر. مثلًا: لدى النساء اللواتي أعمارهن 50 حتى 54 سنة، ولا يتعالجن بعلاج هرموني بديل، سيتم تشخيص سرطان المبيض لدى حوالي امرأتين من بين 2,000 خلال فترة زمنية ذات 5 سنوات. لدى النساء اللواتي يتعالجن علاجًا هرمونيًا بديلًا لمدة 5 سنوات، ستكون هنالك حوالي 3 حالات لكل 2,000 مستعملة (أي حالة واحدة إضافية تقريبًا).

تأثيرات العلاج الهرموني البديل على القلب والدورة الدموية

خثرات دموية في الوريد (thrombosis)

إن خطر حدوث خثرات دموية في الأوردة أعلى بـ 1.3 حتى 3 أضعاف لدى المتعالمات بعلاج هرموني بديل مقارنة بالنساء غير المتعالمات، خاصة خلال السنة الأولى من العلاج. قد تكون الخثرات الدموية خطيرة، وإذا انتقلت هذه الخثرة الدموية إلى الرئتين فقد تسبب ألماً في الصدر، ضيقاً في التنفس، إغماء وحتى الوفاة.

- إن خطر تشكّل خثرة دموية في الأوردة يزيد مع التقدم في العمر، وكذلك في حال كانت إحدى الحالات التالية تنطبق عليك. عليك إبلاغ الطبيب إذا كانت إحدى الحالات التالية تنطبق عليك:
- كنتِ غير قادرة على المشي لفترة طويلة نتيجة عملية جراحية كبيرة، إصابة أو مرض (انظري أيضاً البند 3 "إذا كنتِ على وشك اجتياز عملية جراحية")
 - كنتِ تعانيين من الوزن الزائد بشكل كبير ($BMI > 30kg/m^2$)
 - كانت لديك أية مشكلة في تخثر الدم تتطلب علاجاً طويل الأمد بدواء يُستعمل لمنع الخثرات الدموية
 - عانى أحد أفراد عائلتك ذات مرة من خثرة دموية في الساق، الرئة أو في عضو آخر في الجسم
 - كنتِ تعانيين من مرض الذئبة الحمامية الجهازية (SLE)
 - كان لديك سرطان.
- لمعرفة علامات الخثرة الدموية، انظري البند 4 "توقفي عن استعمال فاجيفم 10 مكغ وتوجهي فوراً إلى الطبيب".

مقارنة:

لدى نساء في سنوات الـ 50 من العمر، اللواتي لا يتعالمن بعلاج هرموني بديل، خلال 5 سنوات، فإن 4 حتى 7 نساء من بين 1,000 بالمعدل، من المتوقع أن يعانين من خثرة دموية في الوريد. لدى نساء في سنوات الـ 50 من العمر، اللواتي يتعالمن بعلاج هرموني بديل يحتوي على إستروجين فقط لأكثر من 5 سنوات، ستكون هنالك 5 حتى 8 حالات لكل 1000 متعالمجة (أي حالة إضافية واحدة).

مرض قلب (نوبة قلبية)

لا يطرأ ارتفاع على خطر تطوير مرض قلب لدى نساء يتناولن علاجاً يحتوي على إستروجين فقط.

سكتة دماغية

إن خطر الإصابة بسكتة دماغية أعلى بحوالي 1.5 ضعفاً لدى المتعالمات بعلاج هرموني بديل مقارنة بالنساء غير المتعالمات. يزداد عدد حالات السكتة الدماغية الإضافية جراء استعمال علاج هرموني بديل مع التقدم في العمر.

مقارنة:

لدى نساء في سنوات الـ 50 من العمر، اللواتي لا يتعالمن بعلاج هرموني بديل، فإن 8 من بين 1,000 بالمعدل، من المتوقع أن يجتزرن سكتة دماغية خلال 5 سنوات. لدى نساء في سنوات الـ 50 من العمر المتعالمات بعلاج هرموني بديل، ستكون هنالك 11 حالة لكل 1,000 متعالمجة، خلال 5 سنوات (أي 3 حالات إضافية).

حالات إضافية

لا يمنع العلاج الهرموني البديل فقدان الذاكرة. هناك أدلة تشير إلى وجود خطر أعلى لحدوث فقدان الذاكرة لدى نساء بدأن علاجاً هرمونياً بديلاً بعد عمر 65 سنة. توجهي إلى الطبيب للحصول على استشارة.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناولين، أو تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما فيها أدوية دون وصفة طبية ومكملات غذائية، أخبري الطبيب أو الصيدلي بذلك.
من غير المرجح أن يؤثر فاجيفم 10 مكغ المستعمل للعلاج الموضعي في المهبل، على أدوية أخرى. قد يؤثر فاجيفم 10 مكغ على العلاجات الأخرى التي تعطى عبر المهبل.

الحمل والإرضاع

فاجيفم 10 مكغ معدّ للنساء بعد سن انقطاع الطمث فقط. إذا أصبحتِ حاملًا، عليك التوقف عن العلاج بفاجيفم 10 مكغ والتوجه إلى الطبيب.

السياقة واستعمال الماكينات

لا يُعرف وجود تأثير.

3. كيف تستعملين الدواء؟

احرصي على استعمال هذا الدواء بالضبط كما هو موصوف في هذه النشرة أو وفق تعليمات الطبيب أو الصيدلي. عليك أن تفحصي مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنتِ غير متأكّدة فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي الموصى به عادة هو:

- عليك استعمال قرص واحد في المهبل في كل يوم خلال الأسبوعين الأولين.
- بعد ذلك، استعملي قرصًا واحدًا في المهبل مرتين في الأسبوع. حافظي على فاصل زمني قدره 3 أو 4 أيام بين قرص واحد والآخر.
- يُمنع تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

مدة العلاج

إذا لم تتحسن حالتك أو إذا طرأ تفاقم بعد 2-4 أسابيع، أو إذا حدثت أعراض أخرى، عليك مراجعة الطبيب.

معلومات عامة عن علاج أعراض سن انقطاع الطمث

عند استعمال أدوية لعلاج أعراض سن انقطاع الطمث، يوصى باستعمال أخفض مقدار دوائي ناجع، واستعمال الدواء لأقصر فترة زمنية مطلوبة.

طريقة تناول

- يمكن أن تبدئي استعمال فاجيفم 10 مكغ في أكثر يوم مريحًا لك.
- للاستعمال المهبل فقط
- أدخلي القرص في المهبل بمساعدة الموصل (مطابق).
- هذا الدواء غير معدّ للابتلاع!

في "التعليمات للمستعملة"، في نهاية النشرة، يرد شرح حول كيفية استعمال فاجيفم 10 مكغ. اقرئي التعليمات بعناية قبل استعمال فاجيفم 10 مكغ.

إذا تناولتِ عن طريق الخطأ، مقدارًا دوائيًا أعلى

إذا استعملتِ من فاجيفم 10 مكغ أكثر من المطلوب توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي.
فاجيفم 10 مكغ معدّ للعلاج الموضعي في المهبل. المقدار الدوائي لإستراديول في فاجيفم 10 مكغ منخفض

لدرجة أن هناك حاجة إلى استعمال عدد كبير من الأقراص حتى يقترب من الجرعة الدوائية العادية المستعملة في العلاج الفموي.

إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ توجّه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى، وأحضري عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول مقدار دوائي، استعلمي مقداراً دوائياً فور تذكرك. يُمنع استعمال مقداراً دوائياً مضاعفاً لتعويض المقدار الدوائي المنسي.

إذا توقفت عن تناول الدواء

راجعي الطبيب، بشأن أي سؤال عن مدة العلاج أو للتحدث عن العلاجات البديلة.

إذا كان يتعين عليك اجتياز عملية جراحية

إذا كنت مقدمة على اجتياز عملية جراحية، أخبري الطبيب الجراح بأنك تستعملين فاچيفم 10 مكغ. قد تحتاجين إلى التوقف عن استعمال فاچيفم لمدة 4 حتى 6 أسابيع قبل العملية الجراحية لتقليل خطر الإصابة بخثرة دموية (انظري البند 2، "خثرات دموية في الوريد"). اسألي الطبيب متى تستطيعين معاودة استعمال فاچيفم 10 مكغ ثانية.

يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحققي من الملصق على عبوة الدواء ومن المقدار الدوائي في كل مرة تتناولين فيها دواء. ضعي النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء فاستشيري الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، يمكن أن يُسبب استعمال فاچيفم 10 مكغ أعراضاً جانبية لدى بعض المستخدمين. لا تندهشي عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها.

فيما يلي الأمراض التي تم الإبلاغ عنها أنها ظهرت في أوقات قريبة أكثر لدى نساء يستعملن علاجات هرمونية بديلة تصل إلى الدورة الدموية، مقارنة بنساء لا يستعملن علاجاً هرمونياً بديلاً. هذه المخاطر منخفضة أكثر في العلاجات المعدة للاستعمال عن طريق المهبل مثل فاچيفم 10 مكغ:

- سرطان المبيض
- خثرات دموية في أوردة الساقين أو الرئتين (خُثار وريدي)
- سكتة دماغية
- احتمال فقدان الذاكرة، إذا تم بدء العلاج الهرموني البديل بعد عمر 65 سنة

لمعلومات إضافية عن هذه الأعراض الجانبية، انظري البند 2 "قبل استعمال الدواء".

توقفي عن استعمال فاچيفم 10 مكغ وتوجهي فوراً إلى الطبيب

إذا عانيت من إحدى الحالات التالية المفصلة أدناه خلال العلاج الهرموني البديل:

- حالات صداع شبيهة بالشقيقة تحدث للمرة الأولى
- اصفرار الجلد أو بياض العينين (يرقان). هذه قد تكون علامات لمرض في الكبد
- انتفاخ في الوجه، في اللسان و/أو الحنجرة و/أو صعوبة في البلع أو طفح جلدي مثير للحكة (شرى)، إلى جانب صعوبة التنفس، التي قد تشير إلى وذمة وعائية
- ارتفاع حاد في ضغط الدم (قد تكون الأعراض صداع، إرهاق، دوام)
- أية حالة من الحالات المذكورة في البند 2 تحت عنوان "يمنع استعمال الدواء إذا"
- إذا أصبحت حاملاً
- إذا ظهرت علامات الخثرة الدموية، مثل:

- انتفاخ مصحوب بالألم واحمرار الساقين
 - ألم مفاجئ في الصدر
 - صعوبات في التنفس
- لمزيد من المعلومات، انظري البند 2 تحت عنوان "خثرات دموية في الوريد (thrombosis)".

أعراض جانبية شائعة: قد تؤثر على حتى 1 من بين 10 نساء

- صداع
- ألم في البطن
- انزعاج، نزيف أو إفراز من المهبل.

أعراض جانبية ليست شائعة: قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 امرأة

- عدوى في الأعضاء التناسلية التي تسببها الفطريات
- غثيان
- طفح
- زيادة في الوزن
- هبات من الحر
- ارتفاع ضغط الدم.

أعراض جانبية نادرة جداً: قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 امرأة

- إسهال
- احتباس السوائل
- تفاقم الشقيقة
- فرط التحسس في كل أجهزة الجسم (مثل رد فعل/صدمة تأقية).

تم الإبلاغ عن الأعراض الجانبية التالية خلال العلاج بإستروجين المتناول عبر الفم:

- مرض في كيس المرارة
- اضطرابات مختلفة في الجلد:
- تغييرات في لون الجلد، خاصة في بشرة الوجه والعنق المعروفة بـ "كلف الحمل" (chloasma)
- عقد جلدية حمراء ومؤلمة (erythema nodosum)
- طفح مع احمرار أو جروح على شكل لعبة لوح الهدف (erythema multiforme).

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أيٌّ من الأعراض الجانبية، أو إذا عانيت من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

الإبلاغ عن الأعراض الجانبية

يمكن إبلاغ وزارة الصحة بالأعراض الجانبية عبر الضغط على رابط "الإبلاغ عن الأعراض الجانبية بسبب العلاج الدوائي"، الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى استمارة على الإنترنت للإبلاغ عن الأعراض الجانبية أو عبر الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

تجنبي التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء وكلّ دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنبين التسمّم. لا تسببي التقيؤ من دون تعليمات صريحة من الطبيب. لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على عبوة اللويحة (بليستر) والعبوة الخارجية. تاريخ انتهاء الصلاحية يُنسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين بدرجة حرارة تحت الـ 25°C.

لا يجوز التخزين في الثلاجة.

يُمنع إلقاء الأدوية في مياه الصرف الصحيّ أو في سلّة المهملات البيئية. عليكِ استشارة الصيدلي بشأن التخلص من أدوية لم تعد ضرورية بعد. تساعد هذه التدابير في حماية جودة البيئة. قد يؤدي هذا الدواء إلى خطر بيئي مائي.

6. معلومات إضافية

يحتوي كل قرص مهبلي على 10 ميكروغرامات من إستراديول (كإستراديول هيميهدرات).

إضافة إلى المركّب الفعّال، يحتوي الدواء أيضًا على:

hypromellose, lactose monohydrate, maize starch, magnesium stearate.

يحتوي طلاء القرص على:

hypromellose, macrogol 6000.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

يتوفر كل قرص مهبلي أبيض ضمن موصل (مطابق) أحادي الاستعمال.

في جانب واحد من قرص فأجيفم 10 مكغ يظهر الختم "NOVO 278".

أحجام العبوات:

18 قرصًا مهبليًا وموصلات

24 قرصًا مهبليًا وموصلات

قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

نوفو نورديسك م.ض.

شارع عتير بيدع 1،

كفار-سابا 4464301.

اسم المنتج وعنوانه:

نوفو نورديسك أي.إس.، نوفو ألي،

دي. كبي - 2880، باجسفيرد، دنمارك.

تم تحرير هذه النشرة في آب 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة.


رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

146-89-33241


Vagifem 10 IL PIL AUG22-Notification

تعليمات للمستعملة


كيفية استعمال فاجيفم 10 مكغ




1. مَرَقِي عبوة بليستر منفردة واحدة.
افتحي الطرف كما هو موضح في الصورة.



2. أدخلِي الموصل بحذر في المهبل. توقفي عندما تشعرين بقليل من المقاومة (8-10 سم).



3. لتحرير القرص، اضغطي بلطف على المكبس حتى تشعرين بنقرة.
سيلتصق القرص بجدار المهبل فوراً.
ولن يسقط خارجاً عندما تقفين أو تمشين.



4. أخرجي الموصل وتخلصي منه.