

**نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلية (مستحضرات) - 1986**

**تراماداكس أقراص، 100 ملغ**

يحتوي كل قرص من ترامادول هيدروكلوريد (Tramadol hydrochloride) 100 ملغ ودون غير فعالة ومثيرة للحساسية في الدواء - انظر البند 6 معلومات إضافية<sup>1</sup>، والبند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء".  
أقرأ النشرة **بتمعن حتى نهايتها، وملك قبل استعمال الدواء**. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كنت لديك أسئلة إضافية فتوجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.  
وصف هذا الدواء لك. لا تعطه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتهم.  
الدواء غير مخصص للأطفال دون عمر 14 عاماً.

**قد تسبب الأبوينة من عقاقول الأفيونات الإدمان، بأشخاص عند الاستعمال المتواصل، كما أنه من الممكن أن تتم إساءة استخدامها وأخذ جرعة مفرطة. قد تتمثل ردة الفعل على الجرعة المفرطة ببطء التنفس وحتى قد تسبب دون أنك تعرف اسم الدواء، الجرعة التي تتناولها، ونبرة التنفس، مدة العلاج، الأوراش الجانبية والمخاطر التي من الممكن حصولها.**

بالإمكان إيجاد معلومات إضافية بشأن خطر التعاطي والإدمان، في الرابط:  
[http://www.health.gov.au/unitsOffice/HD/MTU/Drugs/risk/Doc/Lib/opioids\\_ar.pdf](http://www.health.gov.au/unitsOffice/HD/MTU/Drugs/risk/Doc/Lib/opioids_ar.pdf)

من شأن تناول هذا الدواء مع أبوينة من علقة البنزوديازيبينات، أدوية أخرى تنشط الجهاز العصبي المركزي (يشمل المهدئات) أو الكحول، أن يسبب تعوزاً بالنعاس المميع، صوبية في التنفس (تثبيط تنفس)، والغيبوبة، والموت.

**1. لم أعُد هذا الدواء؟**

تراماداكس أقراص مخصص لعلاج الألم المتوسط حتى الشديد. المجموعة العلاجية: الأفيونيات.

الترامادول، المادة الفعالة في تراماداكس أقراص، هي مسكن الألم ينتمي إلى مجموعة الأفيونيات، وهي تعمل على جهاز الأضباب المركزي. تسكن الألم من خلال التأثير على الخلدنيا العصبية في العمود الفقري وفي الدماغ.

**2. قِيلَ استعمال الدواء يُمنع استعمال الدواء:**

- إذا وجدت هذا الدواء (أرجية) للمادة الفعالة (ترامادول هيدروكلوريد) أو لأحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء (انظر البند 6).
- إذا كنت في حالة تسهم شديدة بسبب الكحول، الأقراس المتؤومة، مستكبات الألم أو أدوية أخرى لعلاج الحالة النفسية (الأدوية التي تؤثر على الحالة النفسية والمشاعر).
- إذا كنت تتناول مستكبات الألم الأوكسيكودين أحادي الأمين (MAO) (أدوية معددة لعلاج الاكتئاب)، أو إذا كنت قد تناولت خلال آخر 14 يوماً قبل تناول تراماداكس أقراص هذا الدواء (معدد بين الأبوينات).
- إذا كنت مصاباً بالمرض وليست هناك سيطرة كما ينبغي على الوابن من خلال العلاج التي تتناق.
- كبدليل للفظام عن المخدرات.

**قبل بدء تناول تراماداكس أقراص، أخبر الطبيب أياً:**

- كنت تعتقد بانك تعاني، أو عانيت في الماضي من التعطى بمسكبات الألم الأخرى (أفيونيات)، الكحول، الأدوية بوصفة طبية أو الأدوية غير القانونية.
- عانيت في الماضي من أعراض الفطام مثل: اندام البهلاء، الهلع، الانزعاج أو التعرض عن التوقف عن استعمال الكحول أو المخدرات.
- كنت تشعر بالحاجة لاستهلاك المزيد من مسكن الألم فقد من أجل الوصول إلى هذا المستوى من تسكين الألم، قد يشير ذلك إلى دواء مقاوم لتأثير الدواء ویده الإدمان عليه. توجه للطبيب الذي سيؤمّم بمناقشة علاجك والتي قد يغير لك الجرعة أو يغير العلاج إلى مسكّن ألام آخر.
- كنت تعاني من اضطرابات في حالة الوعي (إذا كنت تشعر بانك في شك الإغماء).
- كنت في حالة حامة (قد يكون التعزق البارد إشارة لذلك).
- كنت تعاني من ارتفاع الضغط على الدماغ (قد يحصل جزاء تعرضن الرأس لإصابة أو مرض دماغي).
- كنت تعاني من صعوبات التنفس.
- كنت تعاني من النزح أو الميل لنوبات صرعية، لأن مخاطر النوبات الصرعية قد تزداد.
- كنت تعاني من اكتئاب وتناول أدوية معضادة للاكتئاب لأن بعضها قد يتفاعل مع الترامادول (انظر لاحقاً "ردود الفعل بين الأبوينات").
- كنت تعاني من مرض في الكبد أو الكلى.

**متشاكل تستعق بالتوم**

يحتوي تراماداكس أقراص على مادة فعالة تنتمي لمجموعة أدوية يطلق عليها اسم الأفيونيات. قد تسبب الأفيونيات مشاكل نفس تعطى بالتوم، مثل لضعف التنفس خلال النوم (التنفس السطحي)، تسبب في النوم خلال النوم (Apnea)، وبعض أوكسينين أو المتعلق بالألم (مستوى أوكسينين منخفض في الدم). يتعلّق خطر حصول لضعف التنفس خلال النوم بجرعة المادة الأفيونية. قد يفكر طبيبك بخفض الجرعة الإجمالية من المادة الأفيونية التي تتناولها إذا كنت تصاب بانقطاع التنفس خلال النوم.

هناك خطورة قليلة للتعرض لملازمة السيروتونين والتي من الممكن أن تحصل بعد تناول ترامادول بالدمج مع بعض الأدوية المضادة للانعقاد. قد يتناول ترامادول لوحده. توجه لأبوينة لتأهي الاستشارة الطبية إذا كان لديك أحد الأعراض المتعلقة بهذه الملازمة الخطيرة (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية").

من الإيلاج عن نوبات صرع لدى ملقني العلاج الذين يتناولون ترامادول بمستوى الجرعة الموصى بها. قد يزيد الخطر عندما تكون جرعات الترامادول أعلى من الحد الأقصى لجرعة العلاج اليومية الموصى بها (400 ملغم).

**زائدة و/أو للوافة:**

بين الترامادول بعملية معالجة في الكبد بواسطة إنزيم. لدى بعض الناس، هناك نوع معدن من الإنزيم، الأمر الذي قد يؤثر عليهم بطرق مختلفة. بعض الناس إن شعروا بقدر كثف من التأثير على الألم، في حين قد يعني انخفاضه أن أحرور من أعراض جانبية شديدة ويحتملها أكبر. ألاحظت أحد الأعراض الجانبية التالية، ويحتملها أيضا التوقف عن تناول الدواء والتوجه للطبيب فوراً: تنفس بطيء أو سطحي، بالغث، نعاس، صغر حجم حدقات العين، الشعور بالدوار، والغثوة، الإمساك، إنبساط، اندام الشبيهة.

**تفاعلات بين الأدوية**

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، امك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.  
يُمنع تناول تراماداكس أقراص مع مضادات الأوكسيكودين أحادي الأمين MAO (أدوية معددة لعلاج الاكتئاب) أو إذا كنت قد تناولتها خلال آخر 14 يوماً قبل تناول تراماداكس أقراص.

قد يحصل انخفاض بتأثير تراماداكس أقراص وقد تكون فترة تأثيره أقصر إذا تم تناول مع الأدوية التي تحتوي على:  
• كاربامازيبين (لعلاج نوبات الصرع)  
• كينيدازيبيرول (لعلاج الغثان)  
• سيقل لك طبيبك إن كنت بحاجة لتناول تراماداكس أقراص، وما هي الجرعة.

- قد يزيد الخطر لأعراض الجانبية إذا كنت تتناول:  
• مسكبات الألم أخرى مثل المورفين والكودايين (حتى لأجل تخفيف الألم) أو الكحول خلال فترة تناوك  
• ل مضاد الأفيون (السرعة). قد تشعرون بالنعاس أو قد تشعرون بانك على وشك الإغماء. إذا حصل لك ذلك، توجه إلى طبيبك.
- من شأن استعمال تراماداكس أقراص في نفس الوقت مع أدوية مهدئة أو منومة (مثل بنزوديازيبينات) أن يزيد من الخطر المحتمل، صعوبات التنفس (تثبيط التنفس)، الغيبوبة، وبشكل خطرا على الحياة. بناءً على ذلك، يجب التفكير بالاستخدام الموازي فقط إذا لم تكن البدائل الدوائية الأخرى مناسبة. مع ذلك، إذا وصف لك طبيبك تراماداكس أقراص مع أدوية منومة، فيجب أن يتم تحديد الجرعة ومدة العلاج الموازي من قِبَل الطبيب.
- الرجاء إخبار طبيبك بكل الأدوية المنومة التي تتناولها، وعليك الالتزام بدقة بتوصيات طبيب بشأن الجرعة. قد يكون الخطر من الأصدقاء أو الأقارب معرفة عن استعمالك للأدوية والأعراض الجانبية مفيدا. اتصل بطبيبك إذا عانيت من هذه الأعراض.
- الأدوية التي قد تسبب نوبات صرعية (نوبات الصرع) مع بعض أنواع الأدوية المضادة للاكتئاب أو الأدوية المضادة للذهان. من الممكن أن يكون احتمال التعرض لنوبة أكبر إذا تناولت تراماداكس أقراص في نفس الوقت. سيؤمّم لك طبيبك إذا كان تراماداكس أقراص ملائمة لك.

أدوية معددة ضد الاكتئاب. قد يتفاعل تراماداكس أقراص معها، وقد تشعرون بتلازمة السيروتونين (انظر البند 4 "الأعراض الجانبية").  
• مثبات الخثر من مشتقات الكومارين (أدوية تسهيل الدم). مصاد وأرقارين. قد تتفاعل هذه الأدوية مع خثر الدم، وعندها من الممكن حصول حالات نريف.

**استعمال الدواء والغذاء**  
لا يؤثر الدواء على تغذية تراماداكس أقراص.  
**استخدام الدواء وإسهالك الكحول**  
لا تشرب المشروبات الكحولية خلال فترة العلاج ب تراماداكس أقراص، لأن تأثيره قد يزداد.

**الأطفال والمراهقون**

استعمال تراماداكس أقراص للأطفال الذين لديهم صعوبات نفس:  
ليس من المفضل استعمال ترامادول للأطفال الصغار بسبب صعوبات التنفس. إن أعراض التسمم بالترامادول تكون أكثر شدة لدى هؤلاء الأطفال.

**الحمل، الإرضاع والحساسية**

لا تتناول تراماداكس أقراص إذا كنت حاملاً أو تعتديين بانك حاملاً، إلا إذا تحدثت مع الطبيب وتبين أن الفائدة في العلاج تزيد عن الخطر للمن الحمل. إذا كنت تتناول تراماداكس أقراص خلال الحمل، فمن شأن ذلك أن يسيب الولادة، حامة من التعطى والشعور بأعراض الفطام بعد الإرضاع. لا تأخذ ما يستعي العلاج.  
يُمنع تناول تراماداكس أقراص خلال فترة الرضاعة، لأنه يتم إفراز ترامادول من خلال حليب الأم ومن الممكن أن يؤثر على طفلك.

اعتماداً على التجربة لدى بني البشر، لا يؤثر ترامادول على خصوبة المرأة أو الرجل.  
**السيارة واستعمال الماكينات**

قد يؤدي تراماداكس أقراص للشعور بالنعاس، التوار وتشتويش الرؤية، لذلك فإنه قد يمتد برود فلك. إذا شعرت بأن زودة فلك (تجاوبك) قد تأثرت، فلا تقم بسلقة السيارة أو أي مركبة أخرى، لا تقم بتشغيل الأجهزة الكهربائية أو الماكينات.  
قد يؤثر الدواء على قرتك على السيارة لأنه قد يسبب النعاس أو التوار.  
يُمنع القيادة خلال فترة تناول هذا الدواء، أي إن تعرف كيفية تأثيره عليك.  
تحدثت مع طبيبك أو مع الصيدلي إذا لم تكن متقناً بالسيارة خلال فترة تناول هذا الدواء أمته.  
بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدراجات الوابنية أو اللعب على مقربة من الشارع أو ما شابه.

**معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء**

يحتوي الدواء على سكروز. إذا سبق أن قال لك طبيب إن لديك عدم إحتمال للأدوية معينة من السكر، فاستشر الطبيب قبل تناول هذا الدواء.  
يحتوي الدواء على أقل من 1 مليون من الصوديوم (230 ملغ) في القرص، أي أنه يعتبر فلياً "خالٍ من الصوديوم".

**3. كيف تستعمل الدواء؟**

يجب استعمال الدواء دائماً حسب تعليمات الطبيب. يجب عليك فقط مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بدواء. الجرعة وطريقة أخذها سيحددنها الطبيب فقط.  
يجب أن تكون أوالاً ملامنة لشدة الألم ولحماسيتك الشخصية للألم.  
بمجرد عمارة، يجب تناول أقل جرعة ممكنة تساعد في تسكين الألم. يُمنع تناول أكثر من 400 ملغ ترامادول (تساوي 100-200 ملغ ترامادول هيدروكلوريد في اليوم، إلا إذا وجهك طبيبك للقيام بذلك. إذا لم يعطك طبيبك تعليمات أخرى، فإن الجرعة المقنعة هي:  
• البالغون والمراهقون من جيل 14 عاماً  
50-100 ملغ ترامادول هيدروكلوريد، مرتين في اليوم (تساوي 100-200 ملغ ترامادول هيدروكلوريد في اليوم)  
من المفضل أن تكون في الصواب في المساء.  
قد يصف لك طبيبك جرعة مختلفة وأكثر ملاحة لك، بعد اعذاجه.  
إذا كنت هناك حاجة، قد ترتفع الجرعة إلى 150 أو 200 ملغ مرتين في اليوم (تساوي 300-400 ملغ ترامادول هيدروكلوريد في اليوم).  
نظراً لأنه يُمنع تناول تراماداكس أقراص، فقد يوصيك الطبيب باستخدام دواء آخر.  
الأطفال

**تراماداكس أقراص لمن مصحوا للأطفال دون سن 14 عاماً.**

لدى المسنين (فوق جيل 75 عاماً) من الممكن أن يتأخر إفراز ترامادول من الجسم. إذا كان هذا الأمر صحيحاً بالنسبة لك، فقد يوصي طبيبك بزيادة الفوارق الزمنية بين الجرعات.

**مرض خطير في الكبد أو الكلى (فشل) / مرضى غسل الكلى**  
يجب على متلقي العلاج المصابين بفشل الكبد أو/أو كلتيهما غسل الكلى، الامتناع عن تناول تراماداكس أو إذا كنت تعاني من قصور (فشل) بمسوى معتدل أو متوسط، فمن الممكن أن يوصي الطبيب بزيادة الفوارق الزمنية بين الجرعات.

#### لا يجوز تجاوز المقادير الدوائية الموصى به.

**كيف ومتى يتم تناول تراماداكس أقرصاً؟**  
تراماداكس أقرص مخصص للبلع. يُمنع شطر، سحق أو مضغ القرص. يجب دائماً ابتلاع قرص تراماداكس كاملاً مع كمية كافية من السوائل، ومن المفضل أن يكون لك في الصباح والمساء. بالإمكان تناول القرص على معدة فارغة أو بعد الطعام.

#### كم من الوقت عليك تناول تراماداكس أقرصاً؟

كان يجب على طبيبك التحدث إليك بشأن فترة العلاج اللازمة وأن يجيز خطة وقف العلاج. تحدد هذه الخطة كيفية تقليل الجرعة تدريجياً إلى حين التوقف عن تناول.

#### إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

عموماً، إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة إضافية، فليس من المفترض أن يسبب ذلك أية أعراض سلبية. وأصل تناول القرص التالية كما يجب.  
إذا تناولت أنت (أو أي شخص آخر) كمية كبيرة من تراماداكس أقرص دفعة واحدة، فيجب التوجه فوراً للمستشفى أو الطبيب. أحضر عبوة الدواء معك. تشمل أعراض الجرعة المفرطة صفر حجم حركات العين، تقيؤ، انخفاض ضغط الدم، نبض قلب سريع، انهيار، فقدان الوعي، نوبات صرعية وصعوبات في التنفس أو تنفس سطحي.

#### إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول تراماداكس أقرص، فقد جرعة الأمل. لا تتناول جرعة مضاعفة لتعويض عن جرعة الذاكرة، ببساطة تابع تناول الدواء كما في السابق.

#### إذا توقفت عن تناول الدواء

يُمنع التوقف عن تناول الدواء دفعة واحدة. إذا كنت ترغب بالتوقف عن تناول الدواء، استشر الطبيب أولاً. سيشرح لك كيفية القيام بذلك، بالاعتماد من خلال خفض الجرعة تدريجياً، بحيث تكون أعراض الظلم المزعجة بالحد الأدنى.

قد تحصل أعراض الظلم، مثل عدم الراحة، صعوبات النوم، العصبية، انعدام الشهوة، الهلع، الشعور بضربات في القلب، ارتفاع ضغط الدم، غثيان أو تقيؤ، الإسهال، الزحجة أو التعرق، إذا توقفت عن تناول الدواء دفعة واحدة.

يجب الاستمرار في العلاج حسب توصية الطبيب. حتى إذا طرأ تحسين على حالتك الصحية، يُمنع التوقف عن العلاج بالدواء بدون استشارة الطبيب.

**يُمنع تناول الأدوية في الظلام! تحقّق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4. الأعراض الجانبية

جميع الأدوية، قد يسبب استعمال تراماداكس أقرص أعراضاً جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تتحدث عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية من المحتمل ألا تعاني من أي منها. عليك مراجعة الطبيب فوراً إذا شعرت بأعراض ردة فعل تحسسية مثل انتفاخ الوجه، اللسان أو الحلق و/أو صعوبات في البلع أو الشرى (hives، رضات/كدمات حمراء في الجلد) بالإضافة إلى صعوبات التنفس.

**أعراض جانبية شائعة جداً** (أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة):

- حالات دوام.

• حالات غثيان.  
**أعراض جانبية شائعة** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 100):

- الإمساك، غثان، تعرق.
- تعب.
- إمساك، جفاف الفم، تقيؤات.
- تعرق.

**أعراض جانبية غير شائعة** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 1,000):

- تأثيرات على القلب والدورة الدموية (الشعور بضربات القلب، نبض سريع، الشعور بالإغماء أو الانهيار).
- تحصل هذه الأعراض الجانبية للأسباب لدى متلقي العلاج في الوضعية الأوف أو خلال العلاج الجسدي.
- الرغبة بالتقيؤ، مشاكل في البطن (مثل الشعور بالضعف في البطن، انتفاخ، إسهال).
- ردود فعل جلدية (مثل الحكة، الطفح الجلدي).

**أعراض جانبية نادرة** (أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من 10,000):

- ردود فعل تحسسية (مثل صعوبات التنفس، صفير، انتفاخ الجلد) والصدمة (فشل مفاجئ في تدفق الدم).
- نبض بطيء.
- ارتفاع ضغط الدم.
- شعور غير عادي (مثلاً، حكة، لسع، انعدام الشعور)، رجفة، نوبات صرع، تشنج العضلات، عدم التناسق الحركي، فقدان الوعي الموقت (الغماغمة)، اضطرابات الكلام.
- حصلت نوبات الصرع بصورة أساسية في حالات الجرعات المرتفعة من الترامادول أو عندما تم تناول ترامادول بموازاة أدوية أخرى من شأنه تحفيز النوبات.
- تغييرات في الشهية.
- ذبذبان، بلهته، اضطرابات في النوم، حالات هلع وكوابيس.
- قد تظهر شكوى بخصوص مشاكل نفسية بعد العلاج أو بتراماداكس أقرص، قد تختلف حدتها وطبيعتها (بحسب شخصية، متلقي العلاج ومنذ العلاج). قد تظهر على شكل تغييرات في الحالة المزاجية (في غالبية الحالات مزاجية ممتازة، أحياناً غضب، تهيجات) في النشاط (عادة هبوط، وأحياناً ارتفاع) وترجع في الإزراء العظمية والحسي (وعي أقل وقدرة أقل على اتخاذ القرارات، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى أخطاء في الحكم).
- توشيش الروبوت، فرط توسع الحفقات، انقباض الحفقات.
- تنفس بطيء، ضيق تنفس.
- تم الإبلاغ عن تفاعلات في حالات الزبوء، لكن لم يثبت أن ذلك نتج عن الترامادول. إذا تم تجاوز الجرعات المسموح بها، أو إذا تم تناول أدوية أخرى تبطل الأداء الدماغي في نفس الوقت، فمن الممكن أن يحصل تباطؤ في التنفس.
- ضعف العضلات.
- صعوبات أو الألم عند التبول، قلة التبول.

**أعراض جانبية نادرة جداً** (أعراض تظهر لدى أقل من 10,000 مستعمل واحد من 10,000):

- ارتفاع مستويات إنزيمات الكبد.
- أعراض جانبية نسبية شائعة غير معروفة (أعراض جانبية لا يتم تحديدها تواترها بعد):
- مستوى سكر أقل مما يجب في الدم.
- متلازمة السيروتونين التي قد تتسبب في الحالة النفسية (والتي تشمل أعراضاً مثل: عدم الهوة، حالات ذبذبان، غثوية (كوما) وتشنجات أخرى، مثل الحمى، ارتفاع وتيرة نبض القلب، معطدم غير منتظم، تشنجات لاراليدية، تصلب العضلات، انعدام التناسق الحركي وأو أعراض في الجهاز الهضمي (مثلاً، حالات الغثيان، حالات التقيؤ، حالات الإسهال) (انظر البند 2 "قبل استعمال الدواء").
- التلطف والإدمان (انظر لاحقاً "كيف أعرف إذا كنت منمناً").

**الظلم (الإفلاج) عن الدواء:**  
عند التوقف عن تناول تراماداكس أقرص قد يتم الشعور

بأعراض الظلم، والتي تشمل عدم الراحة، صعوبات النوم، العصبية، الهلع، الشعور بضربات في القلب، ارتفاع ضغط الدم، الغثيان، حالات الإسهال، الزحجة، التعرق.

#### كيف أعرف أي وقت منمناً؟

إذا لاحظت أحد الأعراض التالية خلال فترة تناول تراماداكس أقرص، فقد يكون ذلك مؤشراً على الإدمان: تشعر بحاجة لتناول الدواء لفترة أطول من الفترة الموصى بها لك.

- تشعر أنك بحاجة لاستعمال جرعة أعلى من الجرعة الموصى بها.
- تستعمل الدواء لأسباب غير التي تم وصفه لها.
- عندما تتوقف عن تناول الدواء تشعر بالسوء، وتعود لتشعر بحالة جيدة بعد تناول الدواء.
- إذا لاحظت أحد الأعراض المذكورة، فمن المهم أن تتحدث مع طبيبك.

**إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاعل أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من أعراض جانبية غير مذكورة في النشرة، عليك استشارة الطبيب.**

#### التلبيغ عن الأعراض الجانبية

من الممكن تليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "111000 على تليفون لواء" **عقرب تليفون تروفوت** ("التلبيغ عن أعراض جانبية متوقعة لعلاج وراثي") الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يتحوّل إلى استمارة عبر الإنترنت للتلبيغ عن الأعراض الجانبية، أو عن دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

#### 5. كيف يخزن الدواء؟

- تحبّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد والأطفال، وهكذا لتجنب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من الشهر).
- شروط التخزين: احفظه بدرجة حرارة دون 25°C.

#### 6. معلومات إضافية

**بالإضافة إلى المادة الفعالة، يحتوي الدواء، أيضاً:** Calcium hydrogen phosphate dihydrate, sucrose, guar gum, povidone, talc, ammonio methacrylate copolymer, calcium stearate, calcium carbonate, polyacrylate, silica colloidal anhydrous, maize starch, macrogol 6000, mannitol, acacia, yellow lake (E104), titanium dioxide (E171), carboxymethylcellulose sodium, propylene glycol, iron oxide red (E172), shellac, carnauba wax, castor oil.

#### كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

قرص دائري، لونه أحمر بني فاتح.  
أحجام العبوات المصداق عليها: 10، 30 قرصاً. قد لا يتم تسويق جميع أحجام العبوات.  
رقم تسجيل الدواء وماذا تحوي العبوة:  
الصحة: 100-43-27638-00  
تم تحريرها في أيار 2022 وفق تعليمات وزارة الصحة. من أجل سهولة وتبوين حفظها، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. مع هذا الدواء معاً لكلا الجنسين.

**المنتج وصاحب التسجيل: دكسل م. ص**  
شارع دكسل 1، أور عيكفا 3060000، إسرائيل