

## ستريبيسيلس بدون سكر توت ستريبيسيلس بدون سكر ليمون أقراص للمصّ

المواد الفعّالة وتركيزها:

كل قرص للمصّ يحتوي على:

1.2 ملغ 2,4-ديكلوروبينزويل الكحول

2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1.2mg

0.6 ملغ أميلميبتاكريسول

Amylmetacresol 0.6mg

لقائمة المواد غير الفعّالة، انظر للبند 6. انظر أيضًا بند "معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء".  
اقرأ النشرة بامعان حتى نهايتها قبل استعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخّصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك تناول الدواء حسب التعليمات في بند الجرعة في هذه النشرة.

الدواء مُخصّص للبالغين وللأطفال فوق جيل 6 سنوات، ما دون هذا السن عليك التوجه إلى الطبيب. عليك استعمال الدواء بشكل صحيح. استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

### 1. لأي عرض مُخصّص الدواء؟

يُستعمل ستريبيسيلس بدون سكر توت/ليمون لتخفيف آلام الحلق لدى البالغين والأطفال فوق جيل 6 سنوات.

#### الفصيلة العلاجية:

مُطهّر.

يحتوي المستحضر على مادتين فعّالتين ذاتا فعالية مُطهرة، تستعمل هذه المواد لتخفيف أعراض تلوثات الفم والحلق بالقضاء على الجراثيم التي تشترك بتلوثات الفم والحلق. مصّ الأقراص يُتيح للمواد الفعّالة العمل في المنطقة المؤلمة وبذلك ترطيبها وتهدئتها. هذا الأمر يُساعد على تخفيف الألم وعدم الراحة في تلوثات الفم والحلق.

### 2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا

- كنت تعاني من حساسية (أرجية) للمواد الفعّالة أو لأي واحد من المركبات الإضافية التي يحتوي عليها الدواء.  
(انظر القائمة الكاملة للمركبات غير الفعّالة في بند 6).

#### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بستريبيسيلس بدون سكر توت/ليمون، أخبر الطبيب إذا

- كنت تعاني من مشاكل أخرى في الحلق

يجب استشارة الطبيب على الفور إذا تفاقمت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

#### الأطفال والمراهقون:

هذا الدواء غير مُخصّص للأطفال دون جيل 6 سنوات.

إذا كنت تأخذ، أو إذا أخذت في الآونة الأخيرة، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات تغذية أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.

#### الحمل والإرضاع

يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا المستحضر إذا كنت تظنين أنك حامل، كنت حامل أو مُرضعة.

يجب استشارة طبيب أو صيدلي قبل استعمال الأدوية.

معلومات مهمة عن جزء من مركبات الدواء

- يحتوي الدواء على إيزومالتيتول ومالتيتول – اللذان قد يكون لهما تأثير مُلَيّن طفيف. إذا قيل لك من قبل الطبيب أنه يوجد لديك عدم تحمل لسكريات معينة، يجب استشارة الطبيب قبل استعمال هذا المستحضر. قيمة السعرات الحرارية هي 2.3 كيلو سعرات حرارية / غرام.
- يحتوي الدواء على أقل من 1 ميليومول (23 ملغ) صوديوم في الجرعة - الذي يُعتبر كـ "خال من الصوديوم".
- **ستريبيسل بدون سكر توت** يحتوي أيضًا على:
- **بروبيلين جليكول (7.30 ملغ في القرص)** (متواجد في مركب طعم التوت).
- **بينزيل الكحول** (متواجد في طعم مركب التوت) الذي قد يتسبب برد فعل تحسسي.
- **ستريبيسل بدون سكر ليمون** يحتوي أيضًا على:
- **بينزيل الكحول، سيترال، سيترونيل، دي-ليمونين، جرينيول فالينيلول** (متواجدة في مركب طعم الليمون) التي قد تتسبب في رد فعل تحسسي.

لا يجوز استعمال المستحضر إذا كان لديك عدم تحمل للفروكتوز.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك التحقق من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر. يجب إخراج قرص واحد للمصّ من البليستر (عبوة الألومينيوم)، وضعه في داخل الفم وتركه ليذوب ببطء. يجب إدخال البليستر مرة أخرى لكرتونة العبوة. الجرعة الاعتيادية بشكل عام هي:

**البالغون والأطفال فوق جيل 6 سنوات:** قرص واحد للمصّ كل 2-3 ساعات. لا يجوز استعمال أكثر من 12 قرصًا للمصّ في اليوم (24 ساعة).

**لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.**

هذا الدواء غير مُخصّص للأطفال والرضع تحت جيل ست سنوات. يجب التذكر أن الأطفال الصغار قد يختنقون من قرص المصّ.

#### مدة العلاج

للاستعمال قصير الأمد.

يجب تناول الجرعة الأقل ولأقصر مدة من أجل تخفيف الأعراض.

عليك التوجه إلى الطبيب إذا تفاقت علامات المرض (أعراض) أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

**طريقة الاستعمال:** يجب مصّ قرص المصّ ببطء، لكي يذوب ببطء في الفم. لا يجوز مضغ أو كسر قرص المصّ.

إذا تناولت بالخطأ جرعة أكبر من اللازم قد تشعر بعدم راحة في البطن. لا تواصل استعمال المستحضر واستشر الطبيب أو الصيدلي. إذا أفرطت بتناول الجرعة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المطلوب، لا يجوز تناول جرعة مضاعفة. خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! يجب التحقق من المصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بخصوص استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يُسبب استعمال ستريبيسل بدون سكر توت/ليمون أعراضًا جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرغ من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من الممكن ألا تعاني من أي منها.

**يجب إيقاف الاستعمال والتوجه فورًا إلى الطبيب إذا – ظهر فرط حساسية مثل: حكة، شعور بالحرقنة و/أو عدم راحة في الفم، صعوبات في التنفس، انتفاخ في الوجه، العنق، اللسان أو الحلق، طفح (ردود فعل أرجية حادة).**

إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

#### التبليغ عن أعراض جانبية

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<http://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! هذا الدواء وكل دواء آخر يجب حفظه في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ومجال نظر الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تُسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يخزن في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- لا يجوز رمي الادوية في المراض او في النفايات المنزلية. استشر الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية التي لم تعد قيد الاستعمال, من أجل الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمواد الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على:  
ستريبيسل بدون سكر توت:

Isomalt, Maltitol Liquid, Tartaric Acid, Flav P strawberry Flavor 052312B, Sodium Saccharin, Pink Antho P-WS (E163)

ستريبيسل بدون سكر ليمون:

Isomalt, Maltitol liquid, Tartaric Acid, Flav P Lemon Flavour 74940-74, Sodium Saccharin.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

ستريبيسل بدون سكر توت – أقراص للمصّ مستديرة بلون وردي, مع علامة الماركة موسومة على الجهتين.  
ستريبيسل بدون سكر ليمون: أقراص للمصّ مستديرة بلون أبيض إلى مائل للأصفر, مع علامة الماركة موسومة على الجهتين.

حجم العبوة: يُسوّق الدواء بعبوة كرتون التي تحتوي على بليستر مع 16 أو 24 قرص للمصّ. قد لا تكون جميع الأحجام مُسوّقة.

**صاحب التسجيل وعنوانه:** ريكيت بنكيزر (نير إيست) م.ض., شارع هنجار 6, هود هشارون 4527704.  
البريد الإلكتروني: [ConsumerHealth\\_IL@reckitt.com](mailto:ConsumerHealth_IL@reckitt.com)

**المنتج وعنوانه:** ريكيت بنكيزر هيلث كير إينترناشيونال م.ض, نوتينجهام, إنجلترا.

تم التنقيح في شباط 2023.

**رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:**

ستريبيسل بدون سكر توت: 112-45-29476-00

ستريبيسل بدون سكر ليمون: 052-52-24917-00

للتبسيط وتسهيل القراءة, تمت صياغة هذه النشرة بصيغة الذكر. بالرغم من ذلك, الدواء مُخصّص لكلا الجنسين.