

إستعمال الدواء والطعام:
يجب تناول أقراص نورثير سوية مع الطعام.
الحمل، الإرضاع والخصوبة:
إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخطر
جداً أن تستشيري الطبيب المعالج حول ذلك
هناك معلومات بإسهاب حول إستعمال ريتوناخير (نورثير)
خلال فترة الحمل. بشكل عام، النساء
بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بمقدار دوائين

سوية مع أدوية أخرى من فصيلة من قد زاد من إحتمالية تطور عيوب خل من غير الموصى به الإرضاع لدى لأن: القدم قد ينتقا || الإرضاع

إذا كنت مريضًا، أو تخططين للإرضاع، فعليك إستشارة الطبيب المعالج بأسرع ما يمكن.

السيادة وإستعمال الماكنات:

من شأن نورثير أن يسبب الدوار. إذا كنت تشعر بأن الدواء يؤثر عليك بهذا الشكل، يجب الإمتناع عن السيادة وإستعمال الماكنات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي نورثير على صوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملг) صوديوم في كل قرص، ولذلك يعتبر 'خالي من الصوديوم'.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستياضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يُحددان من قبل الطبيب فقط.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة التناول

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز المضغ، الكسر أو السحق.

يجب تناول الدواء مع الطعام.

يجب الموااظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

يجب تناول نورثير كل يوم وذلك للسيطرة على مرضك، دون أن يكون هناك صلة بتحسين شعورك العام. إذا منعك عرض جانبي من تناول نورثير حسب إرشادات الطبيب، فعليك إبلاغ الطبيب عن ذلك على الفور. في الفترات التي تعاني فيها من إسهالات من الجائز أن يقر الطبيب الذي يعالجك أن هناك حاجة بإجراء مراقبة ومتابعة إضافية.

احتفظ دائمًا بكمية كافية من نورثير لكي لا ينفد عندك الدواء. في الرحلات أو عند المبيت في المستشفى، تأكد من أن بحوزتك كمية كافية من نورثير إلى أن تتمكن من إقتناء الدواء مجددًا.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة، فمن الجائز أن تعاني من خدر، الشعور

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا
أ إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في
إذا نسيت تناول أقراص نهـ، قد

إذا توقفت عن تناول نورثير يجب تناول جرعة حال تذكرك.
إذا تذكرت قريباً لموعده تناول الجرعة الدوائية القادمة، فتناول الجرعة الدوائية القادمة فقط في الوقت الإعتيادي وإستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.

إذا توقفت عن تناول نورثير لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إن الفرصة الأفضل لإعاقة مقاومة الفيروس للأدوية، هي تناول نورثير بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية بما يتعلق بإستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال نورثير قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تزداد هذه قائمة الأعراض الجانبية عن المائة لأن انتظام

أيًّا منها.

وبمط حياتك، وبالسبة لإرتفاع نسب السحوم في الدم، يتعلّق الأمر احياناً بالادوية ذاتها المستعملة لعلاج الـ HIV. يفحص طبّيك هذه التغييرات. كذلك، فإن الأعراض الجانبية لـ نورثير، عندما يعطى سوية مع ادوية أخرى مضادة للفيروسات الرجعية، تتصل بالادوية الأخرى. لذا من المهم أن تقرأ بتمعن فقرة الأعراض الجانبية في نشرات الأدوية الأخرى.

أعراض جانبية شائعة جداً (very common) - أعراض تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة:

- ألم في أعلى أو أسفل البطن
- تقيّد

- إسهال (قد يكون شديداً)
- غثيان
- إحمرار الجلد (flushing)، الشعور بسخونة
- صداع
- دوار
- ألم في الحنجرة
- سعال
- فساد المعدة أو صعوبة في الهضم

- الشعور بتنميل أو خدر في اليدين، في راحتي القدمين، من حول الشفتين والفم
- الشعور بضعف / إرهاق
- طعم سيء في الفم
- تضرر الأعصاب الذي قد يؤدي لضعف ولأم
- حكة
- طفح
- آلام في المفاصل والظهر

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-15% من مستعملين من بين 100:

- ردود فعل تحسسية تشمل طفح جلدي (من الجائز حدوث إحمرار، بروز وحكة)، إنتفاخ شديد للجلد ولأنسجة أخرى
- أرق
- قلق
- ارتفاع الكوليسترول
- ارتفاع триغليسيريدات

- داء التقرس (Gout)
- نزف في المعدة
- إلتهاب الكبد وإصفرار الجلد أو إصفرار القسم الأبيض من العينين
- زيادة التبول
- تناقص الأداء الوظيفي الكلوي
- إختلالات
- إنخفاض نسب الصفيحات الدموية
- عطش (تجفاف)
- أذنفة ثانية في كل سنة أثنتان على الأقل

- ارتجاع سديدة غير عاديه أثناء الصمت
- غازات
- فقدان الشهية للطعام
- تقرحات في الفم
- آلام عضلية، حساسية أو ضعف العضلات
- سخونة
- فقدان الوزن
- تغيرات في نتائج فحوص الدم (مثل تغير في تعداد الدم وكميات الدم)
- ادئتك

- صعوبة الإنتباه
- إغماء
- تشوش الرؤية
- إنتفاخ اليدين وراحتي القدمين
- إرتفاع ضغط الدم
- ضغط دم منخفض والشعور بإغماء عند الإنقال لوضعية الوقف
- الشعور ببرودة في اليدين وراحتي القدمين
- حب الشباب

- دفع حلدي، شديد أو بشكل خطراً على الحياة يشمل هو بصلات (متلازمة
- أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000
- فشل كلوي
- السكري
- نوبة قلبية

مستعملين من بين 1,000 : أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - أعراض تظهر لدى 1-10

- رد فعل تحسسي خطير (صدمة إستهدافية)
- نسب مرتفعة للسكر في الدم
- أعراض جانبية شيوعها غير معروفة - أعراض شيوعها لم يُحدد بعد:
- حصى في الكلى
- يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت تتقى، تشعر بغثيان أو تعاني من آلام في البطن، نظرًا لأنها قد تتشكل، علامة لالتهاب البنكرياس. كذلك، يجب اطلاع

الطبيب إذا كنت تشعر بتصلب في المفاصل، أوجاع أو آلام (خاصة في الفخذ، في الركبة وفي الكتف) وصعوبة في الحركة، نظراً لأنها قد تشكل علامة لحدوث نخر في العظم (**osteonecrosis**). لمعلومات إضافية، أنظر الفقرة 2 " قبل إستعمال الدواء ".

لدى مرضى الناعور من نوع A و- B كانت هناك عدة تقارير عن حدوث نزف زائد أثناء هذا العلاج أو علاج آخر بمتبيطات الپروتیاز. إذا حدث لك هذا الأمر، راجع الطبيب بشكل فوري.

بلغ عن حالات شذوذ في نتائج فحوص وظائف الكبد، إلتهاب الكبد (**hepatitis**)؛ الارتفاع في تريليزات الكوليسترول، والارتفاع في

(hepatitis) وهي حالات نادرة يرثان، و ذلك لدى مرضى عوتجوا بـ تورفير. بعض المرضى عانوا من أمراض أخرى أو تناولوا أدوية أخرى. من الجائز أن يتفاقم مرض الكبد لدى المرضى الذين يعانون من مرض كبدي أو إلتهاب الكبد.

لقد كانت هنالك تقارير عن حدوث آلام عضلية، حساسية أو ضعف العضلات، خاصة بمشاركة أدوية لخفض نسب الكوليسترول مع علاج مضاد للقيروسات الراجعية يشمل مثبطات البروتياز وقرائن التوكليوزيدات. في حالات نادرة هذه الإضطرابات في العضلات كانت خطيرة (تفكك نسيج العضل).

في حال حدوث ألم عضلي مطول أو مجهول السبب، حساسية، ضعف أو

تقىلصات، توقف عن تناول الدواء، وتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى القريب بأسرع ما يمكن.

راجع الطبيب بأسرع ما يمكن إذا كنت تشعر بأعراض تدل على حدوث رد فعل تحسسي بعد تناول نورقير مثل: طفح، شرى أو صعوبات في التنفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبیة

بالإمكان التبليغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

٥. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي

- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر القنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.
- يجب حفظ أقراص نورقير بعلبتها الأصلية لحمايتها من الرطوبة.
- لا يجوز إستعمال الدواء إذا لاحظت تغير اللون.

نواة القرص: يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:
Copovidone (K value 28), Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate, Sorbitan Laurate, Colloidal Anhydrous Silica, Sodium Stearyl Fumarate.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
قرص بيضوي لونه أبيض حتى كريمًا مطبوع عليه في جانب واحد الرمز "NK".
- حجم العلبة:
 - قنينة تحتوي على 30 قرصاً
 - قنينة تحتوي على 60 قرصاً
 - * من الحائز ألا تنسَّه، كافة أحجام العلب

- صاحب الإمتياز وعنوانه: أبيقي بيوفارما م.ض، شارع هحاراش 4، هود هشارون، إسرائيل.
- إسم المنتج وعنوانه: أبيقي دويتشلاند جي إم.بي.إيتش أند كو. كيي. جي، كنولشتراسه، 67061، لودفيغسهاfen، ألمانيا.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 148-06-33504

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في شباط 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.